

VERÖFFENTLICHUNGEN DES OSTASIEN-INSTITUTS
DER RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM

Band 13

Glossar
der heute gültigen chinesischen Vogelnamen

Glossar
der heute gültigen chinesischen Vogelnamen

Ein lexikographischer Beitrag
zur modernen chinesischen Sprache

Chinesisch-deutsch und deutsch-chinesisch

mit einer
Systematischen Übersicht über die Vögel Chinas

von

ALFRED HOFFMANN

1975

OTTO HARRASSOWITZ · WIESBADEN

1975

OTTO HARRASSOWITZ · WIESBADEN

Herausgegeben von der Abteilung für Ostasienwissenschaften der Ruhr-Universität Bochum
Schriftleitung z. Z. Klaus Kracht

*Herrn Dr. H. E. Wolters
zum 60. Geburtstag
gewidmet*

CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek

Hoffmann, Alfred

Glossar der heute gültigen chinesischen Vogelnamen: ein lexikograph. Beitr. z. modernen chines. Sprache; chines.-dt. u. dt.-chines.; mit e. systemat. Übers. über d. Vögel Chinas.
(Veröffentlichungen des Ostasien-Instituts der Ruhr-Universität Bochum; Bd. 13)
ISBN 3-447-01693-0

© Otto Harrassowitz, Wiesbaden 1975

Alle Rechte vorbehalten

Photomechanische und photographische Wiedergabe nur mit ausdrücklicher
Genehmigung des Verlages

Gesamtherstellung: Hessische Druckerei GmbH, Darmstadt
Printed in Germany



INHALT

Einleitung	IX
Vorbemerkung	XV
Chinesisch-deutsches Glossar	1
Deutsch-chinesisches Glossar	159
Systematische Übersicht über die Vögel Chinas	321

EINLEITUNG

Im Jahre 1955 veröffentlichte Cheng Tso-hsin den 1. Band (Non-Passeriformes) seiner Verbreitungsliste chinesischer Vögel, mit 486 (2?) Arten bzw. 747 (12?) Arten samt Unterarten. Im 1958 erschienenen 2. Band (Passeriformes) sind 613 (?) Arten bzw. 1155 (10?) Arten einschließlich der Unterarten angeführt¹. Die Gesamtzahl der 1958 in China bekannten Vogelarten belief sich demnach auf 1099 (3?) Arten bzw. 1902 (22?) Arten incl. der Unterarten². Rund 30 Jahre nach dem Erscheinen der Liste chinesischer Vögel von Gee, Moffett und Wilder³ ist damit ein Werk erschienen, das die Forschungen vornehmlich der Jahre zwischen 1926-1958 zusammenfasst und als grundlegendes Werk für zukünftige Arbeiten im Bereich der chinesischen Ornithologie anzusehen ist. Es ist hier nicht der Platz, die ornithologische Leistung dieser beiden Bände zu würdigen. Neben der Zuverlässigkeit und Vollständigkeit in der wissenschaftlichen Nomenklatur sei an dieser Stelle auf die mehr als 500 eingearbeiteten Verbreitungskarten zahlreicher Arten und Unterarten hingewiesen, sowie auf das bibliographische Verzeichnis, das nahezu 700 Titel ornithologischer Arbeiten aus dem Bereich Chinas

1 Die Bände erschienen in chinesischer Sprache: Cheng Tso-hsin 鄭作新: Chung-kuo niao-lei fen-pu mu-lu 中國鳥類分布目錄. I. Fei-ch'üeh-hsing mu 非雀形目. K'o-hsüeh ch'u-pan-she 科學出版社, Peking 1955. Ferner Chung-kuo niao-lei fen-pu mu-lu 中國鳥類分布目錄. II. Ch'üeh-hsing mu 雀形目. K'o-hsüeh ch'u-pan-she 科學出版社, Peking 1958.

2 Vergleichsweise beläuft sich die Zahl der in Europa bekannten Arten (Brutvögel, Durchzügler und häufiger auftretende Gäste) auf 481, zu denen noch 140 Seltenheiten kommen; der in Deutschland auf 434 Arten mit allen Seltenheiten. Ganz grob gerechnet kommen etwa ein gutes Drittel der chinesischen Vogelarten auch in Europa vor. - Die Zahlen in Klammern mit Fragezeichen geben die Zahl der noch fraglichen Arten bzw. Unterarten innerhalb der Gesamtzahl an.

3 N. Gist Gee, Lacy I. Moffett and G.D. Wilder: A Tentative List of Chinese Birds. Peking Society of Natural History Bulletin I, 1926-27, Peking 1926. - Vgl. dazu ferner N.G. Gee: A Revision of the Tentative List of Chinese Birds. Peking Society of Natural History Bulletin V, S. 49-68, Peking 1971.

allein für die Jahre 1922-1958 enthält⁴.

Für den Sinologen ist das Werk von Bedeutung, da es eine autoritative Liste der heute gültigen chinesischen Vogelnamen darstellt, indem erstmalig jede in China vorkommende Art mit jeweils 1 chinesischen Namen belegt ist, der in der ornithologischen Literatur Chinas nun durchweg verwendet wird und in diesem Sinne in der Fachliteratur allgemein gültig ist. Wer die noch verwirrende Fülle unverbindlicher chinesischer Vogelnamen in Gee's, Moffett's und Wilder's verdienstvoller "Tentative List of Chinese Birds"⁵ mit den jetzigen eindeutigen Namen in Cheng's Liste vergleicht, wird die Vereinheitlichung der Namen im chinesisch geschriebenen ornithologischen Schrifttum als großen Fortschritt begrüßen. Damit ist zugleich zum ersten Male die Gelegenheit geboten, für die heute gültigen deutschen und chinesischen Vogelnamen ein Glossar aufzustellen, das dem modernen Lexikographen ein sprachlich und wissenschaftlich zuverlässiges Material an die Hand gibt. Unsere Liste enthält insgesamt nahezu 4000 Stichwörter.

Die Chinesen haben ähnlich wie wir bei der Bildung ihrer nun gültigen Standardnamen in der Regel auf ihren traditionellen Vorrat an Vogelnamen zurückgegriffen und durch charakterisierende Zusätze - durch vorgesetzte Silben, 1 Silbe ist 1 Wort - die Unterarten, Arten, Gattungen etc. näher bezeichnet (Namentypen: Dōng "Drossel", Bān dōng "Streifendrossel" = Naumanndrossel, Huībèi dōng "Graurückendrossel"). Viele dieser chinesischen Bildungen sind in Anlehnung an bereits vorhandene englische Namen geschaffen, andere sind selbständig gebildete Kunstnamen; ein kleiner Teil sind eingebürgerte, nicht zu umgehende volkstümliche Namen, die in ganz seltenen Ausnahmefällen zu einer zweifachen Bezeichnung geführt haben.

In einer neueren Veröffentlichung (1973) über die Vögel des Ch'in-ling Gebirges haben Cheng Tso-hsin und seine Mitarbeiter neben den nun in der Fachliteratur gültigen chinesischen Standard-Vogelnamen auch - in besonderen Anmerkungen - jeweils den im Beobachtungsgebiet (Süd-Shensi) gängigen, volkstümlichen (Dialekt-) Namen aufgeführt⁶. Wegen ihrer umgangssprachlichen Wichtigkeit habe ich auch diese Namen (etwa 170) aufgenommen. Sie sind stets ausdrücklich als regionale Namensform gekennzeichnet, um eine Vermischung mit der gültigen Standardform zu vermeiden. Ein Vergleich mit anderen aus der Literatur bekannten

⁴ Eine Besprechung des Werkes gab u. a. Charles Vaurie in The Auk, Vol. 76 (1959), S. 248.

⁵ Siehe oben Anmerkung 3.

⁶ Cheng Tso-hsin teng chu 郑作新等著 : Ch'in-ling niao-lei chih 秦岭鸟类志 . K'o-hsüeh ch'u-pan-she 科学出版社 . Peking 1973.

volkstümlichen Bezeichnungen zeigt, daß die meisten der in unserer Liste aufgenommenen volkstümlichen Namen keineswegs eng (auf Süd-Shensi) begrenzte Dialektformen sind, sondern sich über weite Gebiete, vor allem Nordchinas, verbreitet finden⁷. Diese Namen sind für den Philologen und Volkskundler von besonderem Interesse, spiegeln sie doch, wie bei uns, das unverfälschte Empfinden und Denken des Volkes oft in großer Urwüchsigkeit wieder. So hat der Wiedehopf unter den mitgeteilten 5 volkstümlichen Bezeichnungen einerseits zwar den anmutigen Namen Huā gūniāng, "das hübsche Fräulein", wobei huā (bunt) im Sinne von "bunt und schön herausgeputzt" zu verstehen ist; andererseits scheint der schöne Vogel wie bei uns so auch bei den Chinesen im "übelen Geruch" der Unsauberkeit zu stehen und der Volksmund nennt ihn daher auch Chòu póniāng, d. h. "Stinkige Alte", "Stinkiges Weib". Die Bearbeitung der Art, Bildung und Bedeutung der zahlreichen volkstümlichen Namen wäre eine lohnende Studie für sich.

Viele, noch nicht mit einem deutschen Namen versehene chinesische Vogelarten mussten mit einem solchen belegt werden. Hier fand ich die freundliche Unterstützung durch Herrn Dr. H.E. Wolters vom Zoologischen Forschungsinstitut und Museum Alexander Koenig in Bonn, für die ich an dieser Stelle meinen aufrichtigen Dank sagen möchte. Es musste Rückblick genommen werden auf Namen, die sich in Deutschland bereits im wissenschaftlichen Schrifttum, aber auch bei den deutschen Vogelliebhabern, Händlern und Züchtern eingebürgert hatten. Der glückliche Umstand, daß Herr Dr. Wolters an einer die bisherige Systematik revidierenden Artenliste der Vögel der Welt arbeitete, brachte es mit sich, daß für eine Anzahl chinesischer Vogelarten bereits deutsche Namen ausgewählt oder geprägt worden waren; die fehlenden haben wir im Laufe mehrerer Wochen in gemeinsamen Überlegungen geschaffen. In manchen Fällen ließ es sich nicht vermeiden, der Tatsache Rechnung zu tragen, daß sich bereits mehrere Namen im deutschen Schrifttum für denselben chinesischen Vogel eingebürgert hatten. Wir haben in solchen Fällen

⁷ Volkstümliche Namensformen finden sich u. a. in großer Zahl in Tsen-hwang Shaw: The Birds of Hopei Province, Peking 1936; in N. Gist Gee, Lacy I. Moffett and G.D. Wilder: A Tentative List of Chinese Birds, Peking 1926; ferner in George D. Wilder and Hugh W. Hubbard: Birds of Northeastern China, Peking 1938. In meinem Aufsatz "Vogel und Mensch in China", in: Nachrichten der Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens 88 (1960), S. 45-77, habe ich auf eine Reihe von volkstümlichen Vogelnamen hingewiesen. Bemerkenswert ist, daß auch in der Arbeit von E. Denison Ross: A Polyglot List of Birds in Turki, Manchu and Chinese, (Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. II, Nr. 9, Calcutta 1909) entsprechend der von ihm bearbeiteten fünfsprachigen Vorlage aus dem 18. Jhd. neben traditionellen, schriftsprachlichen chinesischen Vogelnamen auch Vulgäronamen erscheinen. Auch in einigen, in japanischer Sprache geschriebenen Büchern über die Vögel der Mandschurei finden sich volkstümliche Namen verzeichnet, z. B. in

zwei ausgewählt, von denen wir den uns richtiger oder gängiger erscheinenden Namen vorangestellt, den nach unserem Ermessen zweitbesten Namen in Klammern unmittelbar haben folgen lassen. Allgemein eingebürgerte Namen, auch wenn sie noch so irreführend sind, können nur schwer geändert werden. Die als häufiger Käfigvogel allenthalben bekannte "Chinesische Nachtigall" oder "Chinanachtigall" (*Leiothrix lutea*) - im Chinesischen "Liebesvogel" (*Xiāngsīniǎo*) genannt - ist keine Nachtigall, sondern zählt zu den Timalien, während es in diesem Zusammenhang vielleicht erwähnenswert ist, daß eine der wenigen chinesischen Nachtigallenarten, die Rotkopfnachtigall (*Larvivora ruficeps*), vielleicht die schönste aller Nachtigallen ist und zu den seltensten Vögeln der Welt zählt, von der nur 4 Exemplare (in wissenschaftlichen Sammlungen) bekannt sind. Vielfach war bei der deutschen Namengebung auch zu beachten, daß für in anderen Erdteilen lebende Vogelarten bereits festliegende deutsche Namen nicht auch für chinesische Vögel verwendet wurden. Hinzu kommt, daß aus praktischen Gründen die deutschen Vogelnamen nach Möglichkeit ohne einzelstehendes Eigenschaftswort zu bilden sind und im Höchstfalle aus 4 zusammengehörigen Wörtern bestehen sollen (Namenstypen: Rotschwanz, Hausrotschwanz, Rostkehl-Rotschwanz). Bei den viergliedrigen Namen ist der Klarheit und leichten Lesbarkeit willen stets ein Bindestrich gesetzt.

Mittlerweile sind seit dem Erscheinen von Cheng's Liste nahezu 2 Jahrzehnte vergangen, in denen die ornithologische Forschung auf allen Gebieten beachtliche Fortschritte erzielt hat. Wenn vor allem im Bereich der Systematik in der vorliegenden Arbeit die neuen Erkenntnisse der letzten 20 Jahre in vielen Fällen eingearbeitet werden konnten, so ist das ebenfalls der großzügigen Mitwirkung von Herrn Dr. H.E. Wolters und seinem umfassenden Wissen in taxonomischen Fragen zu verdanken. Der ornithologisch interessierte Leser wird aus einem Vergleich von Cheng Tso-hsin's Liste mit der im Anhang unseres Glossars erstellten Übersicht über die Einteilung der chinesischen Vögel ohne Schwierigkeit die unterschiedlichen Auffassungen ablesen können.

Das Glossar enthält neben den Artnamen der Vögel auch die Namen der Ordnungen, Familien und Gattungen. Bei der Transkription der chinesischen Gattungsnamen ist konsequent darauf geachtet worden, daß bei mehrsilbigen (=mehrwortigen) Gattungsnamen diese Silben stets in einem Wort geschrieben sind, um sie sofort als Gattungsnamen kenntlich zu machen und von den charakterisierenden Zusatzsilben abzugrenzen. So bezeichnet *dōng* die Gattung *Turdus*; dementsprechend sind *Bān dōng*

K. Mizuno: *Manshū chōrui genshoku daizukan* 水野馨: 滿洲鳥類原色大圖鑑, Tōkyō 1940.

(Naumannndrossel), *Huībēi dōng* (Graurückendrossel), *Zōngbèi dōng* ("Braunrückendrossel" = Rhododendrondrossel) alle Angehörige der Gattung *dōng* d. h. *Turdus*. Hingegen ist *shāndōng* (wörtlich "Bergdrossel") der Name der Gattung *Zoothera* und deshalb in einem Wort geschrieben. Namen wie *Chángzúi shāndōng* ("Langschnabel-Zoothera"), *Hǔbān shāndōng* ("Tigerstreifen-Zoothera") lassen sich somit in der Transkription als Angehörige der Gattung *shāndōng* (*Zoothera*) erkennen. Nur in sehr wenigen Ausnahmefällen ist bei mehr als viersilbigen Gattungsnamen, wenn es angemessen erschien, in der Transkription um der leichteren Lesbarkeit und des besseren Verständnisses willen vom Bindestrich Gebrauch gemacht, der die Wortgruppen zwar abtrennt, zugleich aber die enge Zusammengehörigkeit dieser Wortgruppen in der Genusbezeichnung zum Ausdruck bringen soll. So ist z. B. *Jīnbēisānzhízhuómù*, wörtlich "Goldrückendreizehenholzpicker" der chinesische Name der Gattung *Dinopium*. Obwohl für den mit chinesischen Vogelnamen Vertrauten ohne Schwierigkeit in die zusammengehörigen Gruppen abtrennbar, schreiben wir der leichteren Analyse wegen *Jīnbēi-sānzhí-zhuómù*. Gattungsnamen mit mehr als 4 Silben sind jedoch selten. Es versteht sich, daß bei volkstümlichen Namen die obigen Transkriptionsregeln für Gattungsnamen keine Anwendung finden, da ihnen die Vorstellung einer Gattung im wissenschaftlichen Sinne fremd ist. Sie werden so geschrieben, daß die zusammengehörigen Namenselemente ohne Schwierigkeit erkennbar sind.

Viele Übersetzungen, besonders auf naturwissenschaftlich-technischem Gebiet, sind heute im chinawissenschaftlichen Bereich mit den größten Schwierigkeiten verbunden, da es an Fachwörterbüchern mangelt. In diesem Sinne möchte das vorliegende chinesisch-deutsche und deutsch-chinesische Glossar der heute im wissenschaftlichen Schrifttum verwendeten Namen aller chinesischen Vogelarten einen lexikographischen Beitrag zur modernen chinesischen Sprache darstellen.

Herr Prof. Cheng Tso-hsin, Institute of Zoology, Academia Sinica, Haitien, Peking, hat mir freundlicherweise einige Anfragen in Bezug auf die unter Ornithologen heute gängige Aussprache einiger seltener Zeichen mit mehrfacher Lesung beantwortet, wofür ich an dieser Stelle aufrichtig danke.

Frau Barbara Chang, Lektorin für moderne Sprache und Literatur an der Ruhr-Universität Bochum, hat sich der Mühe der Eintragung der mehr als zehntausend Schriftzeichen unterzogen. Frau Ingeborg Schulz hat mit großer Sorgfalt die druckfertige Reinschrift meines Manuskriptes angefertigt. Beiden Mitarbeiterinnen sage ich hiermit meinen herzlichen Dank.

VORBEMERKUNG

Die chinesischen Vogelnamen sind nach der heute in der Volksrepublik China gültigen Lautschrift (pinyin) umschrieben. Die Akzente geben jeweils den Wortton an: - für den ebenen Ton, ' für den aufsteigenden Ton, ^ für den tief-aufsteigenden Ton, ` für den fallenden Ton, ° für die ohne Wortton gesprochene Silbe. - Die Vokale entsprechen im allgemeinen der deutschen Aussprache. Die Verbindung "an" wird jedoch nach i oder y wie "än" gelesen. Der Diphthong ao liest sich wie au; e am Ende eines Wortes klingt fast wie ö in "öffnen", während die Doppellaute ie und ue wie iä bzw. üä zu lesen sind; ei spricht sich wie das ay im engl. "way"; en oder eng klingen fast wie "ön" oder "öng". Nach ch oder zh ist i wie e in "wohnen" zu lesen; u nach j, q, x und y liest sich wie ü; vor a, o und i wird das u zu einem Gleitlaut w. - Die Konsonanten werden ähnlich wie im Deutschen ausgesprochen. Ausnahmen: c liest sich wie z (ts), z wie ds, ch wie tsch, zh wie dsch, j klingt wie dch, q wie tch, x wie ch in "ich"; r ähnelt der Aussprache des j in franz. "journal"; s ist immer stummlos wie in "weiß"; sh gleicht etwa dem deutschen sch. Y ist wie das deutsche j zu lesen.

Die Ziffern unter dem Namen geben den Fundort (die Belegstelle) des betreffenden Namens an. Dabei steht
die Ziffer 1 für Cheng Tso-hsin: Verbreitungsliste der chinesischen Vögel, Bd. 1, Non-Passeriformes. Peking 1955.

die Ziffer 2 für Cheng Tso-hsin: Verbreitungsliste der chinesischen Vögel, Bd. 2, Passeriformes, Peking 1958.

die Ziffer 3 für Cheng Tso-hsin et alias: Aufzeichnungen über die Vögel des Ch'in-ling Gebirges. Peking 1973.

Die genauen Titel dieser chinesisch geschriebenen Werke finden sich in den Anmerkungen 1 bzw. 6 zum Vorwort. Die auf den Doppelpunkt folgenden Ziffern geben die Seitenzahl des betreffenden Werkes an. Sind die Ziffern eingeklammert, so weist das darauf hin, daß der von uns verzeichnete wissenschaftliche (lateinische) Name von dem bei Cheng Tso-hsin für den gleichen Vogel auf der betreffenden Seite angeführten Namen abweicht oder sich inhaltlich nicht deckt. Meist kommt darin eine andere systematische Zuordnung oder Anschaufung zum Ausdruck.

Wird von uns eine Gattung aufgeteilt, so wird bei den von uns neu angeführten lateinischen Gattungsnamen, für die noch kein chinesischer Name vorhanden ist, auf den bei Tseng verzeichneten ursprünglichen,

umfassenden chinesischen Gattungsnamen mit einem Verweisungspfeil hingewiesen. In diesem Sinne bilden der chinesisch-deutsche Teil und der deutsch-chinesische Teil eine lexikographische Einheit. Natürlich dienen die Pfeile auch anderen wichtigen, ergänzenden Hinweisen.

Der Zusatz "Synonym" vor chinesischen Namen weist darauf hin, daß es für die betreffende Art im Chinesischen zwei gleichwertige Standardnamen gibt. Die gelegentliche Kürzung US bedeutet Umgangssprache.

Um dem deutschen Benutzer entgegenzukommen, sind auch sog. Sammelbezeichnungen wie Gans, Ente, Adler, Drossel, Fink, Star u. a. aufgenommen worden, wobei es sich natürlich um ganz allgemeine Bezeichnungen handelt, die eigentlich nicht in eine wissenschaftliche Liste gehören. Alle diese umfassenden Namen sind stets ausdrücklich als Sammelbezeichnung gekennzeichnet und sind nur für eine Auswahl der bekanntesten Vogelarten angeführt worden.

Die chinesischen Stichwörter im chinesisch-deutschen Teil sind in Gruppen nach ihrer ersten Silbe dem chinesischen Silbenalphabet gemäß angeordnet. Gelegentlich sind auch mehrere chinesische Silben, auf die jeweils nur wenige Stichwörter entfallen, zu einer Gruppe zusammengefasst. Sowohl die Gruppen als auch die Stichwörter innerhalb der Gruppen erscheinen in alphabetischer Reihenfolge. Dabei werden die Speciesnamen wie ein ganzes Wort behandelt; nur bei einigen, sehr wenigen Ordnungs-, Familien- und Gattungsnamen wurde davon der besseren Übersicht halber und ohne das Auffinden zu erschweren geringfügig abgewichen.

CHINESISCH-DEUTSCHES GLOSSAR

ÀIJÍ YÈYÍNG 埃及夜鶯

1:202

ĀLÁN 阿 兰

3:107

ĀN CHÚN (US Ānchún) 鹊 鸩

1:86; 3:54

ĀNHUĪ JUĀNJUÉ 暗灰鹃 鸲

2:42; 3:119

ĀNLÜ LIŪYÍNG 暗绿柳 鸲

2:284; 3:194

ĀNLÜ XIŪYÁNNIĀO 暗绿绣眼 鸟

(2:371); 3:219

ĀNMIĀN JIĀOYÍNG 暗冕 鸲 鸲

2:302

ĀNSÈ YĀQUÈ 暗 色 鸫 雀

2:192

ĀNSÈ ZHŪQUÈ 暗 色 朱 雀

2:404

ĀONÁN SHĀZHUI 澳 南 沙 锥

(1:138)

PHARAONENNACHTSCHWALBE

Caprimulgus aegyptius LichtensteinVolkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für die → FELDLERCHE, *Alauda arvensis* Linnaeus, sowie für die → KLEINE FELDLERCHE, *Alauda gulgula* Franklin. → YÚNQUÈ 云雀, → XIĀO YÚNQUÈ 小 云雀WACHTEL, *Coturnix coturnix* (Linnaeus), sowie die JAPANWACHTEL, *Coturnix japonica* Temminck et Schlegel. Synonym → CHÚN 鸩

TRAUERRAUPENFÄNGER

Coracina melaschistos (Hodgson)

GRÜNLAUBSÄNGER

Phylloscopus trochiloides (Sundevall). → LIŪCHUÀN'R 柳串儿

JAPANBRILLENVOGEL

Zosterops japonicus Temminck et Schlegel

ROSTPRINIE

Prinia rufescens (Blyth)

ZAPPEY-PAPAGEISCHNABEL (ZAPPEY-PAPAGEIMEISE)

Paradoxornis zappeyi (Thayer et Bangs)

DÜNNSCHNABELGIMPEL

Carpodacus nipalensis (Hodgson)

KREISCHBEKASSINE

Gallinago hardwickii (J.E. Gray)

	BA	BÁIBÈI JÍDÖNG 白背矶鸫 2:152	STEINRÖTEL <i>Monticola saxatilis</i> (Linnaeus)
BÁGÉ 八哥 2:85; 3:132	HAUBENMAINÄ Acriotheres cristatellus (Linnaeus)	BÁIBÈI ZHUÓMÙNIÀO 白背啄木鸟 1:233; 3:103	WEISSRÜCKENSPECHT <i>Dendrocopos leucotos</i> (Bechstein)
BÁGÉ SHÙ 八哥属 2:85	Die Gattung ACRIDOTHERES Vieillot	BÁIBÓ WŪ YĀ 白脖乌鸦 3:141	Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für die → HALSBANDKRÄHE, <i>Corvus torquatus</i> Lesson. → BAIJÍNG YĀ 白颈鴟
BĀLIÀN 巴练 3:206	Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den PARADIESSCHNÄPPER, <i>Terpsiphone paradisi</i> (Linnaeus). → SHÒUDÀI 寿带, → SHÒUDÀINIÀO 寿带鸟	BÁICHÌ DUĀNCHÌDÖNG 白翅短翅鸫 2:121	ZWERGKURZFLÜGEL <i>Brachypteryx leucophrys</i> (Temminck)
BÀSÈDÖNG KĒ 八色鸫科 2:2	Die Familie PITTIDAE (Pittas)	BÁICHÌ FÚŌU 白翅浮鸥 1:152; 3:76	WEISSFLÜGEL-SEESCHWALBE <i>Chlidonias leucopterus</i> (Temminck)
BÀSÈDÖNG SHÙ 八色鸫属 2:2	Die Gattung PITTA Vieillot	BÁICHÌ JIĀOZUIQUÈ 白翅交嘴雀 2:416	BINDENKREUZSCHNABEL <i>Loxia leucoptera</i> Gmelin
BĀSHĒNG DÙJUĀN 八声杜鹃 1:181	BRAUNBAUCHKUCKUCK <i>Cacomantis merulinus</i> (Scopoli)	BÁICHÌ NǐLÀZUÍQUÈ 白翅拟蜡嘴雀 2:427; 3:230	WACHHOLDERKERNEISSE
BĀYĀ 巴鸭 3:40	Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für die → KRICKENTE, <i>Anas crecca</i> Linnaeus. → LÜCHÌ YĀ 绿翅鸭	BÁICHÌ ZHUÓMÙNIÀO 白翅啄木鸟 1:232	<i>Mycerobas carnipes</i> (Hodgson)
BÁIBĀNCHÌ XUÉQUÈ 白斑翅雪雀 2:379	SCHNEEFINK (SCHNEESPERLING) <i>Montifringilla nivalis</i> (Linnaeus)	BÁIDÍNG HĒIYÀN'ŌU 白顶黑燕鸥 1:157	WEISSFLÜGELSPECHT <i>Dendrocopos leucopterus</i> (Salvadori)
BÁIBĀN HĒI SHÍJÍ 白斑黑石鵖 2:148	MOHRENSCHWARZKEHLCHEN <i>Saxicola caprata</i> (Linnaeus)	BÁIDÍNG JÍ 白顶即鵖 (2:151; 3:158)	NODDI <i>Anous stolidus</i> (Linnaeus)
BÁIBĀN JŪNJIÀNNIÀO 白斑军舰鸟 1:12	KLEINER FREGATTVOGEL <i>Fregata ariel</i> (G.R. Gray)	BÁIDÍNG XĪQÚ 白顶溪鸲 2:139; 3:153	NONNENSTEINSCHMÄTZER <i>Oenanthe pleschanka</i> (Lepechin)
BÁIBĀN WĒI LIŪYÍNG 白斑尾柳莺 2:288	WEISSSCHWANZ-LAUBSÄNGER <i>Phylloscopus davisoni</i> (Oates)	BÁIÉ HUÒ 白额鹱 (1:5)	WEISSKOPFSCHMÄTZER <i>Chaimarrornis leucocephalus</i> (Vigors)
	BAI	BÁIÉ QÍMÉI 白耳奇鹛 2:249	WEISSGESICHT-STURMTAUCHER <i>Calonectris leucomelas</i> (Temminck)
		BÁIÉ YÀN 白额雁 1:27	WEISSOHRTIMALIE <i>Heterophasia auricularis</i> (Swinhoe)
			BLÄSSGANS <i>Anser albifrons</i> (Scopoli)

BÁIE YÀN'ÔU 白额燕鸥	ZWERGSEESCHWALBE	BÁI HÈ 白鹤	NONNENKRANICH
1:156; 3:77	<i>Sterna albifrons</i> Pallas	1:112	<i>Grus leucogeranus</i> Pallas
BÁIFÙ DÔNG 白腹鸫	1. FAHLDROSSEL, <i>Turdus pallidus</i> Gmelin, 2. WEISSBRAUENDROSSEL, <i>Turdus obscurus</i> Gmelin, 3. ROTKOPFDROSSEL, <i>Turdus chrysolaus</i> Temminck	BÁIHÓU BĀNYÀNGJĪ 白喉斑秧鸡	HINDURALLE
(2:163; 3:162)		1:114	<i>Rallina eurizonoides</i> (Lafresnaye)
BÁIFÙ FÈNGMÉI 白腹凤鹛	GRÜNRÜCKENTIMALIE	BÁIHÓU GUĀNBĒI 白喉冠鹛	BLASSBAUCH-SCHOPFBÜLBÜL
2:236	<i>Yuhina zantholeuca</i> (Blyth)	2:48	<i>Criniger pallidus</i> Swinhoe
BÁIFÙ HÀIDIÀO 白腹海鵰	WEISSBAUCH-SEEADLER	BÁIHÓU-HÓNGTŪN BĒI 白喉红臀鵰	Pycnonotus aurigaster (Vieillot), von den meisten Autoren als Rassengruppe von <i>Pycnonotus cafer</i> (<i>Linnaeus</i>) angesehen.
1:57	<i>Haliaeetus leucogaster</i> (Gmelin)	2:57	
BÁIFÙ HĒIZHŪMÙNIÀO 白腹黑啄木鸟	WEISSBAUCH-SCHWARZSPECHT	BÁIHÓU HÓNGWĒIQÚ 白喉红尾鵰	BAUMROTSCHWANZ
1:229	<i>Dryocopus javensis</i> (Horsfield)	2:137; 3:151	<i>Phoenicurus schisticeps</i> (G.R. Gray)
BÁIFÙ JIĀOMÉI 白腹焦急鵟	SCHUPPENTIMALIE	BÁIHÓU JÍDÔNG 白喉矶鸫	AMURRÖTEL
2:178	<i>Pnoepyga albiventer</i> (Hodgson)	2:152	<i>Monticola gularis</i> (Swinhoe)
BÁIFÙ JÍNJĪ 白腹锦鵟	DIAMANTFASAN	BÁIHÓU LÍNWĒNG 白喉林鵟	WEISSKEHL-DSCHUNGELSCHNÄPPER
1:107	<i>Chrysolophus amherstiae</i> (Leadbeater)	2:306	<i>Rhinomyias brunneata</i> (Slater)
BÁIFÙ LÁN WĒNG 白腹蓝鵟	JAPANSCHNÄPPER	BÁIHÓU SHÀNWĒIWĒNG 白喉扇尾鵟	WEISSKEHL-FÄCHERSCHWANZ
(2:314; 3:202)	<i>Cyanoptila cyanomelana</i> (Temminck)	2:330	<i>Rhipidura albicollis</i> (Vieillot)
BÁIFÙ SHĀN DIĀO 白腹山鵟	HABICHTSADLER	BÁIHÓU SHÍJÍ 白喉石鵟	HODGSONSCHMÄTZER
(1:55)	<i>Hieraetus fasciatus</i> (Vieillot)	2:146	<i>Saxicola insignis</i> G.R. Gray
BÁIFÙ YUÁNWĒIHUÒ 白腹园尾鹱	BRUSTBAND-STURMVOGEL	BÁIHÓU ZÀOMÉI 白喉噪鹛	WEISSKEHLHÄHERLING
1:6	<i>Pterodroma leucoptera</i> (Gould)	2:201; 3:173	<i>Garrulax albogularis</i> (Gould)
BÁI GUÀN 白鹳	WEISSSTORCH	BÁIHUÁN 白鹳	SCHWARZHALSIBIS
1:22	<i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus)	(1:23)	<i>Threskiornis melanocephalus</i> (Latham)
BÁIGUĀN CHÁNGWĒIZHÌ 白冠长尾雉	Anderer Name für den → KÖNIGSFASAN, <i>Syrmaticus reevesii</i> (J.E. Gray). → CHÁNGWĒIZHÌ 长尾雉	BÁIHUÁN SHÙ 白鹳属	Die Gattung THRESKIORNIS G.R. Gray
3:59	WEISSHAUBENHÄHERLING	1:23	
BÁIGUĀN ZÀOMÉI 白冠噪鹛	<i>Garrulax leucolophus</i> (Hardwicke)	BÁIJIĀN DIĀO 白肩鵟	KAISERADLER
2:203	Anderer Name für das → BLÄSSHUHN, <i>Fulica atra</i> Linnaeus. Synonym → GÜDÍNGJĪ 骨顶鵟	1:54; 3:50	<i>Aquila heliaca</i> Savigny
BÁIGUDÍNG 白骨顶		BÁIJIÁ ZÀOMÉI 白颊噪鹛	WEISSWANGENHÄHERLING
1:120; 3:65		2:213; 3:177	<i>Garrulax sannio</i> Swinhoe

BÁI HÈ 白鹤	NONNENKRANICH
1:112	<i>Grus leucogeranus</i> Pallas
BÁIHÓU BĀNYÀNGJĪ 白喉斑秧鸡	HINDURALLE
1:114	<i>Rallina eurizonoides</i> (Lafresnaye)
BÁIHÓU GUĀNBĒI 白喉冠鹛	BLASSBAUCH-SCHOPFBÜLBÜL
2:48	<i>Criniger pallidus</i> Swinhoe
BÁIHÓU-HÓNGTŪN BĒI 白喉红臀鵰	Pycnonotus aurigaster (Vieillot), von den meisten Autoren als Rassengruppe von <i>Pycnonotus cafer</i> (<i>Linnaeus</i>) angesehen.
2:57	
BÁIHÓU HÓNGWĒIQÚ 白喉红尾鵰	BAUMROTSCHWANZ
2:137; 3:151	<i>Phoenicurus schisticeps</i> (G.R. Gray)
BÁIHÓU JÍDÔNG 白喉矶鸫	AMURRÖTEL
2:152	<i>Monticola gularis</i> (Swinhoe)
BÁIHÓU LÍNWĒNG 白喉林鵟	WEISSKEHL-DSCHUNGELSCHNÄPPER
2:306	<i>Rhinomyias brunneata</i> (Slater)
BÁIHÓU SHÀNWĒIWĒNG 白喉扇尾鵟	WEISSKEHL-FÄCHERSCHWANZ
2:330	<i>Rhipidura albicollis</i> (Vieillot)
BÁIHÓU SHÍJÍ 白喉石鵟	HODGSONSCHMÄTZER
2:146	<i>Saxicola insignis</i> G.R. Gray
BÁIHÓU ZÀOMÉI 白喉噪鹛	WEISSKEHLHÄHERLING
2:201; 3:173	<i>Garrulax albogularis</i> (Gould)
BÁIHUÁN 白鹳	SCHWARZHALSIBIS
(1:23)	<i>Threskiornis melanocephalus</i> (Latham)
BÁIHUÁN SHÙ 白鹳属	Die Gattung THRESKIORNIS G.R. Gray
1:23	
BÁIJIĀN DIĀO 白肩鵟	KAISERADLER
1:54; 3:50	<i>Aquila heliaca</i> Savigny
BÁIJIÁ ZÀOMÉI 白颊噪鹛	WEISSWANGENHÄHERLING
2:213; 3:177	<i>Garrulax sannio</i> Swinhoe
BÁIJÍLÍNG 白鹤鸽	BACHSTELZE
2:34; 3:115	<i>Motacilla alba</i> Linnaeus

BÁIJÍNG CHÁNGWÉIZHÌ 白颈长尾雉

1:107

BÁIJÍNG DÖNG 白颈鵠

2:160

BÁIJÍNG YĀ 白颈鶲

2:108; 3:141

BÁIKUÀNG QUÈMÉI 白眶雀鹛

2:244; 3:182

BÁIKUÀNG YÀQUÈ 白眶鸦雀

2:189; 3:170

BÁI LÀOGUĀN 白老冠

(3:34)

BÁILIĀN SHĀNQUÈ 白脸山雀

2:331

BÁILIĀN SHÍ 白脸鵙

2:350

BÁILÍNG 百灵

2:10

BÁILÍNG BÀGĒ 白领八哥

2:86

BÁILÍNG FĚICUÌ 白领翡翠

1:214

BÁILÍNG FÈNGMÉI 白领凤鹛

2:234; 3:180

BÁILÍNG HÉNG 白领鸽

1:127

ELLIOTFASAN

Syrmaticus ellioti (Swinhoe)

WEISSHALSAMSEL

Turdus albocinctus Royle

HALSBANDKRÄHE

Corvus torquatus Lesson

GRAUAUGENALCIPPE

Alcippe morrisonia Swinhoe

BRILLEN-PAPAGEISCHNABEL (BRILLEN-PAPAGEIMEISE)

Paradoxornis conspicillatus (David)

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → SILBERREIHER, *Casmerodius albus* (Linnaeus).
→ DÀ BÁILÙ 大白鹭

KOHLMEISE, *Parus major* Linnaeus.
Synonym → DÀ SHĀNQUÈ 大山雀

WEISSWANGENKLEIBER

Sitta leucopsis Gould

MONGOLENLERCHE

Melanocorypha mongolica (Pallas)

HALSBANDMAINÄ

Acridotheres albocinctus Godwin-Austen et Walden

GRÜNKOPFLIEST

Halcyon chloris (Boddaert)

DIADEMUYHINA

Yuhina diademata Verreaux

Ein anderer Name für den → SEERE-RENPFEIFER, *Charadrius alexandrinus* Linnaeus. Synonym → HUÁNJÍNG HÉNG

BÁILÍNG KĒ 百灵科

2:5; 3:106

BÁILÍNG SHŪ 百灵属

2:9

BÁILÙ 白鹭

1:16; 3:34

BÁILÙ SHŪ 白鹭属

(1:15)

BÁIMÉI DÌDÖNG 白眉地鸫

(2:156; 3:160)

BÁIMÉI LÁN WĒNG 白眉蓝鹟

2:312

BÁIMÉI LÍN QÚ 白眉林鵙

2:132

BÁIMÉI QUÈMÉI 白眉雀鹛

2:238

BÁIMÉI SHĀNQUÈ 白眉山雀

2:343

BÁIMÉI SHÀNWĒIWĒNG 白眉扇尾鹟

2:330

BÁIMÉI WĒNG 白眉鹟

2:307; 3:199

BÁIMÉI WŪ 白眉鵙

2:443

BÁIMÉI YĀ 白眉鶲

1:33; 3:43

BÁIMÉI ZHŪQUÈ 白眉朱雀

2:410

BÁI PÍLÙ 白琵鹭

1:25

Die Familie ALAUDIDAE (Lerchen)

Die Gattung MELANOCORYPHA Boie

SEIDENREIHER

Egretta garzetta (Linnaeus)

Die Gattungen EGRETTA T. Forster und CASMERODIUS Gloger

SCHIEFERDROSSEL (SIBIRISCHE DROSEL)

Cryptocichla sibirica (Pallas)

BRAUENSCHNÄPPER

Ficedula superciliaris (Jerdon)

WEISSBRAUEN-BLAUSCHWANZ

Tarsiger indicus (Vieillot)

WEISSBRAUENALCIPPE

Alcippe vinipectus (Hodgson)

WEISSBRAUENMEISE

Parus superciliosus (Przevalski)

WEISSBRAUEN-FÄCHERSCHWANZ

Rhipidura aureola Lesson

KOREAGOLDSCHNÄPPER

Ficedula zanthopygia (Hay)

TRISTRAMAMMER

Emberiza tristrami Swinhoe

KNÄKENTE

Anas querquedula Linnaeus

THURAGIMPEL (WALDGIMPEL)

Carpodacus thura Bonaparte et Schlegel

LÖFFLER

Platalea leucorodia Linnaeus

BÁITÓU BÉI 白头鵠	1:8
BÁITÓU BÉI 白头鵠	2:56; 3:122
BÁITÓU HÈ 白头鵠	1:111
BÁITÓUJUÉMÉI 白头鵠鵠	2:226
BÁITÓUJUÉMÉI SHǔ 白头鵠鵠属	2:226
BÁITÓU WŪ 白头鵠	2:430; 3:231
BÁITÓU YÀN 白头雁	3:39
BÁITÓU YÀO 白头鵠	1:62
BÁIWĒIBÀ YÜYÀN 白尾巴雨燕	3:96
BÁIWĒI DÌQÚ 白尾地鸫	(2:141; 3:155)
BÁIWĒI DÌYĀ 白尾地鸫	2:100
BÁIWĒI HÀIDIĀO 白尾海鵠	1:57
BÁIWĒI MÉNG 白尾鵠	1:8

ROSAPELIKAN	
Pelecanus onocrotalus Linnaeus	
CHINESENBÜLBÜL	
Pycnonotus sinensis (Gmelin)	
MÖNCHSKRANICH	
Grus monacha Temminck	
WEISSKOPFTIMALIE	
Gampsorhynchus rufulus Blyth	
Die Gattung GAMPSORHYNCHUS Blyth	
FICHTENAMMER	
Emberiza leucocephalos S.G. Gmelin	
Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für die → STREIFENGANS, Anser indicus (Latham). → BĀNTÓU YÀN 斑头雁	
ROHRWEIHE	
Circus aeruginosus (Linnaeus)	
Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → PAZIFIKSEGLER, Apus pacificus (Latham). → BÁIYĀO YÜYÀN 白腰雨燕	
SCHATTENSCHMÄTZER	
Cinclidium leucurum (Hodgson)	
WEISSCHWANZHÄHER	
Podoces biddulphi Hume	
SEEADLER	
Haliaeetus albicilla (Linnaeus)	
WEISSCHWANZ-TROPIKVOGEL	
Phaethon lepturus Daudin	

BÁIWĒISHĀO HÓNGZHÌ 白尾梢虹雉	1:94	WEISSCHWANZ-GLANZFASAN
BÁIWĒI SHĪ 白尾鶲	2:352	Lophophorus sclateri Jerdon
BÁIWĒI YÀO 白尾鵠	1:61; 3:50	WEISSCHWANZKLEIBER
BÁIXIÁN 白鹇	1:98	Sitta himalayensis Jardine et Selby
BÁIXIÖNG FĚICUÌ 白胸翡翠	1:213	KORNWEIHE
BÁIXIÖNG KÜÈNIÀO 白胸苦恶鸟	(1:117); 3:64	Circus cyaneus (Linnaeus)
BÁIYĀN KUÁNGYÍNG 白眼莺鷹	1:51	SILBERFASAN
BÁIYÀN' ŌU 白燕鸥	1:158	Lophura nycthemera (Linnaeus)
BÁIYÀN' ŌU SHǔ 白燕鸥属	1:158	BRAUNLIES
BÁIYÀN QIÁNYĀ 白眼潜鴨	1:35; 3:43	Halcyon smyrnensis (Linnaeus)
BÁIYĀN'R 白眼儿	3:219, 220	WEISSBRUST-KIELRALLE
BÁIYĀO Cǎo Yù 白腰草鶲	1:134; 3:71	Amaurornis phoenicurus (Pennant). Synonym → KÜÈNIÀO 苦恶鸟
BÁIYĀO CHĀWĒIHÀIYÀN 白腰叉尾海燕	1:7	WEISSAUGENTEEZA
		Butastur teesa (Franklin)
		FEENSEESCHWALBE
		Gygis alba (Sparrman)
		Die Gattung GYGIS Wagler
		MOORENTE
		Aythya nyroca (Güldenstädt)
		Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) 1. für den → JAPANBRILLEN-VOGEL, Zosterops japonicus Temminck et Schlegel, → ÀNLÜ XIÙYÀNNIÀO 暗绿绣眼鸟 2. für den → ROTFLANKEN-BRILLENVOGEL, Zosterops erythropleurus Swinhoe, → HÓNGXIÉ XIÙYÀNNIÀO 红胁绣眼鸟
		WALDWASSERLÄUFER
		Tringa ochropus Linnaeus
		WELLENLÄUFER
		Oceanodroma leucorhoa (Vieillot)

BÁIYĀO QUÈQUÍ 白腰鹊鸲
2:133

BÁIYĀO SHÁOYÚ 白腰杓鹬
1:132

BÁIYĀO WÉNNIÀO 白腰文鸟
2:386

BÁIYĀO XUĚQUÈ 白腰雪雀
2:381

BÁIYĀO YŪYÀN 白腰雨燕
1:206

BÁIYĀO ZHŪDÌNGQUÈ 白腰朱顶雀
(2:393)

BÁIYÍBÀ YŪYÀN 白尾巴雨燕
3:96

BÁIZHĒN HÈ 白枕鹤
1:111

BÁIZUǐ QIÁNNIÀO 白嘴潜鸟
1:2

BAN

BĀNBÈI DÀWÉIYÍNG 斑背大尾莺
2:263

BĀNBÈI QIÁNYÀ 斑背潜鸭
1:36

SCHAMA
Copsychus malabaricus (Scopoli)

GROSSER BRACHVOGEL
Numenius arquata (Linnaeus)

SPITZSCHWANZ-BRONZEMÄNNCHEN
Lonchura striata (Linnaeus). - Aus ihm züchtete man in China und Japan seit Jahrhunderten als Haustier das "Japanische Möwchen."

TACZANOWSKI-SCHNEEFINK (TACZANOWSKI-SCHNEESPERLING)

Montifringilla taczanowskii (Przevalski)

PAZIFIKSEGLER
Apus pacificus (Latham)

BIRKENZEISIG
Acanthis flammea (Linnaeus)

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → PAZIFIKSEGLER, *Apus pacificus* (Latham). → BÁIWÉI-BÀ YŪYÀN, → BÁIYĀO YŪYÀN 白腰雨燕

WEISSNACKENKRANICH
Grus vipio Pallas

GELBSCHNABEL-EISTAUCHER (TUNDRA-TAUCHER)
Gavia adamsii (G.R. Gray)

RIEDSÄNGER
Megalurus pryeri Seebohm

BERGENTE
Aythya marila (Linnaeus)

BĀNBÈI YÀNWÉI 斑背燕尾
2:145

BĀNBÈI ZÀOMÉI 斑背噪眉鸟
2:208; 3:176

BĀNCHÌ FÈNGTÓUJUĀN 斑翅凤头鹃
1:175

BĀNCHÌ LIÁOMÉI 斑翅鹩鹛
2:177; 3:167

BĀNCHIMÉI SHÙ 斑翅鹛属
2:226

BĀNCHÌ NÍLÀZUÍQUÈ 斑翅拟蜡嘴雀
2:427

BĀNCHÌ SHĀNCHÚN 斑翅山鹑
1:83

BĀNCHÌ ZHŪQUÈ 斑翅朱雀
2:413; 3:226

BĀNDIĀN GĒ 斑点鸽
1:167; 3:80

BĀN DÖNG 斑鸽
2:164; 3:163

BĀNFÙ YÈLÜ 斑腹夜鹭
1:18

BĀNHĀIQÜE 斑海雀
1:159

BĀNHĀIQÜE SHÙ 斑海雀属
1:158

BĀNHÓU XĪMÉI 斑喉希鹛
2:230

FLECKSCHERENSCHWANZ
Enicurus maculatus Vigors

WELLENHÄHERLING
Garrulax lunulatus (Verreaux)

JAKOBINERKUCKUCK
Clamator jacobinus (Boddaert)

BINDEN-ZAUNKÖNIGTIMALIE
Spelaeornis troglodytoides (Verreaux)

Die Gattung ACTINODURA Gould

FLECKENKERNBEISSEN
Mycerobas melanozanthos (Hodgson)

BARTREBUHN
Perdix dauuricae (Pallas)

BINDENGIMPEL
Carpodacus trifasciatus Verreaux

SCHWARZSCHNABEL-OLIVENTAUBE
Columba hodgsonii Vigors

NAUMANNDROSSEL (incl. ROSTFLÜGEL-DROSSEL)
Turdus naumanni Temminck

HAINANREIHER
Oroanassa magnifica (Ogilvie-Grant)

MARMELALK
Brachyramphus marmoratus (Gmelin)

Die Gattung BRACHYRAMPHUS Brandt

BÄNDERSIVA
Minla strigula (Hodgson)

BĀNJĪNG SUÌMÉI 斑颈穗鹛
2:182

BĀNJIŪ (1) 斑鳩
1:168

BĀNJIŪ (2) 斑鳩
3:80; 3:81

BĀNJIŪ SHǔ 斑鳩属
1:168

BĀN LIÁNGNIÃO 斑椋鸟
(2:84)

BĀNLIĀN HÀIFĀNYĀ 斑脸海番鸭
1:38

BÀNPŪYÙ 半蹼鹬
1:137

BÀNPŪYÙ KĒ 翅瓣蹼鹬科
1:145

BÀNPŪYÙ SHǔ 翅瓣蹼鹬属
1:145

BÀNPŪYÙ SHǔ 半蹼鹬属
1:136

BĀNTÓU DÀ CUÌNIÃO 斑头大翠鸟
1:211

BĀNTÓU LÚCÍ 斑头鸬鹚
(1:10)

BĀNTÓU QIŪSHĀYĀ 斑头秋沙鸭
(1:39; 3:44)

FLECKENHALS-BAUMTIMALIE
Stachyris striolata (Müller)

TURTELTAUBE
Streptopelia turtur (Linnaeus)

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) 1. für die → MEENATAUBE, *Streptopelia orientalis* (Latham), → SHĀN BĀNJIŪ 山斑鳩 2. für die → TÜRKENTAUBE, *Streptopelia decaocto* (Frivaldszky), → HUĪ BĀN-JIŪ 灰斑鳩

Die Gattung STREPTOPELIA Bonaparte

ELSTERSTAR
Sturnopastor contra (Linnaeus)

HÖCKERSCHNABELENTE
Melanitta deglandi (Bonaparte)

STEPPENSCHLAMMLÄUFER
Limnodromus semipalmatus (Blyth)

Die Familie PHALAROPODIDAE (Wasser-treter)

Die Gattung PHALAROPUS Brisson

Die Gattung LIMNODROMUS Wied

HERKULESEISVOGEL
Alcedo hercules Laubmann

JAPANKORMORAN
Phalacrocorax capillatus (Temminck et Schlegel)

ZWERGSÄGER
Mergellus albellus (Linnaeus)

BĀNTÓU YÀN 斑头雁
1:28; 3:39

BĀNWĒI CHÉNGYÙ 斑尾塍鹬
1:133

BĀN WĒNG 斑翁鸟
2:321

BĀN WÉNNIÃO 斑文鸟
2:387

BĀNXIÉ JĪMÉI 斑胁姬鹟
2:223

BĀNXIĀNIAO 斑犀鸟
(1:219)

BĀNXIĀNIAO SHǔ 斑犀鸟属
1:218

BĀNXIŌNG DUĀNCHIYÍNG 斑胸短翅莺
2:258; 3:187

BĀNXIŌNG TIÁNJÍ 斑胸田鸡
1:116

BĀNXIŌNG WĒNG 斑胸鹟
2:323

BĀNXIŌNG ZÀOMÉI 斑胸噪鹛
2:211

BĀNYĀNGJÍ 斑秧鸡
1:114

BĀNYĀNGJÍ SHǔ 斑秧鸡属
1:114

BĀNYĀO YÀN 斑腰燕
(2:23)

BĀN YÚGŌU 斑魚狗
1:210

STREIFENGANS
Anser indicus (Latham)

PFUHLSCHNEPFE
Limosa lapponica (Linnaeus)

GRAUSCHNÄPPER
Muscicapa striata (Pallas)

MUSKATFINK (MUSKATAMADINE)
Lonchura punctulata (Linnaeus)

CUTIA
Cutia nipalensis Hodgson

TRAUERHORNVOGEL
Anthracoceros coronatus (Boddaert)

Die Gattung ANTHRACOCEROS Reichenbach

FLECKENBUSCHSÄNGER
Bradypterus thoracicus (Blyth)

TÜPFELSUMPFHUHN
Porzana porzana (Linnaeus)

FLECKENSCHNÄPPER
Muscicapa griseisticta (Swinhoe)

FLECKENHÄHERLING
Garrulax merulinus Blyth

MALAIENRALLE
Rallina fasciata (Raffles)

Die Gattung RALLINA G.R. Gray

STRICHELSCHWALBE
Cecropis striolata (Temminck et Schlegel)

GRAUFISCHER
Ceryle rudis (Linnaeus)

BĀN ZHUÓMÙNIÀO 斑啄木鸟

1:230

BĀNZUÍ TÍHÚ 斑嘴鹈鹕

1:8

BĀNZUÍ YĀ 斑嘴鸭

1:32; 3:42

BUNTSPECHT

Dendrocopos major (Linnaeus). Synonym → DÀ BĀN ZHUÓMÙNIÀO 大斑啄木鸟

GRAUPELIKAN

Pelecanus philippensis Gmelin

FLECKSCHNABELENTE

Anas poecilorhyncha J.R. Forster

BAO

BĀOGŪ QUÈ 包谷雀

3:85

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → KUCKUCK, Cuculus canorus Linnaeus. → DÙJUĀN 杜鹃

Die Familie OTIDIDAE (Trappen)

BĀO KĒ 鹳科

1:120

BĀO SHǔ 鹳属

(1:120)

BĀOXÍNG GĒ DÔNG 宝兴歌鶲

2:166; 3:164

Die Gattungen TETRAX T. Forster, CHLAMYDOTIS Lesson und OTIS Linnaeus

Anderer Name für die → MUPINDROSEL, Turdus mupinensis Laubmann. → GĒ DÔNG 歌鶲

BĀOXÍNG MÉIQUÈ 宝兴鹛雀

2:186

MUPINIE

Chrysomma poecilotis (Verreaux)

Die Ordnung OTIDIFORMES (Trappen)

BĀO-XÍNG MÙ 鹫形目

1:120

BEI

BĒI DÌQUÈ 北地雀

2:399

GRAUKOPF-SCHNEEGIMPEL

Leucosticte arctoa (Pallas)

TACZANOWSKI BUSCHSÄNGER

Bradypterus tacsanowskii (Swinhoe)

BĒI HÓNGWÉIQÚ 北红尾鸲

2:137; 3:152

BĒI HUÁNGYÍNG 北煌莺

2:264

BĒI HUÍ WĒNG 北灰翁

2:323; 3:204

BĒIJÍNG YŪYÀN 北京雨燕

1:205

BĒI KĒ 鹳科

2:48; 3:121

BĒI LIÁNGNIÀO 北椋鸟

(2:81; 3:130)

BĒI LÍNXIÀO 北林鸮

1:197

BĒI LIÙ 北鷦鷯

2:29

BĒI SHǔ 鹳属

2:53

BĒI XIŪLIÚ 北鳩鶲

1:191

BĒI ZÀOYÀ 北噪鸦

2:88

BĒI ZHŪQUÈ 北朱雀

2:413; 3:226

SPIEGELROTSCHWANZ

Phoenicurus auroreus (Pallas)

MIDDENDORFFSCHWIRL

Locustella ochotensis (Middendorff)

Muscicapa davurica Pallas, heute als Rasse des → BRAUNSCHNÄPPER, Muscicapa latirostris Raffles, angesehen. → HUÍ WĒNG 灰翁, → KUÒ-ZUÍ WĒNG 阔嘴翁

Apus apus pekinensis (Swinhoe), eine Rasse des → MAUERSEGLER, Apus apus (Linnaeus). Synonym → LÓUYÀN 楼燕. - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) → YĚYÀN 野燕

Die Familie PYCNONOTIDAE (Bülbüls)

MONGOLENSTAR

Sturnia sturnina (Pallas)

HABICHTSKAUZ

Strix uralensis Pallas

PETSCHORAPIEPER

Anthus gustavi Swinhoe

Die Gattung PYCNONOTUS Boie

SPERLINGSKAUZ

Glaucidium passerinum (Linnaeus)

UNGLÜCKSHÄHER

Perisoreus infaustus (Linnaeus)

ROSENGIMPEL

Carpodacus roseus (Pallas)

	BIAN-BIN	CĀIGUÀN SHŪ 彩鹤属 1:21	Die Gattung IBIS Lacépède
BIĀNZUIHĀIQÜE	扁嘴海雀	SILBERALK <i>Synthliboramphus antiquus</i> (Gmelin)	
1:159			
BIĀNZUIHĀIQÜE SHŪ	扁嘴海雀属	Die Gattung SYNTHLIBORAMPHUS Brandt	Die Gattung PLEGADIS Kaup
1:159			
BĪNYÙ SHŪ	滨鹬属	Die Gattung CALIDRIS Merrem	GOLDSCHNEPFE <i>Rostratula benghalensis</i> (Linnaeus)
1:140			Die Familie ROSTRATULIDAE (Gold-schnepfen)
	BO		Die Gattung ROSTRATULA Vieillot
BŌBĀN BĀO	波斑鸨	KRAGENTRAPPE <i>Chlamydotis undulata</i> (Jacquin)	CANG
1:122			FISCHREIHER (GRAUREIHER) <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus
BÓLÁO KĒ	伯劳科	Die Familie LANIIDAE (Würger)	RIESENSCHWIRL <i>Locustella fasciolata</i> (Gray)
2:65; 3:124			HABICHT <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus)
BÓLÁO SHŪ	伯劳属	Die Gattung LANIUS Linnaeus	CAO
2:65			PURPURREIHER <i>Ardea purpurea</i> Linnaeus
	BU		Die Gattung BABAX David
BŪGŪ	布谷	Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → KUCKUCK, <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus. → DŪJUĀN 杜鹃	ERDEULE <i>Tyto longimembris</i> (Jerdon)
3:85			
BŪZHŪNIĀO SHŪ	捕蛛鸟属	Die Gattung ARACHNOTHERA Temminck	
2:370			
	CAI		
CĀIGUÀN	彩鹤	BRUSTBAND-NIMMERSATT <i>Ibis leucocephalus</i> (Pennant)	
1:21			
CĀIHUÁN	彩鹤		
1:24			
CĀIHUÁN SHŪ	彩鹤属		
1:24			
CĀIYÙ	彩鶲		
1:123; 3:67			
CĀIYÙ KĒ	彩鶲科		
1:122; 3:67			
CĀIYÙ SHŪ	彩鶲属		
1:122			
CĀNG LÙ	苍鹭		
1:12; 3:31			
CĀNGMÉI HUÁNGYÍNG	苍眉蝗莺		
2:266			
CĀNG YÍNG	苍鹰		
1:44			
CĀO LÙ	草鹭		
1:12; 3:32			
CĀOMÉI SHŪ	草鹛属		
2:198			
CĀOXIĀO	草鸮		
1:184			

Cǎoxiāo Kē 草鸮科	Die Familie TYTONIDAE (Schleier-eulen)
1:183	
Cǎoxiāo Shǔ 草鸮属	Die Gattung TYTO Billberg
1:183	
Cǎoyīng 草莺	BENGALENGRASSÄNGER <i>Graminicola bengalensis</i> Jerdon
2:301	
Cǎoyīng Shǔ 草莺属	Die Gattung GRAMINICOLA Jerdon
2:301	
Cǎoyuán Diāo 草原雕	STEPPENADLER <i>Aquila nipalensis</i> (Hodgson)
1:55	
Cǎoyuán Yào 草原鵟	STEPPENWEIHE <i>Circus macrourus</i> (Gmelin)
1:61	
CHA	
CHĀWÉIHÁIYÀN Shǔ 叉尾海燕属	Die Gattung OCEANODROMA Reichenbach
1:7	
CHĀWÉI TÀIYÁNGNIÀO 叉尾太阳鸟	HAINANNEKTARVOGEL <i>Aethopyga christinae</i> Swinhoe
2:369	
CHANG	
CHÁNG ĚRXIÀO 长耳鸮	WALDOHREULE <i>Asio otus</i> (Linnaeus)
1:199; 3:95	
CHÁNGJIĀOYĀNGJĪ 长脚秧鸡	WACHTELKÖNIG <i>Crex crex</i> (Linnaeus)
1:115	
CHÁNGJIĀOYĀNGJĪ Shǔ 长脚秧鸡属	Die Gattung CREX Bechstein
1:115	
CHÁNGJIĀOYÙ Shǔ 长脚鹬属	Die Gattung HIMANTOPUS Brisson
1:144	

CHÁNGWÉI FÉNGYÈYÍNG 长尾缝叶莺	Andere Bezeichnung für den → LANG-SCHWANZ-SCHNEIDERVOGEL, <i>Orthotomus sutorius</i> (Pennant). → FÉNGYÈYÍNG 缝叶莺
2:298	
CHÁNGWÉI HUÍ BÓLÁO 长尾灰伯劳	Anderer Name für den → KEILSCHWANZ-WÜRGER, <i>Lanius sphenocercus</i> Cabanis. → XIĒWÉI BÓLÁO 楔尾伯劳
3:126	
CHÁNGWÉI KUÒZUÍNIÀO 长尾阔嘴鸟	LANGSCHWANZ-BREITMAUL <i>Psarisomus dalhousiae</i> (Jameson)
2:2	
CHÁNGWÉI LIÁOMÉI 长尾鹩鹛	LANGSCHWANZ-ZAUNKÖNIGTIMALIE <i>Spelaeornis chocolatinus</i> (Godwin-Austen et Walden)
2:178	
CHÁNGWÉI QUÈ 长尾雀	MEISENGIMPEL <i>Carpodacus sibiricus</i> (Pallas)
(2:417; 3:227)	
CHÁNGWÉI QUÈ Shǔ 长尾雀属	Die Gattung URGAG Keyserling et Blasius (richtiger als Untergattung der Gattung <i>Carpodacus</i> Kaup anzusehen, wenn diese in ihrem weiten Umfang aufrecht erhalten bleibt).
2:417	
CHÁNGWÉI SHĀNDŌNG 长尾山杓	LANGSCHWANZ-BERGDROSSEL <i>Zoothera dixoni</i> (Seeböhm)
2:167	
CHÁNGWÉI SHĀNJIĀONIÀO 长尾山椒鸟	LANGSCHWANZ-MENNIGVOGEL <i>Pericrocotus ethologus</i> Bangs et Phillips
2:46; 3:120	
CHÁNGWÉISHĀNQUÈ Shǔ 长尾山雀属	Die Gattung AEGITHALOS Hermann
2:346	
CHÁNGWÉIYĀ 长尾鸭	EISENTE <i>Clangula hyemalis</i> (Linnaeus)
1:39	
CHÁNGWÉIYĀ Shǔ 长尾鸭属	Die Gattung CLANGULA Leach
1:38	
CHÁNGWÉI YÈYÍNG 长尾夜鹰	LANGSCHWANZ-NACHTSCHWALBE <i>Caprimulgus macrurus</i> Horsfield
1:202	

CHÁNGWÉI YÍNGWǔ 长尾鸚鵡
1:174

CHÁNGWÉIZHÌ 长尾雉
1:107; (3:59)

CHÁNGWÉIZHÌ SHǔ 长尾雉属
1:106

CHÁNGZHǐ BÍNYù 长趾滨鹬
1:141; 3:73

CHÁNGZUǐ BÀILÍNG 长嘴百灵
2:9

CHÁNGZUǐ GŌUZUİMÉI 长嘴钩嘴鹛
2:174

CHÁNGZUǐ HÉNG 长嘴鸻
(1:126; 3:69)

CHÁNGZUǐ SHĀNDÖNG 长嘴山鹛
2:168

CHENG

CHÉNGBĀNCHÌ LIÜYÍNG 橙斑翅柳莺
2:279; 3:192

CHÉNGBÈI YĀQUÈ 橙背鸦雀
3:172

CHÉNGCHÌ ZÀOMÉI 橙翅噪鹛
3:178

LANGSCHWANZSITTICH
Psittacula longicauda (Boddaert)

KÖNIGSFASAN
Syrmaticus reevesii (J.E. Gray).
Synonym → BÁIQUĀN CHÁNGWÉIZHÌ 白冠长尾雉.

Die Gattung *SYRMATICUS* Wagler

LANGZEHEN-STRANDLÄUFER
Calidris subminuta (Middendorff)

SUMPFLERCHE
Melanocorypha maxima Blyth

LANGSCHNABELSÄBLER
Pomatorhinus hypoleucus (Blyth)

Anderer Name für den → LANGSCHNABEL-REGENPFEIFER, *Charadrius placidus* J.E. et G.R. Gray. Synonym → JIĀN HÉNG 剑鸻

LANGSCHNABELDROSSEL
Zoothera marginata Blyth

CHÉNGFÙ YÈBĒI 橙腹叶鹎
2:62

CHÉNGTÓU DÌDÖNG 橙头地鸫
2:157

CHÉNGXIÖNG SHĀNJIŪ 橙胸山鸠
1:163

CHÉNGXIÖNG WĒNG 橙胸翁
(2:310; 3:200)

CHÉNGYÙ SHǔ 胜鶲属
1:132

BLAUBART-BLATTVOGEL
Chloropsis hardwickii Jardine et Selby

DAMADROSSEL
Geokichla citrina (Latham)

BINDENGRÜNTAUBE
Treron bicincta (Jerdon)

ZIMTKEHLSCHNÄPPER
Siphia strophiata Hodgson

Die Gattung *LIMOSA* Brisson

CHI

SCHNATTERENTE
Anas strepera Linnaeus → ZÍBĀNG YĀ 紫膀鸭

ROTFLÜGELGIMPEL
Rhodopechys sanguinea (Gould)

FEUERLIESST
Halcyon coromanda (Latham)

CHINESENSCHIKRA
Accipiter soloensis (Horsfield)

SCHARLACHMENNIGVOGEL
Pericrocotus flammeus (Forster)

BECHSTEINDROSSEL (ROTKEHLDROSSEL und SCHWARZKEHLDROSSEL)
Turdus ruficollis Pallas

SARUSKRANICH
Grus antigone (Linnaeus)

GOLDBINDEN-LAUBSÄNGER
Phylloscopus pulcher Blyth.
→ LIÜCHUÀN'R 柳串儿

GRAUOHР-PAPAGEISCHNABEL (GRAUOHР-PAPAGEIMEISE)
Paradoxornis nipalensis (Hodgson)

ELLIOTHÄHERLING
Garrulax elliotii (Verreaux). Synonym → YÍSHÌ ZÀOMÉI 橙翅噪鹛

CHÌBĀNG YĀ 赤膀鸭
3:43

CHÌCHÌ SHĀQUÈ 赤翅沙雀
2:400

CHÌ FĚICUÌ 赤翡翠
1:212

CHÌFÙ YÍNG 赤腹鹰
1:46; 3:46

CHÌHÓNG SHĀNJIAONIÃO 赤红山椒鸟
2:47

CHÌJÍNG DÖNG 赤颈鸫
2:164; 3:162

CHÌJÍNG HÈ 赤颈鹤
1:112

CHÌJÍNG PÌTĪ 赤颈鶲鷺
(1:4)

CHÌJÍNG YĀ 赤颈鴨
1:33; 3:43

CHÍLÙ 池鷺
1:14; 3:33

CHÍLÙ SHǔ 池鷺屬
1:14

CHÌ MÁYĀ 赤麻鴨
1:30; 3:39

CHÌWÉI ZÀOMÉI 赤尾噪鶲
2:218

CHÍXIĀO KĒ 鸱鶲科
1:184; 3:88

CHÌXIōNG HUīQUÈ 赤胸灰雀
2:421; 3:228

CHÌXIōNG NǐZHŪMÙ 赤胸拟啄木
1:221

CHÌXIōNG Wū 赤胸鹀
2:440; 3:236

CHÌXIōNG ZHŪDǐNGQUÈ 赤胸朱顶雀
(2:396)

CHÌXIōNG ZHUóMÙNIǎO 赤胸啄木鸟
1:234; 3:104

CHÌ ZHŪQUÈ 赤朱雀
2:405

CHÌZUI-QIÁNYĀ 赤嘴潜鸭
1:34

ROTHALSTAUCHER
Podiceps grisegena (Boddaert)

PFEIFENTE
Anas penelope Linnaeus

BACCHUSREIHER
Ardeola bacchus (Bonaparte)

Die Gattung ARDEOLA Boie

ROSTGANS
Casarca ferruginea (Pallas)

ROTSCHWANZHÄHERLING
Garrulax milnei (David)

Die Familie STRIGIDAE (Eigentliche
Eulen)

MASKENGIMPEL
Pyrrhula erythaca Blyth

KUPFERSCHMIED (ROTSCHEITEL-BART-
VOGEL)
Megalaima haemacephala (P.L.S.
Müller)

GRAUKOPFAMMER (BRAUNOHRAMMER)
Emberiza fucata Pallas

HÄNFLING (BLUTHÄNFLING)
Linaria cannabina (Linnaeus)

ROTBRUSTSPECHT
Dendrocopos catpharius (Blyth)

BLANFORDGIMPEL
Carpodacus rubescens (Blanford)

KOLBENENTE
Netta rufina (Pallas)

CHÌZUI-QIÁNYĀ SHǔ 赤嘴潜鸭属
1:34

CHÒU PÓNIÁNG 臭婆娘
3:100

CHŌUYĀ 丑鴞
1:38

CHŌUYĀ SHǔ 丑鴞属
1:38

Die Gattung NETTA Kaup
1:34

CHOU

Volkstümliche Bezeichnung (in S-
Shensi) für den → WIEDEHOPF, *Upupa*
epops Linnaeus. → DÀISHÈNG 戴胜

KRAGENENTE
Histrionicus histrionicus (Lin-
naeus)

Die Gattung HISTRIONICUS Lesson

CHUAN

Volkstümliche Bezeichnung (in S-
Shensi) für die → NAUMANNROSSEL,
Turdus naumanni Temminck. → BĀN
DÖNG 斑鶲

Volkstümliche Bezeichnung (in S-
Shensi) für den → KLEIBER, *Sitta*
europaea Linnaeus. → PŪTōNG SHī
普通鶲

CHUN

Anderer Name für die → WACHTEL,
Coturnix coturnix (Linnaeus), so-
wie die → JAPANWACHTEL, *Coturnix*
japonica Temminck et Schlegel.
→ ĀN CHÚN 鹧鸪

CHÚNLÁN WĒNG 纯蓝鹟
(2:318)
CHÚNSÈ ZÀOMÉI 纯色噪鹛
2:214
CHÚNSÈ ZHUÓHUĀNIĀO 纯色啄花鸟
2:361

CHÚN SHǔ 鸲属
1:86

CUÌ JÍNJUĀN 翠金鹃
(1:181)

CUÌNIĀO 翠鸟
1:211

CUÌNIĀO KĒ 翠鸟科
1:209; 3:97

CUÌNIĀO SHǔ 翠鸟属
1:211

CUÌQIĀO'R 翠雀儿
3:98

DÀ BÁIÉ 大白鹅
3:39

BLAUBRUSTSCHNÄPPER
Cyornis unicolor Blyth
GOLDSCHWINGENHÄHERLING
Garrulax subunicolor (Blyth)
MALABAR-MISTELFRESSER (MALABAR-BLÜTENPICKER)
Dicaeum concolor Jerdon
Die Gattung *COTURNIX* Bonnaterre

CUI

PRACHTKUCKUCK
Chrysococcyx maculatus (Gmelin)
EISVOGEL
Alcedo atthis (Linnaeus). Synonym
→ PŪTōNG CUÌNIĀO 普通翠鸟
Die Familie *ALCEDINIDAE* (Eisvögel)
Die Gattung *ALCEDO* Linnaeus
Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → EISVOGEL, *Alcedo atthis* (Linnaeus). → CUÌNIĀO 翠鸟, → PŪTōNG CUÌNIĀO 普通翠鸟

DA

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → SINGSCHWAN, *Cygnus cygnus* (Linnaeus). → TIĀNÉ 天鹅, → DÀ TIĀNÉ 大天鹅

DÀ BÁILÙ 大白鹭
(1:15; 3:34)

DÀ BĀN ZHUÓMÙNIĀO 大斑啄木鸟
3:103

DÀ Bǎo 大鸨
1:121; 3:66

DÀ CǎOMÉI 大草鹛
2:199

DÀ CHÌQÚ SHǔ 大翅鹛属
2:142

DÀ FĒIXIōNG YīNGWǔ 大绯胸鹦鹉
1:173

DÀ Fèngtóuyān'ōU 大凤头燕鸥
1:157

DÀ Hēítóu Lāzuǐquè 大黑头蜡嘴雀
2:424

DÀ HUÁNGGUĀN LÜZHUÓMÙNIĀO 大黄冠绿啄木鸟
1:227

DÀ JUĀNJUÉ 大鹃鵙
2:41

DÀ KUÁNG 大鶲
1:49; 3:48

DÀLÙ QUÈBÉI 大绿雀鹀
2:61

DÀ MÁYÀ 大麻鸭
3:41

SILBERREIHER
Casmerodius albus (Linnaeus) = *Egretta alba* (Linnaeus)
Anderer Name für den → BUNTSPECHT, *Dendrocopos major* (Linnaeus). Synonym → BĀN ZHUÓMÙNIĀO 斑啄木鸟

GROSSTRAPPE
Otis tarda Linnaeus. Synonym → DÌPǔ 地鶲

RIESENBABAX
Babax waddelli Dresser

Die Gattung *GRANDALA* Hodgson

CHINASITTICH
Psittacula derbiana (Fraser)

EILSEESCHWALBE
Thalasseus bergii (Lichtenstein)

Anderer Name für den → MASKENKERN-BEISSE, *Eophona personata* (Temminck et Schlegel). → HĒITÓU LÀ-ZUÍQUE 黑头蜡嘴雀

GELBNACKENSPECHT
Picus flavinucha Gould

MASKENRAUPENFÄNGER
Coracina novae-hollandiae (Gmelin)

MONGOLENBUSSARD
Buteo hemilasius Temminck et Schlegel

LANGSCHNABEL-EIORA
Aegithina lafresnayei (Hartlaub)

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für das Weibchen der →

DÀ MÁYÁN 大麻鳽

1:20

DÀ NÍZHŪOMÙ 大拟啄木

1:220

DÀ PÁNWÉI 大盘尾

2:80

DÀ SHĀNQUÈ 大山雀

2:331; 3:207

DÀ SHÁOYÙ 大杓鹬

1:132

DÀ SHĀZHŪI 大沙锥

1:139

DÀ SHÙYÍNG 大树莺

2:255

DÀ TIĀNÉ 大天鹅

3:39

DÀWÈI XIĀNWĒNG 大卫仙鹟

2:316

DÀ WĚIYÍNG 大苇莺

(2:266; 3:189)

DÀWĚIYÍNG SHÙ 大尾莺属

2:262

DÀ WĚIZHĀ 大苇鳽

3:189

STOCKENTE, *Anas platyrhynchos* Linnaeus. → LÜTÓU YĀ 绿头鸭

ROHRDOMMEL

Botaurus stellaris (Linnaeus)

BLAUKOPF-BARTVOGEL

Megalaima virens (Boddaert)

FLAGGENDRONGO

Dicrurus paradiseus (Linnaeus)

Anderer Name für die → KOHLMEISE,

Parus major Linnaeus. Synonym

→ BÁILIĀN SHĀNQUÈ 白脸山雀

ISABELLBRACHVOGEL

Numenius madagascariensis (Linnaeus)

WALDBEKASSINE

Gallinago megala Swinhoe

RHODODENDRONBUSCHSÄNGER

Cettia major (Horsfield et Moore)Anderer Name des → SINGSCHWANS,
Cygnus cygnus (Linnaeus). → TIĀNÉ
天鹅

DAVIDNILTAVA

Niltava davidi La ToucheDROSSELROHSÄNGER, *Acrocephalus arundinaceus* (Linnaeus), und CHINAROHSÄNGER, *Acrocephalus orientalis* (Temminck et Schlegel)Die Gattung *MEGALURUS* HorsfieldVolkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → DROSSELROHSÄNGER, *Acrocephalus arundinaceus* (Linnaeus), und den → CHINAROHSÄNGER,

DÀWÙJIÙ 大兀鹫

1:59

DÀWÙJIÙ SHÙ 大兀鹫属

1:59

DÀ XIĀNWĒNG 大仙鹟

2:315

DÀ YĚYĀ 大野鶲

3:41

DÀ ZHŪQUÈ 大朱雀

2:401

DÀZUǐ WŪ YĀ 大嘴乌鸦

2:106; 3:139

Acrocephalus orientalis (Temminck et Schlegel). → DÀ WĚIYÍNG 大苇莺

KAHLKOPFGEIER

Sarcogyps calvus (Scopoli)Die Gattung *SARCOGYPS* Lesson

KOBALT-NILJAVA

Niltava grandis (Blyth)Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für die → STOCKENTE, *Anas platyrhynchos* Linnaeus. → LÜTÓU YĀ

绿头鸭

BERGGIMPEL

Carpodacus rubicilla (Güldenstädt)

DICKSCHNABELKRÄHE

Corvus macrorhynchos Wagler

DAI-DAN-DAO

WINTERGOLDHÄHNCHEN

Regulus regulus (Linnaeus)Die Gattung *REGULUS* Cuvier

WIEDEHOPF

Upupa epops LinnaeusDie Familie *UPUPIDAE* (Wiedehopfe)Die Gattung *UPUPA* Linnaeus

MANDSCHURENKRANICH

Grus japonensis (P.L.S. Müller).

Synonym → XIĀN HÈ 仙鹤

DÀNHUĪ ŌU 淡灰鶲

1:149

DÀNJIĀO SHÙYÍNG 淡脚树莺

2:253

DÀNLÜ JUÉMÉI 淡绿鶲鹛

2:225; 3:180

DÀO DÖNG 島鶲

2:161

DÀOTIÁN WĒIYÍNG 稻田苇莺

(2:268; 3:189)

EISMÖWE

Larus hyperboreus Gunnerus

WEISSFUSS-BUSCHSÄNGER

Cettia pallidipes (Blanford)

VIREOTIMALIE

Pteruthius xanthochloris G.R. Gray

SÜDSEEDROSSEL

Turdus poliocephalus LathamFELDROHRSÄNGER, *Acrocephalus agricola* (Jerdon), und STRAUCHROHR-SÄNGER, *Acrocephalus concinens* (Swinhoe)

DI

DÌDÖNG SHŪ 地鵠属

(2:156)

DÌJUĀN SHŪ 地鵠属

(1:182)

DÌPŪ 地鵠

1:121; 3:66

DÌQŪ SHŪ 地鵠属

(2:141)

DÌQUÈ SHŪ 地雀属

2:396

DÌYĀ SHŪ 地鶲属

(2:99)

DÌYÍNG SHŪ 地莺属

(2:250)

Die Gattungen *GEOKICHLA* S. Müller
und *CRYPTOCICHLA* H.E. WoltersDie Gattung *RHOPODYTES* Cabanis et
HeineAnderer Standardname und auch volks-
tümliche Bezeichnung (in S-Shensi)
für die → *GROSSTRAPPE*, *Otis tarda*
Linnaeus. Synonym → *DÀ Bǎo* 大鵠Die Gattung *CINCLIDIUM* BlythDie Gattung *LEUCOSTICTE* SwainsonDie Gattungen *PODOCES* Fischer und
PSEUDOPODOCES Zarudny et LoudonDie Gattungen *TESIA* Hodgson und
OLIGURA Hodgson

DI

DIĀNCHÌ ZHŪQUÈ 点翅朱雀

2:406

DIĀN SHĪ 滇鶲

2:352

DIĀNSHUIQUÈ (1) 点水雀

3:115

DIĀNSHUIQUÈ (2) 点水雀

3:153

DIAN

ROSENBAUCHGIMPEL

Carpodacus rhodopeplus (Vigors)

YÜNNANKLEIBER

Sitta yunnanensis Ogilvie-GrantVolkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für die → *BACHSTELZE*, *Motacilla alba* Linnaeus. → *BÁI JÍLÍNG* 白鹡鸰Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → *WASSERRÖTEL*, *Rhyacornis fuliginosus* (Vigors). → *HÓNGWÉI SHUÍQUŪ* 红尾水鸲

DIAO

Die Gattungen *AQUILA* Brisson,
HIERAAETUS Kaup und *LOPHOTRIORCHIS* Sharpe

UHU

Bubo bubo (Linnaeus). Synonym
→ *PÜTÖNG DIĀOXIĀO* 普通鹏鵟Die Gattung *BUBO* Duméril

DONG-DOU'

DÖNGBĚI BÁIHÓU YÍNG 东北白喉莺

2:272

DÖNGJĪ 董鸡

1:118; 3:64

KLAPPERGRASMÜCKE

Sylvia curruca (Linnaeus)

WASSERHAHN

Gallicrex cinerea (Gmelin)

DÖNGJĪ SHŪ 董鸡属 1:118	Die Gattung GALLICREX Blyth	DUĀNCHÌ SHÙYÍNG 短翅树莺 2:253; 3:185	JAPANBUSCHSÄNGER (UGUISU) Cettia diphone (Kittlitz)
DÖNGMÉI SHŪ 鸳鶯属 2:175	Die Gattung NAPOTHERA G.R. Gray	DUĀNCHÌYÍNG SHŪ 短翅莺属 2:258	Die Gattung BRADYPTERUS Swainson
DÖNG SHŪ 鸳属 2:158	Die Gattung TURDUS Linnaeus	DUĀN ĚRXIĀO 短耳鸮 1:199	SUMPFOHREULE Asio flammeus (Pontoppidan)
DÖNG YÀKĒ 鸳亚科 2:121	Die Unterfamilie TURDINAE (Drosselartige)	DUĀNJIĀOBĒI SHŪ 短脚鵠属 (2:49)	Die Gattung HYPsipetes Vigors
DÒU YÀN 豆雁 1:26; 3:38	SAATGANS Anser fabalis (Latham)	DUĀNWĒI LŪQUÈ 短尾绿鹊 (2:91)	BUSCHELSTER Cissa thalassina (Temminck)
DU		DUĀNWĒI MÉNG 短尾鳩 1:7	ROTSCHNABEL-TROPIKVOGEL Phaethon aethereus Linnaeus
DÙJUĀN 杜鹃 1:178; 3:85	KUCKUCK Cuculus canorus Linnaeus	DUĀNWĒI XÌNTIĀNWĒNG 短尾信天翁 1:4	KURZSCHWANZALBATROS Diomedea albatrus Pallas
DÙJUĀN KĒ 杜鹃科 1:175; 3:84	Die Familie CUCULIDAE (Kuckucke)	DUĀNWĒIYÍNGWŪ 短尾鹏鹉 1:175	FRÜHLINGSPAPAGEICHEN Loriculus vernalis (Sparrmann)
DÙJUĀN SHŪ 杜鹃属 (1:175)	Die Gattungen HIEROCOCCYX S.Müller, CUCULUS Linnaeus und CACOMANTIS S. Müller	DUĀNWĒIYÍNGWŪ SHŪ 短尾鹏鹉属 1:174	Die Gattung LORICULUS Blyth
DÙ YĀ 渡鸦 2:109	KOLKRABE Corvus corax Linnaeus	DUĀNZHÍDIĀO 短趾鵟 1:63	SCHLANGENADLER Circaetus gallicus (Gmelin)
DUAN-DUN		DUĀNZHÍDIĀO SHŪ 短趾鹏属 1:62	Die Gattung CIRCAETUS Vieillot
DUĀNCHÌDÖNG SHŪ 短翅鶲属 2:121	Die Gattung BRACHYPTERYX Horsfield	DUĀNZUĪ SHĀNJIĀONIĀO 短嘴山椒 鸟 2:46	KURZSCHNABEL-MENNIGVOGEL Pericrocotus brevirostris (Vigors)
DUĀNCHÌQÚ 短翅鸲 2:141; 3:154	ROTSCHWANZ-KURZFLÜGEL Hodgsonius phoenicuroides (G.R. Gray)	DUĀNZUĪ TIĀNÉ 短嘴天鹅 1:29	ZWERGSCHWAN Cygnus bewickii Yarrell
DUĀNCHÌQÚ SHŪ	Die Gattung HODGSONIUS Bonaparte	DÙNJĪ 顿鸡 3:160	Volkstümliche Bezeichnung (in S- Shensi) für die → ERDDROSSEL (GOLD- DROSSEL), Zoothera dauma (Latham). → HÜBĀN DÌDÖNG 虎斑地鸫, → HÜ- BĀN SHĀNDÖNG 虎斑山鸫

È 翳
1:64

ÈLÀODIĀO 饿老刁
3:45

ÈRBĀN BĀILÍNG 二斑百灵
2:9

ĚRXIĀO SHÚ 耳鶲属
1:198

È SHÚ 鹫属
1:64

FÀGUĀN JUÁNWĒI 发冠卷尾
2:78; 3:129

FĀNGWĒIWĒNG 方尾鹟
2:326; 3:206

FĀNGWĒIWĒNG SHÚ 方尾鹟属
2:326

FĀNSHÍYÙ 翩石鹟
1:136

FĀNSHÍYÙ SHÚ 翩石鹟属
1:136

FĀNZUÍYÙ 反嘴鹬
1:145

E

FISCHADLER
Pandion haliaetus (Linnaeus)
Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → SCHWARZMILAN,
Milvus migrans (Boddaert). → YUĀN
鳩

BERGKALANDERLERCHE
Melanocorypha bimaculata (Ménétries)

Die Gattung ASIO Brisson

Die Gattung PANDION Savigny

FA-(FANG)-FAN

SEIDENDRONGO
Dicrurus hottentottus (Linnaeus)

GRAUKOPF-MÜCKENSCHNÄPPER
Culicicapa ceylonensis (Swainson)

Die Gattung CULICICAPA Swinhoe

STEINWÄLZER
Arenaria interpres (Linnaeus)

Die Gattung ARENARIA Brisson

SÄBELSCHNÄBLER
Recurvirostra avosetta Linnaeus

FĀNZUÍYÙ KĒ 反嘴鹬科
1:144; 3:74

FĀNZUÍYÙ SHÚ 反嘴鹬属
1:145

Die Familie RECURVIROSTRIDAE (Stelzenläufer)

Die Gattung RECURVIROSTRA Linnaeus

FEI-FEN

FĚICUI SHÚ 翡翠属
1:212

FĒIXIŌNG YĪNGWŪ 绯胸alcon武鸟
1:173

FĒNHÓNG LIÁNGNIĀO 粉红椋鸟
(2:82)

FĒNHÓNG SHĀNJIĀONIĀO 粉红山椒鸟
2:43

FĒNHÓNGXIŌNG LIŪ 粉红胸鹟
2:31; 3:113

FĒNHÓNG YÀN'ŌU 粉红燕鸥
1:155

Die Gattung HALCYON Swainson

BARTSITTICH
Psittacula alexandri (Linnaeus)

ROSENSTAR
Pastor roseus (Linnaeus)

ROSENMENNIGVOGEL
Pericrocotus roseus (Vieillot)

ROSENPIEPER
Anthus roseatus Blyth

ROSENSEE-SCHWALBE
Sterna dougallii Montagu

FENG

FĒNGHŪ KĒ 蜂虎科
1:214

FĒNGHŪ SHÚ 蜂虎属
1:214

FĒNGMÉI SHÚ 凤鹛属
2:232

FĒNGTÓU ĀLĀN 凤头阿兰
3:106

Die Familie MEROPIDAE (Spinte oder Bienenfresser)

Die Gattung MEROPS Linnaeus

Die Gattung YUHINA Hodgson

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für die → HAUBENLERCHE,

Fèngtóubǎilíng 凤头百灵 2:13; 3:106	Galerida cristata (Linnaeus). → Fèngtóubǎilíng 凤头百灵
Fèngtóubǎilíng shǔ 凤头百灵属 2:13	HAUBENLERCHE Galerida cristata (Linnaeus)
Fèngtóubǎilíng fēngyīng 凤头蜂鹰 (1:43)	Die Gattung GALERIDA Boie
Fèngtóujuān shǔ 凤头鹃属 1:175	SCHOPFWESPENBUSSARD (eine Rasse des Wespenbussards) Pernis apivorus ruficollis Lesson
Fèngtóujuān shǔ 凤头鹃属 1:42	Die Gattung CLAMATOR Kaup
Fèngtóumài jī 凤头麦鸡 1:123; 3:68	DREIFARBENWEIH Aviceda leuphotes (Dumont)
Fèngtóumài jī shǔ 凤头麦鸡属 1:123	KIEBITZ Vanellus vanellus (Linnaeus)
Fèngtóuméi 凤头眉 3:180	Die Gattung VANELLUS Brisson
Fèngtóupìtī 凤头䴙䴘 (1:4)	Volkstümliche Bezeichnung (in S- Shensi) für die → DIADEMUYHINA, Yuhina diademata Verreaux. → Bǎilíng Fèngméi 白领凤鹛
Fèngtóuqián yā 凤头潜鸭 1:35	HAUBENTAUCHER Podiceps cristatus (Linnaeus)
Fèngtóuquè shǔ 凤头雀属 2:447	REIHERENTE Aythya fuligula (Linnaeus)
Fèngtóuquè yāng shǔ 凤头雀莺属 2:297	Die Gattung MELOPHUS Swainson (am besten als Untergattung der Gat- tung → EMBERIZA Linnaeus zu be- trachten)
Fèngtóu wū 凤头鹀 (2:447)	Die Gattung LOPHOBASILEUS Pleske HAUBENAMMER Emberiza lathami J.E. Gray

Fèngtóuyàn'ōu 凤头燕鸥 1:157	Fèngtóuyàn'ōu 燕鸥 Thalasseus bengalensis (Lesson)
Fèngtóuyàn'ōu shǔ 凤头燕鸥属 1:157	Die Gattung THALASSEUS Boie
Fèngtóuyīng 凤头鹰 1:46	SCHOPFHABICHT Accipiter trivirgatus (Temminck)
Fèngtóuyīngzui bēi 凤头鸺鹠 2:59	FINKENBÜLBÜL Spizixos canifrons Blyth
Fèngtóuyǔyān 凤头雨燕 1:207	HAUBENSEGLER Hemiprocne longipennis (Rafinesque)
Fèngtóuyǔyān kē 凤头雨燕科 1:207	Die Familie HEMIPROCNIDAE (Baum- segler)
Fèngtóuyǔyān shǔ 凤头雨燕属 1:207	Die Gattung HEMIPROCNE Nitzsch
Féngyèyīng 缝叶莺 2:298	LANGSCHWANZ-SCHNEIDERVOGEL Orthotomus sutorius (Pennant). Synonym → CHÁNGWÉI FÉNGYÈYÍNG 长 尾缝叶莺
Féngyèyīng shǔ 缝叶莺属 2:297	Die Gattung ORTHOTOMUS Horsfield
Féngyīng 蜂鹰 1:42	WESPENBUSSARD Pernis apicrus (Linnaeus)
Féngyīng shǔ 蜂鹰属 1:42	Die Gattung PERNIS Cuvier
FO-FU	
Fófá sēng 佛法僧 1:216	HINDURACKE Coracias benghalensis (Linnaeus)
Fófá sēng kē 佛法僧科 1:216; 3:99	Die Familie CORACIIDAE (Racken)

FÓFĀSĒNG MÙ 佛法僧目

1:209; 3:97

FÓFĀSĒNG SHŪ 佛法僧属

1:216

FÚŌU SHŪ 浮鸥属

1:152

GA-GAN-GAO

GĀGĀJĪ 嘎嘎鸡

3:53

GĀNLĀNBÈI LÍNWĒNG 橄榄背林鵙

2:306

GĀNLĀNLÜ DUĀNJIĀOBĒI 橄榄绿短脚鵙
(2:49)

GĀOLIĀNG TÓU 高梁头
(3:132)

GĀOSHĀN DÌQUÈ 高山地雀

2:397

GĀOSHĀN DUĀNCHÌYÍNG 高山短翅莺

2:262

GĀOSHĀN JĪNCHÌ 高山金翅
(2:391)

Die Ordnung CORACIFORMES (Rackenvögel)

Die Gattung CORACIAS Linnaeus

Die Gattung CHLIDONIAS Rafinesque

GA-GAN-GAO

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für das → CHUKARHUHN, Actoris chukar (J.E. Gray). → SHÍJĪ 石鸡

OLIVRÜCKEN-DSCHUNGELSCHNÄPPER
Rhinomyias olivacea (Hume)

OLIVFLUCHTVOGEL
Hypsipetes charlottae (Finsch)

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → GRAUSTAR, Sturnopastor cineraceus (Temminck). → HUĪ LIÁNGNIÀO 灰椋鸟

FELSENSCHNEEGIMPEL
Leucosticte brandti (Bonaparte)

Eine Rassengruppe des → ROSTBUSCH-SÄNGERS, Bradypterus luteoventris (Hodgson)

HIMALAYAGRÜNLING
Chloris spinoides (Vigors). Synonym → GĀOSHĀN JĪNCHÌQUÈ 高山金翅雀

GĀOSHĀN JĪNCHÌQUÈ 高山金翅雀
(2:391)

GĀOSHĀN QUÈMÉI 高山雀鹛
2:239

GĀOSHĀN XUÁNMÙQUÈ 高山旋木雀
2:357; 3:217

GĀOSHĀN XUEJĪ 高山雪鸡
1:78

GĀOYUÁN SHĀNCHÚN 高原山鹑
1:84

GĀOYUÁN YÁNLIÙ 高原岩鹑
2:116

Andere Bezeichnung für den → HIMALAYAGRÜNLING, Chloris spinoides (Vigors). → GĀOSHĀN JĪNCHÌ 高山金翅

BERGALCIPPE
Alcippe striaticollis (Verreaux)

HIMALAYABAUMLÄUFER
Certhia himalayana Vigors

HIMALAYA-KÖNIGSHUHN
Tetraogallus himalayensis G.R. Gray

TIBETREBUHN
Perdix hodgsoniae (Hodgson)

HIMALAYABRAUNELLE
Prunella himalayana (Blyth)

GE

BUSCHLERCHE
Mirafra javanica Horsfield

Die Gattung MIRAFRA Horsfield

MUPINDROSSEL
Turdus mupinensis Laubmann. Synonym → BĀOXÍNG GĒ DÔNG 宝兴歌鸫

Die Gattungen LUSCINIA T. Forster, LARVIVORA Hodgson, PSEUDAEDON Buturlin, CALLIOPE Gould und CYANO-SYLVIA C.L. Brehm

Die Gattung COLUMBA Linnaeus

Die Ordnung COLUMBIFORMES (Taubenvögel)

GĒ SHŪ 鸽属
1:164

GĒ-XÍNG MÙ 鸽形目
1:161; 3:78

GOU

GŌUTÓUDIĀO 狗头鵠
3:50

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → MÖNCHSGEIER (KUTTENGEIER), *Aegypius monachus* (Linnaeus). → TŪJIÙ

GŌUWÁ QUÈ 狗娃雀
3:87

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → KOËL, *Eudynamys scolopacea* (Linnaeus). → ZÀOJUĀN 雉鹃

GŌUZUÍMÉI SHŪ 钩嘴鹛属
2:170

Die Gattung *POMATORHINUS* Horsfield

GŌUZUÍ YUÁNWÉIHUÒ 钩嘴圆尾鹱
1:6

TAHITI-STURMVOGEL
Pterodroma rostrata (Peale)

GU

GŪDÌNGJĪ 骨顶鸡
1:120; (3:65)

BLÄSSSHUHN
Fulica atra Linnaeus. Synonym
→ BÁIGŪDÌNG 白骨顶

GŪDÌNG SHŪ 骨顶属
1:119

Die Gattung *FULICA* Linnaeus

GŪGŪ 咕咕
3:82

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für die → PERLHALSTAUBE, *Streptopelia chinensis* (Scopoli). → ZHŪJÌNG BĀNJIŪ 珠顶斑鸠

GŪ SHĀZHUI 狐沙雉
1:137; 3:72

BERGBEKASSINE
Gallinago solitaria Hodgson

GŪTÓNGSÈ JUĀNWĒI 古铜色卷尾
2:78

BRONZEDRONGO
Dicrurus aeneus Vieillot

GUA

GUÀDŪN YĀQUÈ 挂墩鹤雀
2:195

GUĀGUĀJĪ 咕咕鸡
3:53

GUĀLĀJĪ 呶拉鸡
3:55

GUĀLĀJĪ 呶拉鸡
3:57

GUĀNBĒI SHŪ 冠鹤属
2:48

GUĀNBÍHUÒ 管鼻鹱
1:5

GUĀNBÍHUÒ SHŪ 管鼻鹱属
1:5

GUĀN-GÒNG HÀOKŪ 关公好哭
3:85

GUĀN KĒ 鹳科
1:21; 3:36

KURZSCHWANZ-PAPAGEISCHNABEL (KURZ-SCHWANZ-PAPAGEIMEISE)
Paradoxornis davidianus (Slater)

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für das → CHUKARHUHN, *Alectoris chukar* (J.E. Gray). → SHÍJĪ 石鸡

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → BLUTFASAN, *Ithaginis cruentus* (Hartwicke). → XUÈ-ZHÌ 血雉

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → KOKLASFASAN, *Pucrasia macrolopha* (Lesson). → SHÁOJĪ 小鸡

GUAN-GUANG

Die Gattung CRINIGER Temminck

EISSTURMVOGEL
Fulmarus glacialis (Linnaeus)

Die Gattung FULMARUS Stephens

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → KURZFLÜGEL-KUCKUCK, *Hierococcyx micropterus* (Gould). → SÌSHĒNG DÙJUĀN 四声杜鹃

Die Familie CICONIIDAE (Störche)

GUÀN SHǔ 蓝鸟属

1:21

GUĀNWén LIÜYÍNG 冠纹柳莺

2:286; 3:195

GUÀN-XÍNG Mù 鹳形目

1:12; 3:30

GUĀN YÚGǒU 冠鱼狗

1:209; 3:97

GUĀNGBèI SHĀNDōNG 光背山鹑

2:166

GUǐXIAO 鬼鸮

1:200

GUǐXIAO SHǔ 鬼鸮属

1:200

GUǒ Gē 果鸽

1:167

GUǒJIŪ SHǔ 果鸠属

1:163

HĀIDIĀO SHǔ 海雕属

1:57

HĀIFĀNYā SHǔ 海番鸭属

1:38

HĀI LÚCí 海鸬鹚

1:10

Die Gattung CICONIA Brisson

STREIFENKOPF-LAUBSÄNGER

Phylloscopus reguloides (Blyth).

→ LIÜCHUÀN'R 柳串儿

Die Ordnung CICONIIFORMES (Schreitvögel)

TRAUERFISCHER

Ceryle lugubris (Temminck)

BRAUNRÜCKEN-BERGDROSSEL

Zoothera mollissima (Blyth)

GUI-GUO

RAUHFUSSKAUZ

Aegolius funereus (Linnaeus)

Die Gattung AEGOLIUS Kaup

VEILCHENTAUPE

Columba janthina Temminck

Die Gattung PTILINOPUS Swainson

HAI-HAN

Die Gattung HALIAEETUS Savigny

Die Gattung MELANITTA Boie

MEERSCHARBE

Phalacrocorax pelagicus Pallas

HĀINÁN LÁN WĒNG 海南蓝鹟

(2:319)

HĀINÁN SHĀNZHÈGŪ 海南山鳽鸪

1:89

HĀI ŌU 海鸥

1:147

HĀIQUÈ KĒ 海雀科

1:158

HĀIQUÈ MÙ 海雀目

1:158

HĀIYĀN KĒ 海燕科

1:7

HÁN YĀ 寒鸦

(2:105; 3:138)

HAINANSCHNÄPPER

Cyornis hainanus (Ogilvie-Grant)

HAINANBUSCHWACHTEL

Arborophila ardens (Styan)

STURMMÖWE

Larus canus Linnaeus

Die Familie ALCIDAE (Alken)

Die Ordnung ALCIFORMES (Alken)

Die Familie HYDROBATIDAE (Sturmschwalben)

DOHLE, *Corvus monedula* Linnaeus,
und ELSTERDOHLE, *Corvus dauuricus*
Pallas

HE

HÖHLENHÄHER

Pseudopodoces humilis (Hume)

ELSTERRAUPENSCHMÄTZER

Hemipus picatus (Sykes)

ADAMS-SCHNEEFINK (ADAMS-SCHNEE-SPERLING)

Montifringilla adamsi Adams

HECKENKUCKUCK

Centropus sinensis (Stephens)

ZÜGELSEESCHWALBE

Sterna anaethetus Scopoli

SCHIKRA

Accipiter badius (Gmelin)

HÈGUĀN SHĀNQUÈ 褐冠山雀
2:339; 3:211

HÈ HÉWŪ 褐河乌
2:111; 3:141

HÈHÓNGBÈI YÁNLÌU 褐红背岩鹨
2:120

HÈHÓU XUÁNMÙQUÈ 褐喉旋木雀
2:358

HÈ HUÍQUÈ 褐灰雀
2:420

HÈ JIĀNNIÀO 褐姬鹟
1:9

HÈ KĒ 鹤科
1:110; 3:61

HÈLÁNSHĀN HÓNGWĒIQŪ 贺兰山红尾
鹟
2:134; 3:150

HÈLÁNSHĀN YÁNLÌU 贺兰山岩鹨
2:120

HÈ LÍNXIÀO 褐林鸮
1:196

HÈ LIŪYÍNG 褐柳莺
2:276; 3:191

HÈ MĀJĪ 褐马鸡
1:97

HÉPÍNGNIÀO 和平鸟
2:63

HÉPÍNGNIÀO KĒ 和平鸟科
(2:61)

BIRKENMEISE
Parus dichrous Blyth

BACHWASSERAMSEL
Cinclus pallasii Temminck

WALDBRAUNELLE
Prunella immaculata (Hodgson)

BRAUNKEHL-BAUMLÄUFER
Certhia discolor Blyth

SCHUPPENKOPFGIMPEL
Pyrrhula nipalensis Hodgson

BRAUNTÖLPEL (WEISSBAUCHTÖLPEL)
Sula leucogaster (Boddaert)

Die Familie GRUIDAE (Kraniche)

ROSTKEHL-ROTSCHWANZ
Phoenicurus alaschanicus (Prze-
valski)

STEPPENBRAUNELLE
Prunella koslowi (Przevalski)

MALAIENKAUZ
Strix leptogrammica (Temminck)

DUNKELLAUBSÄNGER
Phylloscopus fuscatus (Blyth). →
LIŪCHUÀN'R 柳串儿

BRAUNER OHRFASAN
Crossoptilon mantchuricum Swinhoe

IRENE (FEENVOGEL)
Irena puella (Latham)

Die Familien AEGITHINIDAE (Eioras),
CHLOROPSEIDAE (Blattvögel) und IRE-
NIDAE (Feenvögel)

HÉPÍNGNIÀO SHŪ 和平鸟属
2:63

HÉQUÈ 朱雀
2:386

HÈ QUÈMÉI 褐雀鹛
2:243; 3:182

HÉQUÈ SHŪ 朱雀属
2:386

HÈ SHĀN JIĀOYÍNG 褐山鵙莺
2:305; 3:198

HÈ SHŪ 鹤属
1:110

HÈTÓU DÔNG 褐头鸫
2:163

HÈTÓU JIĀOYÍNG 褐头鵙莺
2:302

HÈTÓU QUÈMÉI 褐头雀鹛
2:241; 3:182

HÈTÓU SHĀNQUÈ 褐头山雀
2:341

HÈTÓU WŪ 褐头鷦
2:431

HÉWŪ 河乌
2:110

HÉWŪ KĒ 河乌科
2:110; 3:141

HÉWŪ SHŪ 河乌属
2:110

Die Gattung IRENA Horsfield
2:63

REISFINK (REISAMADINE)
Padda oryzivora (Linnaeus)

ROTKOPFALCIPPE
Alcippe brunnea Gould

Die Gattung PADDA Reichenbach

MALAIENPRINIE
Prinia polychroa (Temminck)

Die Gattung GRUS Pallas

BRAUNKOPFDROSSEL
Turdus feae (Salvadori)

BRAUNKOPFPRINIE
Prinia inornata Sykes [von manchen
Autoren als Rassengruppe der RAHM-
BRUSTPRINIE, Prinia subflava (Gmelin),
angesehen].

BRAUNKOPFALCIPPE
Alcippe cinereiceps (Verreaux)

WEIDENMEISE
Parus montanus Conrad

BRAUNKOPFAMMER
Emberiza bruniceps Brandt

WASSERAMSEL
Cinclus cinclus (Linnaeus)

Die Familie CINCLIDAE (Wasseram-
seln)

Die Gattung CINCLUS Borkhausen

HÈXÍE QUÈMÉI 褐胁雀鹛
2:242

HÈ-XÍNG MÙ 鹩形目
1:110; 3:61

HÈXIÖNG WĒNG 褐胸鹟
2:324

HÈXIÖNG ZÀOMÉI 褐胸噪鹛
2:204

HÈ YÁNLÌU 禾岩鹀
2:118

HÈ YĀQUÈ 褐鸦雀
2:188

HÈ YÙ 鹳鹬
1:133

HÈ YÚXIĀO 褐魚鷺
(1:190)

HĒIBÁI LÍNJÍ 黑白林鵙
2:148

HĒIBĀN HUÁNGYĪNG 黑斑蝗莺
2:265

HĒIBĒI 黑鶲 → HĒI DUĀNJIĀOBĒI 黑短脚鶲
2:51

HĒIBĒI HUÁNGMÉI WĒNG 黑背黄眉
鹟
2:308

EINE RASSENGROUPE DER → ROTKOPFAL-
CIPPE, *Alcippe brunnea* Gould

Die Ordnung GRUIFORMES (Kranich-
vögel)

BAMBUSSCHNÄPPER
Muscicapa muttui (Layard)

LÄRMHÄHERLING
Garrulax maesi (Oustalet)

FAHLBRAUNELLE
Prunella fulvescens (Severtzov)

EINFARB-PAPAGEISCHNABEL (EINFARB-
PAPAGEIMEISE)
Paradoxornis unicolor (Hodgson)

DUNKLER WASSERLÄUFER
Tringa erythropus (Pallas). Syno-
nym → HÓNGJIÄO HÈ YÙ 红脚鹤鹬

WELLENBRUST-FISCHUHU, *Ketupa zey-
lonensis* (Gmelin), und RIESEN-FISCH-
UHU, *Ketupa blakistoni* (Seebold)

HEI

JERDONSCHMÄTZER
Saxicola jerdoni (Blyth)

FELDSCHWIRL
Locustella naevia (Boddaert)

GOLDSCHNÄPPER
Ficedula narcissina (Temminck)

HĒIBÈI YÀNWĒI 黑背燕尾
2:144; 3:156

HĒI CHÁNGWĒIZHÌ 黑长尾雉
1:107

HĒI CHĀWÉIHÁIYÀN 黑、叉尾海燕
1:7

HĒICHÌ CHÁNGJIÄOYÙ 黑翅长尾鹬
1:144

HĒICHÌ NÌLÀZUÍQUÈ 黑翅拟蜡嘴雀
2:428

HĒICHÌ QUÈBĒI 黑翅雀鹛
2:61

HĒICHÌYUĀN 黑翅鸢
1:41

HĒICHÌYUĀN SHŪ 黑翅鸢属
1:41

HĒIDÍNG MÁQUÈ 黑顶麻雀
2:374

HĒIDÍNG ZÀOMÉI 黑顶噪鹛
2:216

HĒI DUĀNJIÄOBĒI 黑短脚鶲
(2:51)

HĒIÉ BÓLÁO 黑额伯劳
2:70

HĒIÉ SHĀN ZÀOMÉI 黑额山噪鹛
2:207

HĒIÉ SHÙQUÈ 黑额树鹊
(2:97)

HĒIFÙ BÍNYÙ 黑腹滨鹬
1:142

WEISSSCHEITEL-SCHERENSCHWANZ
Enicurus leschenaulti (Vieillot)

MIKADOFASAN
Syrmaticus mikado (Ogilvie-Grant)

SWINHOE-WELLENLÄUFER
Oceanodroma monorhis (Swinhoe)

STELZENLÄUFER
Himantopus himantopus (Linnaeus)

GELBSCHENKEL-KERNBEISSER
Mycerobas affinis (Blyth)

SCHWARZFLÜGEL-EIORA
Aegithina tiphia (Linnaeus)

GLEITAAR
Elanus caeruleus (Desfontaines)

Die Gattung ELANUS Savigny

SAXAULSPERLING
Passer ammodendri Gould. Synonym
→ XÍYÙ MÁQUÈ 西域麻雀

SCHWARZSCHETTELHÄHERLING
Garrulax affinis Blyth

GRAUFLUCHTVOGEL
Hypsipetes leucocephalus (Gmelin)

SCHWARZSTIRNWÜRGER
Lanius minor Gmelin

KANSUHÄHERLING
Garrulax sukatschewi (Berezowski
et Bianchi)

MASKENBAUMELSTER
Dendrocitta frontalis Horsfield

ALPENSTRANDLÄUFER
Calidris alpina (Linnaeus)

HĒI FÚŌU 黑浮鸥	TRAUERSEESCHWALBE	HĒIHÓU YĀQUÈ 黑喉鳩雀	Eine Rassengruppe des → GRAUOHRPAPAGEISCHNABELS (GRAUOHR-PAPAGEIMEISE), <i>Paradoxornis nipalensis</i> (Hodgson)
1:152	<i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus)	2:194	
HĒIFÙ SHĀJĪ 黑腹沙鸡	SANDFLUGHUHN	HĒIHÓU ZÀOMÉI 黑喉噪鹛	WEISSOHRHÄHERLING
(1:161)	<i>Eremialector orientalis</i> (Linnaeus)	2:204	<i>Garrulax chinensis</i> (Scopoli)
HĒIFÙ YÀN'ŌU 黑腹燕鸥	SCHWARZBAUCH-SEESCHWALBE	HĒIHUÁN 黑鶲	WARZENIBIS
1:155	<i>Sterna acuticauda</i> J.E. Gray	(1:24)	<i>Pseudibis papillosa</i> (Temminck)
HĒI GUÀN 黑鶲	SCHWARZSTORCH	HĒIHUÁN SHǔ 黑鶲属	Die Gattung PSEUDIBIS Hodgson
1:23; 3:36	<i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus)	1:24	
HĒIGUĀN HUÁNG BĒI 黑冠黄鹂	GOLDBRUSTBÜLBÜL	HĒIJIĀO XÍNTIĀNWĒNG 黑脚信天翁	SCHWARZFUSSALBATROS
(2:53)	<i>Pycnonotus melanicterus</i> (Gmelin)	1:5	<i>Diomedea nigripes</i> Audubon
HĒIGUĀN HŪBĀNYÁN 黑冠虎斑鳽	WELLENREIHER	HĒIJÍNG CHÁNGWĒIZHÌ 黑颈长尾雉	BURMAFASAN
1:19	<i>Gorsachius melanolophus</i> (Raffles)	1:106	<i>Syrmaticus humiae</i> (Hume)
HĒIGUĀN SHĀNQUÈ 黑冠山雀	FICHTENMEISE	HĒIJÍNG HÈ 黑颈鹤	SCHWARZHALSKRANICH
(2:338; 3:211)	<i>Parus rufonuchalis</i> Blyth	1:111	<i>Grus nigricollis</i> Przevalski
HĒI HĀIFĀNYÀ 黑海番鸭	TRAUERENTE	HĒIJÍNG LÚCÍ 黑颈鹤鵠	MOHRENSCHARBE
(1:38)	<i>Melanitta nigra</i> (Linnaeus)	1:11	<i>Phalacrocorax niger</i> (Vieillot)
HĒIHÓU FÉNGYÉYÍNG 黑喉缝叶莺	WALDSCHNEIDERVOGEL	HĒIJÍNG PÍTÍ 黑颈鹤鷺	SCHWARZHALSTAUCHER
2:299	<i>Orthotomus atrogularis</i> Temminck	(1:3)	<i>Podiceps nigricollis</i> C.L. Brehm
HĒIHÓU-HÓNGTÚN BĒI 黑喉红臀鳽	TONKIBÜLBÜL	HĒI JUĀNWĒI 黑卷尾	KÖNIGSDRONGO
2:57	<i>Pycnonotus cafer</i> (Linnaeus)	2:75; 3:128	<i>Dicrurus macrocercus</i> Vieillot
HĒIHÓU HÓNGWĒIQÚ 黑喉红尾鸽	FELDROTSCHWANZ	HĒIKĒ Fèngméi 黑颊凤鹛	MEISENYUHINA (ZWERGTIMALIE)
2:136; 3:150	<i>Phoenicurus hodsoni</i> (Moore)	(2:235)	<i>Yuhina nigrimenta</i> Blyth
HĒIHÓU SHĀN JIĀOYÍNG 黑喉山鶫莺	SCHWARZKEHLPRINIE	HĒIKĒ GUŌJIŪ 黑颊果鸠	SCHWARZKINN-FRUCHTTAUBE
2:305	<i>Prinia atrogularis</i> (Horsfield et Moore)	1:163	<i>Ptilinopus leclancheri</i> (Bonaparte)
HĒIHÓU SHÍJÍ 黑喉石鵖	SCHWARZKEHLCHEN	HĒIKĒ LÁN WĒNG 黑颊蓝鹟	BRAUNBRUST-BLAUSCHNÄPPER
2:146; 3:157	<i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus)	(2:321)	<i>Cyornis tickelliae</i> Blyth
HĒIHÓU XUĚQUÈ 黑喉雪雀	DAVID-SCHNEEFINK (ERDSPERLING)	HĒI Lǎopó 黑老婆	Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → DAVIDHÄHERLING,
2:383	<i>Montifringilla davidiana</i> (Verreaux)	3:175	
HĒIHÓU YÁNLÌU 黑喉岩鹨	SCHWARZKEHLBRAUNELLE		
2:119	<i>Prunella atrogularis</i> (Brandt)		

HĒI FÚŌU 黑浮鸥	TRAUERSEESCHWALBE	HĒIHÓU YĀQUÈ 黑喉鳩雀	Eine Rassengruppe des → GRAUOHRPAPAGEISCHNABELS (GRAUOHR-PAPAGEIMEISE), <i>Paradoxornis nipalensis</i> (Hodgson)
1:152	<i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus)	2:194	
HĒIFÙ SHĀJĪ 黑腹沙鸡	SANDFLUGHUHN	HĒIHÓU ZÀOMÉI 黑喉噪鹛	WEISSOHRHÄHERLING
(1:161)	<i>Eremialector orientalis</i> (Linnaeus)	2:204	<i>Garrulax chinensis</i> (Scopoli)
HĒIFÙ YÀN'ŌU 黑腹燕鸥	SCHWARZBAUCH-SEESCHWALBE	HĒIHUÁN 黑鶲	WARZENIBIS
1:155	<i>Sterna acuticauda</i> J.E. Gray	(1:24)	<i>Pseudibis papillosa</i> (Temminck)
HĒI GUÀN 黑鶲	SCHWARZSTORCH	HĒIHUÁN SHǔ 黑鶲属	Die Gattung PSEUDIBIS Hodgson
1:23; 3:36	<i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus)	1:24	
HĒIGUĀN HUÁNG BĒI 黑冠黄鹂	GOLDBRUSTBÜLBÜL	HĒIJIĀO XÍNTIĀNWĒNG 黑脚信天翁	SCHWARZFUSSALBATROS
(2:53)	<i>Pycnonotus melanicterus</i> (Gmelin)	1:5	<i>Diomedea nigripes</i> Audubon
HĒIGUĀN HŪBĀNYÁN 黑冠虎斑鳽	WELLENREIHER	HĒIJÍNG CHÁNGWĒIZHÌ 黑颈长尾雉	BURMAFASAN
1:19	<i>Gorsachius melanolophus</i> (Raffles)	1:106	<i>Syrmaticus humiae</i> (Hume)
HĒIGUĀN SHĀNQUÈ 黑冠山雀	FICHTENMEISE	HĒIJÍNG HÈ 黑颈鹤	SCHWARZHALSKRANICH
(2:338; 3:211)	<i>Parus rufonuchalis</i> Blyth	1:111	<i>Grus nigricollis</i> Przevalski
HĒI HĀIFĀNYÀ 黑海番鸭	TRAUERENTE	HĒIJÍNG LÚCÍ 黑颈鹤鵠	MOHRENSCHARBE
(1:38)	<i>Melanitta nigra</i> (Linnaeus)	1:11	<i>Phalacrocorax niger</i> (Vieillot)
HĒIHÓU FÉNGYÉYÍNG 黑喉缝叶莺	WALDSCHNEIDERVOGEL	HĒIJÍNG PÍTÍ 黑颈鹤鷺	SCHWARZHALSTAUCHER
2:299	<i>Orthotomus atrogularis</i> Temminck	(1:3)	<i>Podiceps nigricollis</i> C.L. Brehm
HĒIHÓU-HÓNGTÚN BĒI 黑喉红臀鳽	TONKIBÜLBÜL	HĒI JUĀNWĒI 黑卷尾	KÖNIGSDRONGO
2:57	<i>Pycnonotus cafer</i> (Linnaeus)	2:75; 3:128	<i>Dicrurus macrocercus</i> Vieillot
HĒIHÓU HÓNGWĒIQÚ 黑喉红尾鸽	FELDROTSCHWANZ	HĒIKĒ Fèngméi 黑颊凤鹛	MEISENYUHINA (ZWERGTIMALIE)
2:136; 3:150	<i>Phoenicurus hodsoni</i> (Moore)	(2:235)	<i>Yuhina nigrimenta</i> Blyth
HĒIHÓU SHĀN JIĀOYÍNG 黑喉山鶫莺	SCHWARZKEHLPRINIE	HĒIKĒ GUŌJIŪ 黑颊果鸠	SCHWARZKINN-FRUCHTTAUBE
2:305	<i>Prinia atrogularis</i> (Horsfield et Moore)	1:163	<i>Ptilinopus leclancheri</i> (Bonaparte)
HĒIHÓU SHÍJÍ 黑喉石鵖	SCHWARZKEHLCHEN	HĒIKĒ LÁN WĒNG 黑颊蓝鹟	BRAUNBRUST-BLAUSCHNÄPPER
2:146; 3:157	<i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus)	(2:321)	<i>Cyornis tickelliae</i> Blyth
HĒIHÓU XUĚQUÈ 黑喉雪雀	DAVID-SCHNEEFINK (ERDSPERLING)	HĒI Lǎopó 黑老婆	Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → DAVIDHÄHERLING,
2:383	<i>Montifringilla davidiana</i> (Verreaux)	3:175	
HĒIHÓU YÁNLÌU 黑喉岩鹨	SCHWARZKEHLBRAUNELLE		
2:119	<i>Prunella atrogularis</i> (Brandt)		

HĒILIĀN PÍLÜ 黑脸琵鹭

1:25

HĒILIĀN WĒNGYÍNG 黑脸翁莺
(2:294)

HĒILIĀN ZÀOMÉI 黑脸噪鹛
2:200; 3:173

HĒILÌNG HÉNG 黑领鹤
1:126

HĒILÌNG LIÁNGNIĀO 黑领椋鸟
(2:84)

HĒILÌNG ZÀOMÉI 黑领噪鹛
2:201; 3:174

HĒIMÉI WĒIYÍNG 黑眉苇莺
2:268; 3:189

HĒIMÉI YĀQUÈ 黑眉鸦雀
2:195

HĒI QÍNJÍ 黑琴鸡
1:73

HĒIQUÈ SHǔ 黑雀属
2:419

HĒISHUÍJÍ 黑水鸡
1:119; 3:65

HĒISHUÍJÍ SHǔ 黑水鸡属
1:118

Garrulax davidi (Swinhoe). → SHĀN ZÀOMÉI 山噪鹛

SCHWARZSTIRNLÖFFLER
Platalea minor Temminck et Schlegel

SCHWARZWANGEN-LAUBSÄNGER
Abroscopus schisticeps (G.R. Gray)

MASKENHÄHERLING
Garrulax perspicillatus (Gmelin)

Anderer Name für den → FLUSSRFGEN-PFEIFER, Charadrius dubius Scopoli.
Synonym → JĪNKUÀNG HÉNG 金眶鹤

SCHWARZHALSSTAR
Gracupica nigricollis (Paykull)

BRUSTBANDHÄHERLING
Garrulax pectoralis (Gould)

BRAUENROHRSÄNGER (STREIFENROHRSÄNGER)
Acrocephalus bistrigiceps Swinhoe

SCHOPFPAPAGEISCHNABEL (SCHOPFPAPAGEIMEISE)
Paradoxornis atrosuperciliaris (Godwin-Austen)

BIRKHUHN
Lyrurus tetrix (Linnaeus)

Die Gattung PYRRHOPECTES Hodgson

TEICHHUHN
Gallinula chloropus (Linnaeus).
Synonym → HÓNGGUDÍNG 红骨顶

Die Gattung GALLINULA Brisson

HĒI TIĚLIÀNJIĀ 黑铁炼甲

3:129

HĒITÓU CHÁNGWĒISHĀNQUÈ 黑头长尾山雀
2:348; 3:213

HĒITÓU HUÁNGLÍ 黑头黄鹂
2:74

HĒITÓU JIĀOZHÌ 黑头角雉
1:93

HĒITÓU JĪNCHÌ 黑头金翅
(2:391)

HĒITÓU JĪNCHÌQUÈ 黑头金翅雀
(2:391)

HĒITÓU LÀZUÍQUÈ 黑头蜡嘴雀
2:423; 3:229

HĒITÓU ŌU 黑头鸥
(1:150)

HĒITÓU QÍMÉI 黑头奇鹛
2:248

HĒITÓU SHĀNQUÈ 黑头山雀
2:348

HĒITÓU SHÍ 黑头䴓
2:351; 3:215

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → SEIDENDRONGO, Dicrurus hottentottus (Linnaeus). → FÀGUĀN JUĀNWĒI 发冠卷尾

ROSTWANGEN-SCHWANZMEISE
Aegithalos iouschistos (Blyth).
Synonym → HĒITÓU SHĀNQUÈ 黑头山雀

SCHWARZKOPFPIROL
Oriolus xanthornus (Linnaeus)

SCHWARZKOPF-TRAGOPAN
Tragopan melanocephalus (J.E. Gray)

SCHWARZKOPFGRÜNLING
Chloris ambigua (Oustalet). Synonym → HĒITÓU JĪNCHÌQUÈ 黑头金翅雀

Andere Bezeichnung für den → SCHWARZKOPFGRÜNLING, Chloris ambigua (Oustalet). → HĒITÓU JĪNCHÌ 黑头金翅

MASKENKERNBEISSER
Eophona personata (Temminck et Schlegel). Synonym → DÀ HĒITÓU LÀZUÍQUÈ 大黑头蜡嘴雀

LÖNNBERGMÖWE
Larus relictus Lönnberg

SCHWARZKAPPENTIMALIE
Heterophasia capistrata (Vigors)

Andere Bezeichnung für die → ROSTWANGEN-SCHWANZMEISE, Aegithalos iouschistos (Blyth). → HĒITÓU CHÁNGWĒISHĀNQUÈ 黑头长尾山雀

CHINESENKLEIBER
Sitta villosa Verreaux

HĒITÓU SUÌMÉI 黑头穗鹛

2:182

HĒITÓU WŪ 黑头鶲

2:431

HĒITÓU ZÀOYĀ 黑头噪鹛

2:88

HĒIWĒI CHÉNGYÙ 黑尾塍鶲

1:133

HĒIWĒI DÌYĀ 黑尾地鶲

2:99

HĒIWĒI LÀZUÍQUÈ 黑尾蜡嘴雀

2:424; 3:229

HĒIWĒI ŌU 黑尾鸥

1:147

HĒIXIōNG DōNG 黑胸鵟

2:158

HĒIXIōNG FēNGHŪ 黑胸蜂虎

1:214

HĒIXIōNG GēQÚ 黑胸歌鶻

(2:128)

HĒIXIōNG MÁQUÈ 黑胸麻雀

2:374

HĒIXIōNG TÀIYÁNGNIĀO 黑胸太阳

鸟

2:365

HĒIXIōNG XIÁN 黑胸鹇

1:97

SCHWARZKOPF-BAUMTIMALIE

Stachyris nigriceps Blyth

KAPPENAMMER

Emberiza melanocephala Scopoli

SZETSCHWANHÄHER

Perisoreus internigrans (Thayer et Bangs)

UFERSCHNEPFE

Limosa limosa (Linnaeus)

MONGOLENHÄHER

Podoces hendersoni Hume

SCHWARZSCHWANZ-KERNBEISSE

Eophona migratoria Hartert

JAPANMÖWE

Larus crassirostris Vieillot

SCHWARZBRUSTDROSSEL

Turdus dissimilis Blyth

BENGALENSPINT

Merops leschenaulti Vieillot

ALPENRUBINKEHLCHEN

Calliope pectoralis Gould

WEIDENSPERLING

Passer hispaniolensis (Temminck)

SCHWARZKEHL-NEKTARVOGEL

Aethopyga saturata (Hodgson)

SCHWARZBRUSTFASAN

Lophura leucomelana lathami (J.E. Gray). (Wahrscheinlich ist *Lophura leucomelana* nur eine Rassengruppe der Art *Lophura nycthemera*).

HĒIYĀN 黑鳩

(1:20; 3:36)

HĒIYĀN SHŪ 黑鳩属

(1:20)

HĒIYĀN 黑雁

1:26

HĒIYĀN SHŪ 黑雁属

1:25

HĒIYÁNGQUÈ 黑洋雀

3:161

HĒIYĀN'ŌU SHŪ 黑燕鸥属

1:157

HĒIZHĒN HUÁNGLÍ 黑枕黄鹂

2:73; 3:127

HĒIZHĒN WÁNGWĒNG 黑枕王鹟

2:327

HĒIZHĒN WÁNGWĒNG SHŪ 黑枕王鹟属

2:327

HĒIZHĒN YÀN'ŌU 黑枕燕鸥

1:155

HĒIZHUÓMÙNIĀO 黑啄木鸟

1:228

HĒIZHUÓMÙ SHŪ 黑啄木属

1:228

HĒIZUÍ ŌU 黑嘴鸥

1:151

SCHWARZDOMMEL

Ixbrychus flavicollis (Latham)

Untergattung DUPETOR Heine et Reichenow der Gattung IXOBRYCHUS Billberg

RINGELGANS

Branta bernicla (Linnaeus)

Die Gattung BRANTA Scopoli

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für die → AMSEL, *Turdus merula* Linnaeus. → WŪ DōNG 鸟鵠

Die Gattung ANOUS Stephens

SCHWARZNACKENPIROL

Oriolus chinensis Linnaeus

SCHWARZNACKENMONARCH

Hypothymis azurea (Boddaert)

Die Gattung HYPOTHYMIS Boie

SCHWARZNACKEN-SEESCHWALBE

Sterna sumatrana Raffles

SCHWARZSPECHT

Dryocopus martius (Linnaeus)

Die Gattung DRYOCOPUS Boie

KAPPENMÖWE

Larus saundersi (Swinhoe)

	HEN-HENG		HÓNGCHÌ SŌUMÉI 红翅薮鹛 2:219	KARMINFLÜGELHÄHERLING <i>Liocichla phoenicea</i> (Gould)
HÈNHÚ 恨狐 3:89; 3:90	Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) 1. für den → UHU, <i>Bubo bubo</i> (Linnaeus), 2. für den → HIMLAYA-FISCHUHU, <i>Ketupa flavipes</i> (Hodgson)		HÓNGCHÌ XUÁNBÍQUÈ 红翅旋壁雀 2:355; 3:216	MAUERLÄUFER <i>Tichodroma muraria</i> (Linnaeus)
HÉNGBĀNFÙ XIÀOXIĀO 横斑腹小鸮 1:195	BRAHMAKAUZ <i>Athene brama</i> (Temminck)		HÓNGDIĀNKĒ 红点颏 (2:127; 3:147)	RUBINKEHLCHEN (KALLIOPE) <i>Calliope calliope</i> (Pallas)
HÉNGBĀN YĪNG 横斑莺 2:271	SPERBERGRASMÜCKE <i>Sylvia nisoria</i> (Bechstein)		HÓNGDÌNG LÙJIŪ 红顶绿鸠 1:162	FORMOSA-GRÜNTAUBE <i>Treron formosae</i> Swinhoe
HÉNG KĒ 鸬科 1:123; 3:67	Die Familie Charadriidae (Regenpfeifer)		HÓNGDÌNG MÉI 红顶鹛 2:184	ROTKÄPPCHENTIMALIE <i>Timalia pileata</i> Horsfield
HÉNG SHǔ 鸬属 (1:125)	Die Gattungen PLUVIALIS Brisson, EUDROMIAS Brehm, EUPODA Brandt und CHARADRIUS Linnaeus		HÓNGDÌNG SUÌMÉI 红顶穗鹛 2:181; 3:168	ROTKOPF-BAUMTIMALIE <i>Stachyris ruficeps</i> Blyth
HÉNG-XÍNG MÙ 鸬形目 1:122	Die Ordnung CHARADRIIFORMES (Wattvögel). Synonym → YÙ-XÍNG MÙ 鹮形目		HÓNGÉ JÍNCHÌ 红额金翅 (2:392)	STIEGLITZ (DISTELFINK) <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus). Synonym → HÓNGÉ JÍNCHÌQUÈ 红额金翅雀
HÓNGBÈI HÓNGWÉIQÚ 红背红尾鵙 2:134	HONG-HOU		HÓNGÉ JÍNCHÌQUÈ 红额金翅雀 (2:392)	Andere Bezeichnung für den → STIEGLITZ (DISTELFINK), <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus). → HÓNGÉ JÍNCHÌ 红额金翅
HÓNGCHÌ FÈNGTÓUJUĀN 红翅凤头鹃 1:175; 3:84	SPROSSEROTSCHEWANZ (ZÜGELROTSCHEWANZ) <i>Phoenicurus erythronotus</i> (Eversmann)		HÓNGÉ YUÁNQUÈ 红额原雀 (2:418)	RHODODENDRONGIMPEL <i>Pinicola subhimachala</i> (Hodgson)
HÓNGCHÌ JUÉMÉI 红翅购物中心 2:224	KOROMANDELKUCKUCK <i>Clamator coromandus</i> (Linnaeus)		HÓNGÉR BĒI 红耳鹀 2:54	ROTOHRBÜLBÜL <i>Pycnonotus jocosus</i> (Linnaeus)
HÓNGCHÌ LÙJIŪ 红翅绿鸠 3:78	SCHWARZKAPPEN-WÜRGERTIMALIE <i>Pteruthius erythropterus</i> (Vigors)		HÓNGFÙ BÍNYÙ 红腹滨鹬 1:140	KNUTT <i>Calidris canutus</i> (Linnaeus)
	Andere Bezeichnung für die → SIEBOLDTAUBE, <i>Treron sieboldii</i> (Temminck). Synonym → LÙJIŪ 绿鸠		HÓNGFÙ HÓNGWÉIQÚ 红腹红尾鵙 2:138	RIESENROTSCHEWANZ (WEISSKAPPEN-ROTSCHWANZ) <i>Phoenicurus erythrogaster</i> (Güldenstädt)
			HÓNGFÙ HUÍQUÈ 红腹灰雀 2:423	GIMPEL <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus)

HÓNGFÙ JIĀOZHÌ 红腹角雉
3:56

HÓNGFÙ JÍNJÍ 红腹锦鸡
1:108; 3:60

HÓNGFÙ SHĀNQUÈ 红腹山雀
2:343; 3:212

HÓNGGUǐDǐNG 红骨顶
1:119; (3:65)

HÓNGHÈ 红鹤
1:24; 3:37

HÓNGHÈ WĒNG 红褐翁
2:325; 3:205

HÓNGHÓU LIÙ 红喉鹨
2:29

HÓNGHÓU QIÁNNIÃO 红喉潜鸟
1:1

HÓNGHÓU SHĀNZHÈGŪ 红喉山鹧鸪
1:87

HÓNGHÓU WĒNG 红喉翁
2:309; 3:200

HÓNGJĪ 红鸡
3:56

Andere Bezeichnung für den → TEMMINCK-TRAGOPAN, *Tragopan temminckii* (J.E. Gray). → HUÍBĀN JIĀOZHÌ 灰斑角雉

GOLDFASAN
Chrysolophus pictus (Linnaeus).
Synonym → JÍNJÍ 锦鸡

DAVIDMEISE
Parus davidi (Berezovski et Bianchi)

Andere Bezeichnung für das → TEICH-HUHN, *Gallinula chloropus* (Linnaeus). Synonym → HĒISHUÍJÍ 黑水鸡

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → NIPPONIBIS, *Nipponia nippon* (Temminck). → ZHŪ-HUÁN 朱鹮

ROSTSCHNÄPPER
Muscicapa ferruginea (Hodgson)

ROTKEHLPIEPER
Anthus cervinus (Pallas)

STERNTAUCHER
Gavia stellata (Pontoppidan)

ROTKEHL-BUSCHWACHTEL
Arborophila rufogularis (Blyth)

ZWERGSCHNÄPPER
Ficedula parva (Bechstein). Synonym → HUÁNGDIĀNKĒ 黄点颏

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → TEMMINCK-TRAGOPAN, *Tragopan temminckii* (J.E. Gray). → HÓNGFÙ JIĀOZHÌ 红腹角雉, → HUÍBĀN JIĀOZHÌ 灰斑角雉

HÓNGJIĀO HÈ YÙ 红脚鹤鹬
1:133

HÓNGJIĀO JIĀNNIÃO 红脚鲣鸟
1:9

HÓNGJIĀO KÜÈNIÃO 红脚苦恶鸟
1:117

HÓNGJIĀO SŪN 红脚隼
1:70

HÓNG JIĀOXIĀO 红角鸮
1:185

HÓNGJIĀO YÙ 红脚鵠
1:134

HÓNG JIĀOZUÍQUÈ 红交嘴雀
2:415; 3:226

HÓNGJÍNG BÀNPŪYÙ 红颈瓣蹼鹬
1:145

HÓNGJÍNG WĒI WŪ 红颈苇鳽
2:444

HÓNGLIĀN LÚCÍ 红脸鸬鹚
1:11

HÓNGLÍNG LÜ YÍNGWŪ 红领绿鹭武
1:173

HÓNGMÁLIÀO 红麻料
3:225

HÓNGMÉIHUĀQUÈ 红梅花雀
(2:385)

HÓNGMÉIHUĀQUÈ SHÙ 红梅花雀属
(2:385)

Andere Bezeichnung für den → DUNKLEN WASSERLÄUFER, *Tringa erythropus* (Pallas). Synonym → HÈ YÙ 鹤鹬

ROTFUSSTÖLPEL
Sula sula (Linnaeus)

BRAUNBAUCH-KIELRALLE
Amaurornis akool (Sykes)

ROTFUSSFALKE
Falco vespertinus Linnaeus

SUNIAEULE
Otus sunia (Hodgson)

ROTSCHENKEL
Tringa totanus (Linnaeus)

FICHTENKREUZSCHNABEL
Loxia curvirostra Linnaeus

ODINSHÜNCHE
Phalaropus lobatus (Linnaeus)

MANDSCHURENAMMER
Emberiza yessoensis (Swinhoe)

ROTGESICHTSCHARBE
Phalacrocorax urile (Gmelin)

HALSBANDSITTICH (KLEINER ALEXANDER-SITTICH)
Psittacula krameri (Scopoli)

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für das Männchen des → KARMINGIMPEL, *Carpodacus erythrinus* (Pallas). → ZHŪQUÈ 朱雀, Qīng-MÁLIÀO 青麻料

TIGERFINK (TIGERA STRILD)
Amandava amandava (Linnaeus)

Die Gattung AMANDAVA Blyth

HÓNGMÉI ZHŪQUÈ 红眉朱雀	SCHMUCKGIMPEL
2:409; 3:225	<i>Carpodacus pulcherrimus</i> (Moore)
HÓNG SŪN 红隼	TURMFALKE
1:71; 3:52	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus
HÓNGTÓU CHÁNGWĒISHĀNQUÈ 红头长尾山雀	ROSTKAPPEN-SCHWANZMEISE
2:347; 3:213	<i>Aegithalos concinnus</i> (Gould). Synonym → HÓNGTÓU SHĀNQUÈ 红头山雀
HÓNGTÓU HUĪQUÈ 红头灰雀	ROTKOPFGIMPEL
2:422	<i>Pyrrhula erythrocephala</i> Vigors
HÓNGTÓU QIÁNYÀ 红头潜鸭	TAFELENTE
1:34	<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus)
HÓNGTÓU SHĀNQUÈ 红头山雀	Andere Bezeichnung für die → ROTKAPPEN-SCHWANZMEISE, <i>Aegithalos concinnus</i> (Gould). → HÓNGTÓU CHÁNGWĒISHĀNQUÈ 红头长尾山雀
2:347	Eine Rassengruppe der → ROTKOPFBAUMTIMALIE, <i>Stachyris ruficeps</i> Blyth
HÓNGTÓU SUÌMÉI 红头穗鹛	ROTKOPFTROGON
(2:180)	<i>Harpactes erythrocephalus</i> (Gould)
HÓNGTÓU YÀOJUĀN 红头咬鹃	ROTKOPFHÄHERLING
1:208	<i>Garrulax erythrocephalus</i> (Vigors)
HÓNGTÓU ZÀOMÉI 红头噪鹛	Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für das → CHUKARHUHN, <i>Alectoris chukar</i> (J.E. Gray). → SHÍJÍ 石鸡
2:217	Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → KOËL, <i>Eudynamys scolopacea</i> (Linnaeus). → ZÀOJUĀN 噪鹛
HÓNGTUÍJÍ 红腿鸡	ROTSCHWANZWÜRGER
3:53	<i>Lanius cristatus</i> Linnaeus
HÓNGWÀ QUÈ 红娃雀	
3:87	
HÓNGWÉI BÓLÁO 红尾伯劳	
2:65; 3:124	

HÓNGWÉI DÖNGMÉI 红尾鵙鹛	STUTZSCHWANZ-ZAUNKÖNIGTIMALIE
2:175	<i>Napothena brevicaudata</i> (Blyth)
HÓNGWÉI GĒQÚ 红尾歌鹛	SCHWIRRNACHTIGALL
(2:124)	<i>Pseudaedon sibilans</i> (Swinhoe)
HÓNGWÉI MÉNG 红尾鹛	ROTSCHWANZ-TROPIKVOGEL
1:8	<i>Phaethon rubricauda</i> Boddaert
HÓNGWÉI IQÚ SHŪ 红尾鸽属	Die Gattung PHOENICURUS T. Forster
2:134	
HÓNGWÉI SHUÍQÚ 红尾水鹛	WASSERRÖTEL
(2:140); 3:153	<i>Rhyacornis fuliginosus</i> (Vigors)
HÓNGWÉI XĪQÚ 红尾溪鹛	
Chaimarrornis fuliginosus (Vigors)	
→ HÓNGWÉI SHUÍQÚ 红尾水鹛	
<i>Rhyacornis fuliginosus</i> (Vigors)	
2:140, 3:153	
HÓNGXIÉ LÁNWĒI QU 红肠蓝尾鹟	BLAUSCHWANZ
2:131; 3:148	<i>Tarsiger cyanurus</i> (Pallas)
HÓNGXIÉ XIÙYĀNNIĀO 红肠绣眼鸟	ROTFALKEN-BRILLENOVAGEL
(2:372; 3:220)	<i>Zosterops erythropleurus</i> Swinhoe
HÓNGXIŌNG BĪNYÙ 红胸滨鹬	ROTKEHL-STRANDLÄUFER
1:140	<i>Calidris ruficollis</i> (Pallas)
HÓNGXIŌNG HÉNG 红胸鹤	WERMUTREGENPFEIFER, <i>Eupoda asiatica</i> (Pallas), und HUFEISENREGENPFEIFER, <i>Eupoda veredus</i> (Gould)
(1:130)	
HÓNGXIŌNG JIĀOZHÌ 红胸角雉	SATYR-TRAGOPAN
1:93	<i>Tragopan satyra</i> (Linnaeus)
HÓNGXIŌNG QIŪSHĀYĀ 红胸秋沙鸭	MITTELSÄGER
1:40	<i>Mergus serrator</i> Linnaeus
HÓNGXIŌNG SHĀNZHÈGŪ 红胸山鹧鸪	BOULTONBUSCHWACHTEL
1:88	<i>Arborophila rufipectus</i> Boulton

HÓNGXIōNG TIÁNJÍ 红胸田鸡

1:116; 3:63

HÓNGXIōNG ZHUÓHUĀNIÀO 红胸啄花鸟

2:363; 3:218

HÓNGXIōNG ZHŪQUÈ 红胸朱雀

2:403

HÓNG YÀN 鸿雁

1:26

HÓNGYĀO ZHŪQUÈ 红腰朱雀

2:406

HÓNGYÍNG 红鹰

3:52

HÓNGZHÌ SHŪ 虹雉属

1:94

HÓNGZUÍ JIŪOÙ 红嘴巨鸥

(1:153)

HÓNGZUÍ LÁNQUÈ 红嘴蓝鹊

(2:93; 3:134)

HÓNGZUÍ ŌU 红嘴鸥

1:150; 3:75

HÓNGZUÍ SHĀNLÀOGUÀ 红嘴山老鸹

3:137

HÓNGZUÍ SHĀNYÀ 红嘴山鸦

(2:102; 3:137)

HÓNGZUÍ XIĀNGSÌNIÀO 红嘴相思鸟

2:221; 3:179

ZIMTSUMPFHUHN

Porzana fusca (Linnaeus)

FEUERBRUST-MISTELFRESSER (FEUER-BRUST-BLÜTENPICKER)

Dicaeum ignipectus (Blyth)

FELSENGIMPEL

Carpodacus puniceus (Blyth)

SCHWANENGANS

Anser cygnoides (Linnaeus)

ROTMANTELGIMPEL

Carpodacus rhodochlamys (Brandt)

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → TURMFALKEN, *Falco tinnunculus* Linnaeus. → HÓNG SŪN 红隼

Die Gattung *LOPHOPHORUS* Temminck

RAUBSEESCHWALBE' (RIESENSEESCHWALBE)

Hydroprogne caspia (Pallas)

ROTSCHNABELKITTA

Urocissa erythrorhyncha (Boddaert)

LACHMÖWE

Larus ridibundus Linnaeus

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für die → ALPENKRÄHE, *Pyrrhocorax pyrrhocorax* (Linnaeus). → HÓNGZUÍ SHĀNYÀ 红嘴山鸦

ALPENKRÄHE

Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus)

SONNENVOGEL (CHINANACHTIGALL)

Leiothrix lutea (Scopoli)

HÓNGZUÍYÀQUÈ 红嘴鹤雀

2:187; 3:169

HÓNGZUÍYÀQUÈ SHŪ 红嘴鹤雀属

2:187

HÒUZUÍ SHĀNJIŪ 厚嘴山鵲

1:163

KRÄHENMEISE

Conostoma aemodium Hodgson

Die Gattung *CONOSTOMA* Hodgson

PAPAGEISCHNABELTAUBE

Treron curvirostra (Gmelin)

HU

ERDDROSSEL (GOLDDROSSEL), *Zoothera dauma* (Latham). Ein anderer, älterer Name für die Erddrossel findet sich in 2:167, wo sie → HÚBĀN SHĀNDŌNG 虎斑山鶲 genannt wird

Ein (älterer) Name für die ERD-DROSSEL (GOLDDROSSEL), *Zoothera dauma* (Latham). 2:167. - In 3:160 lautet der (neuere) chinesische Name → HÚBĀN DÌDŌNG 虎斑地鶲

Die Gattung *GORSACHIUS* Bonaparte

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → WIEDEHOPF, *Upupa epops* Linnaeus. → DÀISHèng 戴胜

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → BERGFINK, *Fringilla montifringilla* Linnaeus. → YÀNQUÈ 燕雀

Andere Bezeichnung für die Gattung *CYGNUS* Bechstein. → TIĀNÉ SHŪ 天鹅属

RIESENSEEADLER

Haliaeetus pelagicus (Pallas)

HŪWÉN BÓLÁO 虎纹伯劳

2:67; 3:125

HÚWÙJÌU 胡兀鹫

1:60

HÚWÙJÌU SHǔ 胡兀鹫属

1:60

TIGERWÜRGER

Lanius tigrinus Drapiez

BARTGEIER (LÄMMERGEIER)

Gypaetus barbatus (Linnaeus)Die Gattung *GYPAETUS* Storr

HUA

HUĀ BĀNJIŪ 花斑鳩

3:82

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für die → PERLHALSTAUBE, *Streptopelia chinensis* (Scopoli). → ZHŪJǐNG BĀNJIŪ 珠颈斑鳩

HUĀBÀO 花豹

3:48

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → MONGOLENBUSSARD, *Buteo hemilasius* Temminck et Schlegel. → DÀ KUÁNG 大鵟

HUĀBÈI ZÀOMÉI 花背噪鹛

2:208

RIESENHÄHERLING
Garrulax maximus (Verreaux)

HUĀ BĒNDĀMÙ 花奔打木

3:103

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → BUNTSPECHT, *Dendrocopos major* (Linnaeus). → BĀN ZHUÓMÙNIĀO 斑啄木鸟, → DÀ BĀN ZHUÓMÙNIĀO 大斑啄木鸟

HUĀCÁI QUÈYÍNG 花彩雀莺

2:295

PURPURHÄHNCHEN
Leptopoecile sophiae Severtzov

HUĀ GŪNIĀNG 花姑娘

3:100

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → WIEDEHOPF, *Upupa epops* Linnaeus. → DÀISHÈNG 戴胜

HUĀJĪ 花鸡

3:59

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → KÖNIGSFASAN, *Syrmaticus reevesii* (J.E. Gray). → CHÁNGWÉIZHÌ 长尾雉, → BÁIGUĀN CHÁNGWÉIZHÌ 白冠长尾雉

HUĀJĪ 画鸡

3:59

HUĀLIĀN YĀ 花脸鸭

1:32; 3:41

HUĀMÉI 画眉

2:212; 3:177

HUĀMÉI KĒ 画眉科

(2:169)

HUĀMÉIZI 花眉子

3:236

HUĀMÌNIĀO SHǔ 花蜜鸟属

(2:364)

HUĀTÓU YīNGWǔ 花头鹦鹉

(1:174)

HUÁXī ZHĒNJī 华西榛鸡

1:75

HUĀYĀN'R 花燕儿

3:110

HUĀYĀNGJĪ 花秧鸡

(1:117)

HUĀYĀNGJĪ SHǔ 花秧鸡属

1:117

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → KÖNIGSFASAN, *Syrmaticus reevesii* (J.E. Gray). → CHÁNGWÉIZHÌ 长尾雉, → BÁIGUĀN CHÁNGWÉIZHÌ 白冠长尾雉GLUCKENTE
Anas formosa GeorgiAUGENBRAUENHÄHERLING (CHINESISCHE SPOTTDROSSEL)
Garrulax canorus (Linnaeus)

Die Familien PARADOXORNITHIDAE (Papageischnäbel) und TIMALIIDAE (Timaliiden oder Drosselmeisen)

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für die → WALDAMMER, *Emberiza rustica* Pallas. → TIÁN WŪ 田鸡

Die Gattungen HYPOGRAMMA Reichenbach und NECTARNIA Illiger

ROSENKOPFSITTICH
Psittacula roseata BiswasSCHWARZBRUST-HASELHUHN
Tetrastes sewerzowi PrzevalskiVolkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für die → RÖTELNSCHWALBE, *Cecropis daurica* (Linnaeus). → JÍNYĀO YÀN 金腰燕MANDSCHURENRALLE
Coturnicops exquisitus (Swinhoe)

Die Gattung COTURNICOPS G.R. Gray

	HUAN
HUÁNJÍNG HÉNG 环颈鹤 1:127	SEEREGENPFEIFER <i>Charadrius alexandrinus</i> Linnaeus. Synonym → BÁILÍNG HÉNG 白领鹤
HUÁNJÍNG SHĀNZHÈGŪ 环颈山鹧鸪 1:87	HÜGELHUHN <i>Arborophila torqueola</i> (Valenciennes)
HUÁNJÍNG ZHÌ 环颈雉 1:102; 3:58	JAGDFASAN (FASAN) <i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus. Synonym → ZHÌ 雉
HUÁN KĒ 鹤科 1:23; 3:37	Die Familie THRESKIORNITHIDAE (Ibisse)
HUÁNZUÍYÙ 鹤嘴鹬 1:144; 3:74	IBISSCHNABEL <i>Ibidorhyncha struthersii</i> Vigors
HUÁNZUÍYÙ SHÙ 鹤嘴鹬属 1:144	Die Gattung IBIDORHYNCHA Vigors
	HUANG
HUÁNGBĀN WĒIYÁN 黄斑苇鳽 1:19; 3:35	CHINESENDOMMEL <i>Ixobrychus sinensis</i> (Gmelin)
HUÁNGDIÁNKĒ 黄点颏 2:309; 3:200	Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) sowie allgemeingültiger Alternativname für den → ZWERGSCHNÄPPER, <i>Ficedula parva</i> (Bechstein). → HÓNGHÓU WĒNG 红喉鵙
HUÁNGDÒUQUÈ 黄豆雀 (3:224)	Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → CHINESENGRÜNLING, <i>Chloris sinica</i> (Linnaeus). → JÍNCHÌ 金翅
HUÁNG'É YÀQUÈ 黄额鸦雀 2:193; 3:172	GELBSTIRN-PAPAGEISCHNABEL (GELB-STIRN-PAPAGEIMEISE) <i>Paradoxornis fulvifrons</i> (Hodgson)

HUÁNGFŪ HUĀMÌNIĀO 黄腹花蜜鸟 2:364	SCHMUCKNEKTARVOGEL <i>Nectarinia jugularis</i> (Linnaeus)
HUÁNGFŪ JIÁOZHÌ 黄腹角雉 1:94	BRAUNBAUCH-TRAGOPAN <i>Tragopan caboti</i> (Gould)
HUÁNGFŪ LIŪYĪNG 黄腹柳莺 2:274; 3:190	HIMALAYALAUBSÄNGER <i>Phylloscopus affinis</i> (Tickell). → LIŪCHUĀN'R 柳串儿
HUÁNGFŪ SHĀNQUÈ 黄腹山雀 2:335; 3:210	SCHMUCKMEISE <i>Parus venustulus</i> Swinhoe
HUÁNGFŪ SHÀNWĒIWĒNG 黄腹扇尾 鹤 (2:330)	GELBBAUCH-FÄCHERSCHWANZ <i>Chelidonyx hypoxantha</i> Blyth
HUÁNGFŪ SHÙYĪNG 黄腹树莺 2:256; 3:187	BAMBUSBUSCHSÄNGER <i>Cettia acanthizoides</i> (Verreaux)
HUÁNGFŪ WĒNGYĪNG 黄腹鹛莺 (2:294)	BAMBUSLAUBSÄNGER <i>Abroscopus superciliaris</i> (Blyth)
HUÁNGFŪ ZÀOMÉI 黄腹噪鹛 2:205	GELBBAUCHHÄHERLING <i>Garrulax galbanus</i> Godwin-Austen
HUÁNGFŪ ZHUÓHUĀNIĀO 黄腹啄花 鸟 2:361	GELBBAUCH-MISTELFRESSER (GELBBAUCH-BLÜTENPICKER) <i>Dicaeum melanoxanthum</i> (Blyth)
HUÁNGFŪ ZHUÓMÙNIĀO 黄腹啄木鸟 1:232	BRAUNBAUCHSPECHT <i>Dendrocopos darjellensis</i> (Blyth)
HUÁNGGĀNG ZHUÓHUĀNIĀO 黄肛啄花 鸟 2:360	GELBSTEISS-MISTELFRESSER (GELB-STEISS-BLÜTENPICKER) <i>Dicaeum chrysorrheum</i> Temminck et Laugier
HUÁNGGUĀLÓU 黄瓜棱 3:127	Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → SCHWARZNACKEN-PIROL, <i>Oriolus chinensis</i> Linnaeus. → HĒIZHĒN HUÁNGLÍ 黑枕黄鹂
HUÁNGGUĀN LÙZHUÓMÙNIĀO 黄冠绿 啄木鸟 1:227	GELBHAUBENSPECHT <i>Picus chlorolophus</i> Vieillot

HUÁNGHÓU FÉNGHŪ 黄喉蜂虎
1:215

HUÁNGHÓU WŪ 黄喉鹀
2:433; 3:232

HUÁNGJIǎO SĀNZHÍCHŪN 黄脚三趾
鹑
1:109; 3:61

HUÁNGJIÁ SHĀNQUÈ 黄颊山雀
(2:334)

HUÁNG JÍLÍNG 黄鹡鸰
2:38; 3:118

HUÁNGJǐNG Fèngméi 黄颈凤鹛
2:232

HUÁNG Lǎoguā 黄老鸹
3:127

HUÁNGLÍ KĒ 黄鹂科
2:72; 3:127

HUÁNGLÍ SHǔ 黄鹂属
2:72

HUÁNGMÉI LÍNQUÈ 黄眉林雀
2:345

HUÁNGMÉI LIÜYÍNG 黄眉柳莺
2:280; 3:192

HUÁNGMÉI WŪ 黄眉鹀
2:442

HUÁNGMÉIZI 黄眉子
3:232

BIENENFRESSER
Merops apiaster Linnaeus

SCHMUCKAMMER
Emberiza elegans Temminck

ROTNACKEN-LAUFHÜHNCHEN
Turnix tanki Blyth

KÖNIGSMEISE
Parus spilonotus Bonaparte

SCHAFSTELZE
Motacilla flava Linnaeus

GELBNACKENTIMALIE
Yuhina flavicollis Hodgson

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → SCHWARZNACKEN-PIROL, *Oriolus chinensis* Linnaeus.
→ HĒIZHĒN HUÁNLÍ 黑枕黄鹂

Die Familie ORIOLIDAE (Pirole)

Die Gattung *ORIOLUS* Linnaeus

LAUBMEISE
Sylviparus modestus Burton

GELBBRAUEN-LAUBSÄNGER
Phylloscopus inornatus (Blyth).
→ LIÜCHUÀN'R 柳串儿, → SHÙCHUÀN'R 树串儿

PRACHTAMMER
Emberiza chrysophrys Pallas

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi für die → SCHMUCKAMMER, *Emberiza elegans* Temminck. → HUÁNG-HÓU WŪ 黄喉鹀

HUÁNGQUÈ 黄雀
(2:392)

HUÁNGTÓU JÍLÍNG 黄头鹡鸰
2:37; 3:117

HUÁNGTÓU LÙ 黄头鹭
3:34

HUÁNGTÓU SHÀNWĒIYÍNG 黄头扇尾
莺
2:300

HUÁNGTÚN BĒI 黄臀鵙
2:55; 3:121

HUÁNGWÉN NǐZHUÓMÙ 黄纹拟啄木
鸟
1:220

HUÁNG WŪ 黄鹀
2:434

HUÁNGXIōNG LIÜYÍNG 黄胸柳莺
2:289

HUÁNGXIōNG SōUMÉI 黄胸薮鹛
2:220

HUÁNGXIōNG WŪ 黄胸鹀
2:432; 3:232

HUÁNGXIōNG ZHīBUNIǎO 黄胸织布
鸟
2:384

HUÁNG YĀ 黄鸭
3:39

HUÁNGYĀO LIÜYÍNG 黄腰柳莺
2:281; 3:193

ZEISIG (ERLENZEISIG)
Spinus spinus (Linnaeus)

ZITRONENSTELZE
Motacilla citreola Pallas

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → KUHREIHER, *Bubulcus ibis* (Linnaeus). → NIÚBÈILÙ 牛背鹭

GOLDKOPF-CISTENSÄNGER
Cisticola exilis (Vigors et Horsfield)

GELBSTEISSBÜLBÜL
Pycnonotus xanthorrhous Anderson

GRÜNOHR-BARTVOGEL
Megalaima faiostricta (Temminck)

GOLDAMMER
Emberiza citrinella Linnaeus

GELBBRUST-LAUBSÄNGER
Phylloscopus cantator (Tickell)

FORMOSAHÄHERLING
Liocichla steerii Swinhoe

WEIDENAMMER
Emberiza aureola Pallas

BAJAWEBER
Ploceus philippinus (Linnaeus)

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für die → ROSTGANS, *Casarca ferruginea* (Pallas). → CHÌ MÁYĀ 赤麻鸭

GOLDHÄHNCHEN-LAUBSÄNGER
Phylloscopus proregulus (Pallas).
→ LIÜCHUÀN'R 柳串儿

HUÁNGYĀO TÀIYÁNGNIĀO 黄腰太阳鸟
2:366

HUÁNGYÍNG SHŪ 蜂莺属
2:263

HUÁNZHĀO SŪN 黄爪隼
1:71

HUÁNZUÌ BÁILÙ 黄嘴白鹭
1:17

HUÁNZUÌJIĀN YĀ 黄嘴尖鸭
3:42

HUÁNZUÌ JIÀOXIĀO 黄嘴角鸮
1:184

HUÁNZUÌ LÁNQUÈ 黄嘴蓝鹊
(2:92)

HUÁNZUÌ SHĀNYĀ 黄嘴山鸦
(2:103)

HUÁNZUÌ YĀQUÈ 黄嘴鸦雀
2:197; 3:172

HUÁNZUÌ ZÀOZHUÓMÙNIĀO 黄嘴噪啄木鸟
1:240

HUÁNZUÌ ZHŪDÍNGQUÈ 黄嘴朱顶雀
(2:394)

HUÍBĀNHÉNG 灰斑鶲
(1:125)

SCHARLACHNEKTARVOGEL (GELBRÜCKEN-NEKTARVOGEL)
Aethopyga siparaja (Raffles)

Die Gattung LOCUSTELLA Kaup

RÖTELFALKE

Falco naumanni Fleischer

SCHNEEREITER

Egretta eulophotes (Swinhoe)

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für die → FLECKSCHNABELENTE, *Anas poecilorhyncha* J.R. Forster. → BĀNZUÌ YĀ 斑嘴鸭

FUCHSEULE

Otus spilocephalus (Blyth)

GELBSCHNABELKITTA

Urocissa flavirostris (Blyth)

ALPENDOHLE

Pyrrhocorax graculus (Linnaeus)

SCHWARZKEHL-PAPAGEISCHNABEL (SCHWARZKEHL-PAPAGEIMEISE)

Paradoxornis flavirostris Gould

ROTOHRSPECHT

Blythipicus pyrrhotis (Hodgson)

BERGHÄNFLING

Linaria flavirostris (Linnaeus)

HUI

KIEBITZREGENPFEIFER
Pluvialis squatarola (Linnaeus)

HUÍBĀNHÉNG SHŪ 灰斑鶲属
(1:125)

HUÍBĀN JIÀOZHÌ 灰斑角雉
1:94; 3:56

HUÍ BĀNJIŪ 灰斑鳩
1:169; 3:81

HUÍ BÀNPŪYÙ 灰瓣蹼鹬
1:145

HUÍBÈI BÓLÁO 灰背伯劳
2:72; 3:159

HUÍBÈI DÖNG 灰背鵙
2:158

HUÍBÈI LIÁNGNIĀO 灰背椋鸟
(2:81)

HUÍBÈI ÓU 灰背鸥
1:149

HUÍBÈI SŪN 灰背隼
1:69

HUÍBÈI YÀNWĒI 灰背燕尾
2:144

HUÍ BÓLÁO 灰伯劳
2:69

HUÍCHÌ DÖNG 灰翅鵙
2:160

Die Gattung SQUATAROLA Cuvier, ein früher für den KIEBITZREGENPFEIFER, *Pluvialis squatarola* (Linnaeus), häufig gebrauchter Gattungsname; heute wird eine Gattung SQUATAROLA nicht mehr von PLUVIALIS getrennt.

TEMMINCK-TRAGOPAN

Tragopan temminckii (J.E. Gray).
Synonym → HÓNGFÙ JIÀOZHÌ 红腹角雉.
- HUÍBĀN JIÀOZHÌ ist auch die volkstümliche Bezeichnung für den TEMMINCK-TRAGOPAN in S-Shensi.

TÜRKENTAUBE

Streptopelia decaocto (Frivaldszky)

THORSHÜHNCHEN

Phalaropus fulicarius (Linnaeus)

TIBETWÜRGER

Lanius tephronotus (Vigors)

GRAURÜCKENDROSSEL

Turdus hortulorum Sclater

MANDARINSTAR

Sturnia sinensis (Gmelin)

SCHIEFERRÜCKENMÖWE

Larus schistisagus Stejneger

MERLIN

Falco columbarius Linnaeus

GRAURÜCKEN-SCHERENSCHWANZ

Enicurus schistaceus (Hodgson)

RAUBWÜRGER (GRAUWÜRGER)

Lanius excubitor Linnaeus

BÜLBÜLDROSSEL

Turdus boulboul (Latham)

HUĪCHÌ ŌU 灰翅鸥	BERINGMÖWE
1:149	<i>Larus glaucescens</i> Naumann
HUĪCHÌ ZÀOMÉI 灰翅噪鹛	GRAUHÄHERLING
2:207; 3:175	<i>Garrulax cineraceus</i> (Godwin-Austen)
HUĪFÙ DÌYÍNG 灰腹地莺	GRAUBAUCHTESIA
2:250	<i>Tesia cyaniventer</i> Hodgson
HUĪFÙ HUĪQUÈ 灰腹灰雀	Eine Rassengruppe des Gimpels, <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus)
2:422	
HUĪFÙ XIŪYĀNNIÃO 灰腹绣眼鸟	GANGESBRILLENVOGEL
(2:373)	<i>Zosterops palpebrosus</i> (Temminck)
HUĪFÙ ZÀOMÉI 灰腹噪鹛	PRINZENHÄHERLING
2:216	<i>Garrulax henrici</i> (Oustalet)
HUĪGUĀN YĀQUÈ 灰冠鸦雀	PRZEVALSKI-PAPAGEISCHNABEL (PRZE- VALSKI-PAPAGEIMEISE)
2:193	<i>Paradoxornis przewalskii</i> (Berezows- ki et Bianchi)
HUĪ HÈ 灰鹤	KRANICH
1:110; 3:61	<i>Grus grus</i> (Linnaeus)
HUĪHÓU LIŪYÍNG 灰喉柳莺	GRAUKEHL-LAUBSÄNGER
2:282	<i>Phylloscopus maculipennis</i> (Blyth)
HUĪHÓU SHĀNJIĀONIÃO 灰喉山椒鸟	GRAUKINN-MENNIGVOGEL
2:45	<i>Pericrocotus solaris</i> Blyth
HUĪ HUÒ 灰鹱	DUNKELSTURMTAUCHER
1:6	<i>Puffinus griseus</i> (Gmelin)
HUĪJIÀO LIŪYÍNG 放脚柳莺	USSURILAUBSÄNGER
2:285	<i>Phylloscopus tenellipes</i> Swinhoe
HUĪ JÍLÍNG 灰鵙鹟	GEBIRGSTELZE
2:36; 3:116	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall
HUĪJÍNG WŪ 放颈鹀	STEINORTOLAN
2:436	<i>Emberiza buchanani</i> Blyth

HUĪ JUĀNWĒI 灰卷尾	GRAUDRONGO
2:76; 3:129	<i>Dicrurus leucophaeus</i> Vieillot
HUĪKUĀNG QUÈMÉI 灰眶雀鹛	GRAUKOPFALCIPPE
2:244	<i>Alcippe poioicephala</i> (Jerdon)
HUĪ LÁNQUÈ 灰蓝鹊	GRAUKITTA
(2:92)	<i>Urocissa whiteheadi</i> Ogilvie-Grant
HUĪLÁN SHĀNQUÈ 灰蓝山雀	LASURMEISE
2:336	<i>Parus cyanus</i> Pallas
HUĪLÁN WĒNG 灰蓝鹟	DREIFARBENSCHNÄPPER
2:313; 3:277	<i>Ficedula tricolor</i> (Hodgson)
HUĪ LIÁNGNIÃO 灰椋鸟	GRAUSTAR
(2:83; 3:132)	<i>Sturnopastor cineraceus</i> (Temminck)
HUĪLIĀN KUÁNGYÍNG 灰脸莺鷹	KIEFERNTESA
1:51; 3:49	<i>Butastur indicus</i> (Gmelin)
HUĪLIĀN WĒNGYÍNG 灰脸鹟莺	GRAUWANGEN-LAUBSÄNGER
2:294	<i>Seicercus poliogenys</i> (Blyth)
HUĪ LÍN GĒ 灰林鸽	HIMALAYATAUBE
1:167	<i>Columba pulchricollis</i> Blyth
HUĪ LÍNJÍ 灰林鵖	GRAUSCHMÄTZER
2:148; 3:158	<i>Saxicola ferrea</i> G.R. Gray
HUĪ LÍNXIÃO 灰林鹀	WALDKAUZ
1:196; 3:94	<i>Strix aluco</i> Linnaeus
HUĪ LIŪYÍNG 灰柳莺	PAMIRLAUBSÄNGER
2:276	<i>Phylloscopus griseolus</i> Blyth
HUĪ LÙ 灰鹭	Volkstümliche Bezeichnung (in S- Shensi) für den → FISCHREIHER, (GRAUREIHER), <i>Ardea cinerea</i> Linnae- us. → CĀNG LÙ 苍鹭
3:31	ZIPPAMMER, <i>Emberiza cia</i> Linnaeus, und FELSENAMMER, <i>Emberiza godlews- kii</i> Taczanovski
HUĪMÉI YÁN WŪ 灰眉岩鹀	Volkstümliche Bezeichnung für die → ZIPPAMMER und die → FELSENAMMER
(2:436; 3:234)	
HUĪMÉIZĪ 灰眉子	
3:234	

HUI QIMEI 灰奇鹛

2:248

HUIQUE 灰鵙

3:135

HUIQUE SHU 灰雀属

2:420

HUI SHANJIAONIAO 灰山椒鸟

(2:44)

HUI SHAYAN 灰沙燕

2:18; 3:108

HUI SHUQUE 灰树鵙

(2:97)

HUI TIELIANJIA 灰铁炼甲

3:129

HUITOU BANCHIMEI 灰头斑翅鹛

2:228

HUITOU DONG 灰头鵙

2:162; 3:162

HUITOU JIAOYING 灰头鶲莺

2:303

HUITOU LIANGNIAO 灰头棕鸟

(2:80)

HUITOU MAIJII 灰头麦鸡

1:124; 3:68

HUITOU MAIJISHU 灰头麦鸡属

1:124

HUITOU NANJIU 灰头南鳩

1:164

GRAUTIMALIE

Heterophasia gracilis (Horsfield)Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für die → BLAUELSTER, *Cyanopica cyana* (Pallas). → HUXIQUE

Die Gattung PYRRHULA Brisson

GRAUMENNIGVOGEL

Pericrocotus divaricatus (Raffles)

UFERSCHWALBE

Riparia riparia (Linnaeus)

GRAUBRUSTELSTER

Dendrocitta formosae Swinhoe

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → GRAUDRONGO,

Dicrurus leucophaeus Vieillot. →

HUI JUANWEI 灰卷尾

TONGKINGSIBIA

Actinodura souliei Oustalet

KASTANIENDROSSEL

Turdus rubrocanus G.R. Gray

GELBBAUCHPRINIE

Prinia flaviventris (Delessert)

GRAUKOPFSTAR

Temenuchus malabaricus (Gmelin)

GRAUKOPFKIEBITZ

Microsarrops cinereus (Blyth)

Die Gattung MICROSARCOPS Sharpe

FAHLBAUCH-FRUCHTTAUBE

Ducula badia (Raffles)

HUITOU WENGYING 灰头翁莺

2:293

HUITOU WU 灰头鵙

2:434; 3:233

HUITOU YAQUE 灰头鸦雀

2:196

HUITOU YINGWU 灰头鹦鹉

1:174

HUI WENG 灰鵙

3:204

HUI WU 灰鵙

(2:443)

HUXIE ZAOMEI 灰肠噪鹛

2:210

HUXIONG JIAOYING 灰胸鶲莺

2:301

HUXIONG SOUMEI 灰胸薮鹛

2:220

HUXIQUE 灰喜鹊

2:94; 3:135

HUXIQUE SHU 灰喜鹊属

2:94

HUI YAN 灰雁

1:28

HUI YANJUE 灰燕鶗

2:87

HUI YING 灰莺

2:272

GRAUKOPF-LAUBSÄNGER

Seicercus xanthochistos (G.R. Gray)

MASKENAMMER

Emberiza spodocephala Pallas

GRAUKOPF-PAPAGEISCHNABEL (GRAUKOPF-PAPAGEIMEISE)

Paradoxornis gularis G.R. Gray

HIMALAYASITTICH

Psittacula himalayana (Lesson)

BRAUNSCHNÄPPER

Muscicapa latirostris Raffles. → BEI HUI WENG 北灰鵙, → KUOZUI WENG 阔嘴鵙

BAMBUSAMMER

Tisa variabilis (Temminck)

GRAUFLANKENHÄHERLING

Garrulax caerulatus (Hodgson)

GRAUBRUSTPRINIE

Prinia hodgsonii Blyth

OMEIHÄHERLING

Liocichla omeiensis Riley

BLAUELSTER

Cyanopica cyana (Pallas)

Die Gattung CYANOPICA Bonaparte

GRAUGANS

Anser anser (Linnaeus)

GRAUSCHWALBENSTAR

Artamus fuscus Vieillot

DORNGRASMÜCKE

Sylvia communis Latham

HUÍYÍNG 反鹰

3:50

HUÍ YÙ 灰鹬

Tringa incana brevipes (Vieillot)
(1:135; 3:72)

HUÍZHUĀNG 灰粃

3:32

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für die → KORNWEIHE, *Circus cyaneus* (Linnaeus). → BÁIWĒI YÀO 白尾鶲

GRAUBÜRZEL-WASSERLÄUFER, *Heteroscelus brevipes* (Vieillot), und WANDERWASSERLÄUFER, *Heteroscelus incanus* (Gmelin).

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → PURPURREIHER, *Ardea purpurea* Linnaeus. → CÁO LÜ 草鷺

HUO

HUÓBĀNJIŪ 火斑鳩

(1:172; 3:83)

HUÓBĀNJIŪ SHǔ 火斑鳩属

1:172

HUÓGUĀN DÀIJÚ 火冠戴菊

2:291

HUÓGUĀNQUÈ 火冠雀

2:359; 3:218

HUÓGUĀNQUÈ SHǔ 火冠雀属

2:359

HUÒ KĒ 鸊科

1:5

HUÒ SHǔ 鸊属

(1:5)

ZWERGLACHTAUBE

Streptopelia tranquebarica (Hermann)

OENOPOPELIA Blanford, Gattungsbezeichnung für eine heute nicht mehr von → STREPTOPELIA Bonaparte getrennte Taube

FORMOSAGOLDHÄHNCHEN

Regulus goodfellowi Ogilvie-Grant

FEUERKOPFMEISE

Cephalopyrus flammiceps (Burton)

Die Gattung CEPHALOPYRUS Bonaparte

Die Familie PROCELLARIIDAE (Sturmvögel)

Die Gattungen CALONECTRIS Mathews et Iredale und PUFFINUS Brisson

HUÓWĒI LÙMÉI 火尾绿鹛

2:222

HUÓWĒI TÀIYÁNGNIÃO 火尾太阳鸟

2:367

HUÓWĒI XÌMÉI 火尾希鹛

2:229

HUÒ-XÍNG MÙ 鸶形目

1:4

HUÓYÀN 火燕

3:152

FEUERSCHWANZTIMALIE

Myzornis pyrrhura Blyth

FEUERSCHWANZ-NEKTARVOGEL

Aethopyga ingicauda (Hodgson)

ROTSCHWANZSIVA

Minla ignotincta HodgsonDie Ordnung PROCELLARIIFORMES
(Röhrennasen)

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → SPIEGELROTSCHWANZ, *Phoenicurus auroreus* (Pallas). → BÉI HÓNGWÉIQÚ 北红尾鸲

JI

JÍBĚI LIҮYÍNG 极北柳莺

2:283; 3:194

JÍBĚI ZHÜDÍNGQUÈ 极北朱顶雀

(2:394)

JÍDÖNG SHǔ 琥珀属

2:152

JÍLÍNG KĒ 鹌鹑科

2:26; 3:111

JÍLÍNG SHǔ 鹌鹑属

2:34

JÍMÉI SHǔ 姬鹟属

2:223

JÍ SHǔ 鹂属

2:149

WANDERLAUBSÄNGER (NORDISCHER LAUBSÄNGER)

Phylloscopus borealis (Blasius). → LIÜCHUÀN'R 柳串儿

POLARBIRKENZEISIG

Acanthis hornemannii (Holböll), eine Rassengruppe des BIRKENZEISIGS, *Acanthis flammea* (Linnaeus)

Die Gattung MONTICOLA Boie

Die Familie MOTACILLIDAE (Stelzen)

Die Gattung MOTACILLA Linnaeus

Die Gattung CUTIA Hodgson

Die Gattung OENANTHE Vieillot

JÍ TIÁN JÍ 姪田鸡

1:115

JÍ WÉNG SHŪ 姮鵠属

2:307

JÍ-XÍNG MÙ 鸟形目

1:73; 3:53

JÍ YÙ 犀鶲

(1:135; 3:71)

JÍ YÚ 姮鶲

1:140

JÍ YÚ SHŪ 姮鶲属

1:139

JÍ ZHŪ MÙ 姮啄木鸟

(1:223; 3:101)

JÍ ZHŪ MÙ SHŪ 姮啄木属

(1:222)

KLEINES SUMPFHUHN

Porzana parva (Scopoli)Die Gattungen *FICEDULA* Brisson,
SIPHIA Hodgson und *CYANOPTILA*
BlythDie Ordnung GALLIFORMES (Hühner-
vögel)

FLUSSUFERLÄUFER

Actitis hypoleucos Linnaeus

ZWERGSCHNEPFE

Lymnocryptes minimus (Brünnich)Die Gattung *LYMNOCRYPTES* Kaup

TÜPFELZWERGSPECHT

Vivio innominata (Burton)Die Gattung *VIVIA* Hodgson

JIA

JÍA BĀGÉ 家八哥

2:85

JÍA JÍ 架鸡

3:60

JÍA MÁQUÈ 家麻雀

2:373

JÍA YÀ 家鸭

2:104

HIRTENMAINAI (HIRTENSTAR)

Acridotheres tristis (Linnaeus)Volkstümliche Bezeichnung (in S-
Shensi) für den → GOLDFASAN, *Chry-
solophus pictus* (Linnaeus). → HÓNG-
FÙ JÍNJÍ 红腹锦鸡, → JÍNJÍ 金鸡,
→ JÍNJÍ 锦鸡

HAUSSPERLING (SPATZ)

Passer domesticus (Linnaeus)

GLANZKRÄHE

Corvus splendens Vieillot

JIĀ YÀN 家燕

2:20; 3:109

JIĀN HÉNG 剑鹤

(1:126; 3:69)

JIĀNNIÀO KĒ 鲤鸟科

1:9

JIĀNNIÀO SHŪ 鲤鸟属

1:9

JIĀNSHUIHÙO SHŪ 剪水鹱属

1:5

JIĀNWĒI BÍNYÙ 尖尾滨鹬

1:141

JIĀNWĒI YĀ 针尾鸭

3:40

JIĀNZUÍMÉI 剑嘴鹛

2:175

JIĀNZUÍMÉI SHŪ 剑嘴鹛属

2:175

JIĀNZUÍÔU 剪嘴鸥

1:158

JIĀNZUÍÔU KĒ 剪嘴鸥科

1:158

JIĀNZUÍÔU SHŪ 剪嘴鸥属

1:158

RAUCHSCHWALBE

Hirundo rustica Linnaeus

JIAN

LANGSCHNABEL-REGENPFEIFER

Charadrius placidus J.E. et G.R.
Gray. Synonym → CHÁNGZUÍ HÉNG 长
嘴鸻

Die Familie SULIDAE (Tölpel)

Die Gattung *SULA* BrissonAndere Bezeichnung für die Gattun-
gen *CALONECTRIS* Mathews et Iredale
und *PUFFINUS* Brisson. Synonym →
HUÒ SHŪ 鸬属SPITZSCHWANZ-STRANDLÄUFER
Calidris acuminata (Horsfield)Volkstümliche Bezeichnung (in S-
Shensi) für die → SPIESENTE,
Anas acuta Linnaeus. → ZHĒNWĒI YĀ
针尾鸭SICHELSÄBLER
Xiphirhynchus superciliaris (Blyth)Die Gattung *XIPHIRHYNCHUS* BlythHALSBAND-SCHERENSCHNABEL
Rhynchos albicollis SwainsonDie Familie RHYNCHOPIDAE (Scheren-
schnäbel)Die Gattung *RHYNCHOPS* Linnaeus

	JIAO	JIĀOZUÍHĀIQUÈ SHŪ 角嘴海雀属 1:159	Die Gattung CERORHINCA Bonaparte
JIĀOBĀILÍNG 角百灵 2:11		OHRENLERCHE <i>Eremophila alpestris</i> (Linnaeus)	
JIĀOBĀILÍNG SHŪ 角百灵属 2:11		Die Gattung EREMOPHILA Boie	
JIĀOLIÁO 鸫鶲 2:112; 3:142		ZAUNKÖNIG <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus)	Volksstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → STEINADLER, Aquila chrysaetos (Linnaeus). → JĪN DIĀO 金鵰
JIĀOLIÁO KĒ 鸫鶲科 2:112; 3:142		Die Familie TROGLODYTIDAE (Zaunkönige)	
JIĀOLIÁO SHŪ 鸫鶲属 2:112		Die Gattung TROGLODYTES Vieillot	JIN
JIĀOMÉI SHŪ 鸫鶲属 2:178		Die Gattung PNOEPYGA Hodgson	JĪNBÈI-SĀNZHÌ-ZHUÓMÙNIĀO 金背三趾啄木鸟 1:228
JIĀO PÌTÍ 角䴙䴘 (1:3)		OHRENTAUCHER <i>Podiceps auritus</i> (Linnaeus)	JĪNBÈI-SĀNZHÌ-ZHUÓMÙ SHŪ 金背三趾啄木属 1:228
JIĀOXIĀO SHŪ 角鸮属 1:184		Die Gattung OTUS Pennant	JĪNBÈIZHUÓMÙNIĀO 金背啄木鸟 1:240
JIĀOYÈYÍNG 角夜鹰 1:201		LUCHSNACHTSCHWALBE <i>Eurostopodus macrotis</i> (Vigors)	JĪNBÈIZHUÓMÙ SHŪ 金背啄木属 1:240
JIĀOYÈYÍNG SHŪ 角夜鹰属 1:201		Die Gattung EUROSTOPODUS Gould	JĪNCHÌ 金翅 (2:390; 3:224)
JIĀOYÍNG SHŪ 鸫莺属 2:301		Die Gattung PRINIA Horsfield	JĪNCHÌQUÈ 金翅雀 (2:390; 3:224)
JIĀOZHÌ SHŪ 角雉属 1:93		Die Gattung TRAGOPAN Cuvier	Anderer Name für den → CHINESENGRÜNLING, <i>Chloris sinica</i> (Linnaeus). Synonym → JĪNCHÌQUÈ 金翅雀 → JĪNCHÌ 金翅
JIĀOZUÍ SHŪ 交嘴属 2:415		Die Gattung LOXIA Linnaeus	Die Gattungen CHLORIS Cuvier, CARDUELIS Brisson, SPINUS Koch, ACANTHIS Borkhausen und LINARIA Bechstein
JIĀOZUÍHĀIQUÈ 角嘴海雀 1:159		NASHORNALK <i>Cerorhinca monocerata</i> (Pallas)	JĪNCHÌ SHŪ 金翅属 (2:390)

JĪN DIĀO 金雕

1:53; 3:49

JĪN QUÈMÉI 金额雀鵟

2:238

JĪN SīQUÈ 金额丝雀

2:389

JĪN YÈBĒI 金额叶鹎

2:62

JĪNGUĀN DÌYÍNG 金冠地莺

2:251

JĪN HÉNG 金衡

(1:125; 3:68)

JĪNHÓU NǐZHUÓMÙ 金喉拟啄木

1:220

JĪN HUÁNLÍ 金黄鹂

2:73

JĪN JĪ 金鸡

1:108; 3:60

JĪN JĪ 锦鸡

1:108

JĪN JĪ SHǔ 锦鸡属

1:107

JĪN JIŪ 金鸠

1:172

JĪN JIŪ SHǔ 金鸠属

1:172

JĪN JUĀN SHǔ 金鹃属

(1:181)

STEINADLER

Aquila chrysaetos (Linnaeus)

BUNTKOPFALCIPPE

Alcippe variegaticeps Yen

ROTSTIRNGIRLITZ

Serinus pusillus (Pallas)

GOLDSTIRN-BLATTVOGEL

Chloropsis aurifrons (Temminck)

GOLDSCHEITELTESIA

Tesia olivea (Horsfield)WANDERREGENPFEIFER (KLEINER GOLD-
REGENPFEIFER)*Pluvialis dominica* (P.L.S. Müller)

GOLDKEHL-BARTVOGEL

Megalaima franklinii (Blyth)

PIROL

Oriolus oriolus (Linnaeus)

GOLDFASAN

Chrysolophus pictus (Linnaeus).

Synonym → HÓNGFÙ JĪN JĪ 红腹锦鸡

Anderer Name für den → GOLDFASAN,

Chrysolophus pictus (Linnaeus).

Synonym → HÓNGFÙ JĪN JĪ 红腹锦鸡

→ JĪN JĪ 金鸡

Die Gattung *CHRYSOLOPHUS* J.E. Gray

GLANZKÄFERTAUBE

Chalcophaps indica (Linnaeus)Die Gattung *CHALCOPHAPS* GouldDie Gattung *CHYSOCOCCYX* Boie

JĪNKUÀNG HÉNG 金眶鹤

1:126; 3:69

JĪNKUÀNG WĒNGYÍNG 金眶鹟莺

2:292; 3:197

JĪNSÈ LÍN QÚ 金色林鸲

(2:130, 3:148)

JĪNSÌYÀN SHǔ 金丝燕属

1:203

JĪNTÓU FÉNGYÉYÍNG 金头缝叶莺

2:297

JĪNTÓU HĒIQUÈ 金头黑雀

2:419

JĪNTÓU SUÌMÉI 金头穗鹛

2:181

JĪNXIÒNG GĒQÚ 金胸歌鸲

(2:129; 3:147)

JĪNXIÒNG QUÈMÉI 金胸雀鵟

2:237; 3:181

JĪNYĀN MÉIQUÈ 金眼鹛雀

2:185

JĪNYÀO YÀN 金腰燕

(2:22; 3:110)

FLUSSREGENPFEIFER

Charadrius dubius Scopoli. Synonym → HĒILÍNG HÉNG 黑领鹤

BRILLENLAUBSÄNGER

Seicercus burkii (Burton)

GOLDSCHWANZ

Tarsiger chrysaeus HodgsonDie Gattung *COLLOCALIA* G.R. Gray

BERGSCHNEIDERVOGEL

Orthotomus cucullatus Temminck

MOHRENGIMPEL

Pyrrhoptes epaulette (Hodgson)

GOLDKOPF-BAUMTIMALIE

Stachyris chrysaea Blyth

DAVIDNACHTIGALL

Larvivora pectardens (David et Oustalet)

GOLD-ALCIPPE

Alcippe chrysotis (Blyth)

GOLDAUGENTIMALIE

Chrysomma sinense (Gmelin)

RÖTELSCHWALBE

Cecropis daurica (Linnaeus)

JIU

Die Familie *COLUMBIDAE* (Tauben)

BURGUNDERGIMPEL

Carpodacus vinaceus Verreaux

JÙCHÌMÀIJĪ 距翅麦鸡

1:125

JÙCHÌMÀIJĪ SHŪ 距翅麦鸡属

1:124

JÙDŪ SHŪ 巨鸥属

1:153

JÙ SHĪ 巨鵠

2:351

JÙZUĪ DUĀNCHÌYÍNG 巨嘴短翅莺

2:260

JÙZUĪ LIÜYÍNG 巨嘴柳莺

2:278

JÙZUĪ SHĀQUÈ 巨嘴沙雀

(2:399)

JU

BACHKIEBITZ

Hoplopterus duvaucelii (Lesson)Die Gattung *HOPLOPTERUS* BonaparteDie Gattung *HYDROPROGNE* Kaup

RIESENKLEIBER

Sitta magna Ramsay

KASCHMIRBUSCHSÄNGER

Bradypterus major (Brooks)

BARTLAUBSÄNGER

Phylloscopus schwarzi (Radde)

WEISSFLÜGELGIMPEL (SCHWARZZÜGELGIMPEL)

Rhodospiza obsoleta (Lichtenstein)

JUAN-JUE

JUĀNJIŪ 鹊鳩

1:167

JUĀNJIŪ SHŪ 鹊鳩属

1:167

JUĀNJUÉ 鹊鳲属

2:41

JUĀNSŪN 鹊隼

1:42

JUĀNSŪN SHŪ 鹊隼属

1:41

JUĀNWĒI KĒ 卷尾科

2:75; 3:128

JUĀNWĒI SHŪ 卷尾属

2:75

JUĀN-XÍNG MÙ 鸶形目

1:175; 3:84

JUĀNYŪ TÍHÚ 卷羽鹈鹕

(1:9)

JUĒMÉI SHŪ 鸬鹚属

2:223

Die Familie DICRURIDAE (Drongos)

Die Gattung *DICRURUS* Vieillot

Die Ordnung CUCULIFORMES (Kuckucks-vögel)

KRAUSKOPFPELIKAN
Pelecanus crispus Bruch

Die Gattung PTERUTHIUS Swainson

JUN

BINDENFREGATVOGEL
Fregata minor (Gmelin)

Die Familie FREGATIDAE (Fregatt-vögel)

Die Gattung FREGATA Lacépède

KE

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → KUCKUCK, *Cuculus canorus* Linnaeus. → DŪJUĀN 杜鹃Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für die → ELSTER, *Pica pica* (Linnaeus). → XÍQUÈ 喜鹊KOSLOW-BABAX
Babax koslowi (Bianchi)

KÈGŪ 喳咕

3:85

KÈQUÈ 客鹊

3:136

KĒSHÌ CĀOMÉI 柯氏草鹛

2:200

BINDENSCHWANZTAUBE

Macropygia unchall (Wagler)Die Gattung *MACROPYGINA* SwainsonDie Gattung *CORACINA* Vieillot

HINDUWEIH

Aviceda jerdoni (Blyth)Die Gattung *AVICEDA* Swainson

	KONG	KUÁNG SHŪ 鵟屬 1:49	Die Gattung BUTEO Lacépède
KÖNGQUÈ SHŪ 孔雀屬 1:109		KUÁNGYÍNG SHŪ 鶻鷹屬 1:51	Die Gattung BUTASTUR Hodgson
KÖNGQUÈZHÌ 孔雀雉 1:108	GRAUER PFAUFASAN Polyplectron bicalcaratum (Linnaeus)		KUO
KÖNGQUÈZHÌ SHŪ 孔雀雉屬 1:108	Die Gattung POLYPLECTRON Temminck	KUÒZUINIĀO KĒ 阔嘴鳥科 2:1	Die Familie EURYLAIMIDAE (Breit-rachen)
	KU	KUÒZUINIĀO SHŪ 阔嘴鳥屬 2:2	Die Gattung PSARISOMUS Swainson
KÜENIĀO 告惡鳥 1:117; (3:64)	WEISSBRUST-KIELRALLE Amaurornis phoenicurus (Pennant). Synonym → BÁIXIÖNG KÜENIĀO 白胸告惡鳥	KUÒZUÍ WĒNG 阔嘴鶲 2:323; 3:204	Muscicapa davurica Pallas, heute als Rasse des → BRAUNSCHNÄPPER, Muscicapa latirostris Raffles, angesehen. → BÉI HUÍ WĒNG 北灰鶲, → HUÍ WĒNG 灰鶲
KÜENIĀO SHŪ 告惡鳥屬 1:117	Die Gattung AMAURORNIS Reichenbach	KUÒZUÍYÙ 阔嘴鶲 1:143	SUMPFLÄUFER Limicola falcinellus (Pontoppidan)
	KUAN	KUÒZUÍYÙ SHŪ 阔嘴鶲屬 1:143	Die Gattung LIMICOLA Koch
KUĀNWÉI SHÙYÍNG 宽尾树莺 2:258	SEIDENSÄNGER Cettia cetti (Temminck)		LA
KUĀNZUÍDÖNG SHŪ 宽尾鵙屬 2:145	Die Gattung COCHOA Hodgson	LÀZUÍ SHŪ 蜡嘴鵙屬 2:423	Die Gattung EOPHONA Gould
	KUANG		LAN
KUÁNG 鵟 1:50	MÄUSEBUSSARD Buteo buteo (Linnaeus)	LÁNBÈI BĀSÈDÖNG 蓝背八色鵙 2:3	BLAURÜCKENPITTA Pitta soror Ramsay
		LÁNCÌ BĀSÈDÖNG 蓝翅八色鵙 2:3	NEUNFARBENPITTA Pitta brachyura (Linnaeus)

LÁNCHÌ XĪMÉI 蓝翅希鹛
2:231

LÁNCHÌ YÈBĒI 蓝翅叶鹀
2:62

LÁN DÀCHÌQÚ 蓝大翅鹀
2:142

LÁNDIĀNKĒ 蓝点鹀
(2:126)

LÁN DUĀNHÌDÖNG 蓝短翅鹀
(2:122); 3:145

LÁNÉ HÓNGWÉIQÚ 蓝额红尾鹀
2:136; 3:151

LÁN FĚICUÌ 蓝翡翠
1:213; 3:99

LÁNFÙ XIÁN 蓝腹鹇
1:99

LÁN GĒQÚ 蓝歌鹀
(2:124; 3:146)

LÁNHÓU NÍZHŪOMÙ 蓝喉拟啄木
1:221

LÁNHÓU TÀIYÁNGNIÀO 蓝喉太阳鸟
2:368; 3:219

LÁNHÓU WĒNG 蓝喉鹟
(2:319; 3:203)

LÁN JÍDÖNG 蓝矶鸫
2:154; 3:159

LÁN LÜQUÈ 蓝绿鹊
(2:91)

LÁN MĀJĪ 蓝马鸡
1:97

BLAUFLÜGELSIVA (BLAUFÜGEL-SONNEN-VOGEL)
Minla cyanoptera (Hodgson)

GELBKOPF-BLATTVOGEL
Chloropsis cochinchinensis (Gmelin)

GRANDALA
Grandala coelicolor Hodgson

BLAUKEHLCHEN
Cyanosylvia svecica (Linnaeus)

BERGKURZFLÜGEL
Brachypteryx montana Horsfield

ALPENROTSCHWANZ
Phoenicurus frontalis Vigors

KAPPENLIESST
Halcyon pileata (Boddaert)

SWINHOEFASAN
Lophura swinhoii (Gould)

BLAUNACHTIGALL
Larvivora cyane (Pallas)

BLAUWANGEN-BARTVOGEL
Megalaima asiatica (Latham)

GOULDNEKTARVOGEL
Aethopyga gouldiae (Vigors)

BLAUKEHLSCHNÄPPER
Cyornis rubeculoides (Vigors)

BLAUMERLE
Monticola solitarius (Linnaeus)

JAGDELSTER
Cissa chinensis (Boddaert)

BLAUER OHRFASAN
Crossoptilon auritum (Pallas)

LÁNTÓU HÓNGWÉIQÚ 蓝头红尾鹀
2:134

LÁNWÉIBÀ GĒNZÌ 蓝尾巴根子
3:148

LÁN WŪ 蓝鹀
(2:447; 3:238)

LÁNXIÖNG CHÚN 蓝胸鹀
1:87

LÁNXIÖNG FÓFÄSÈNG 蓝胸佛法僧
1:216

LÁNXIÖNG YĀNGJÌ 蓝胸秧鸡
1:114

LÁNYÍBÀ GĒNZÌ 蓝尾巴根子
3:148

LÁN YÚGŌU 蓝魚狗
3:99

LÁNZHĒN BĀSÈDÖNG 蓝枕八色鸫
2:2

LÁNZHĒN HUĀMÌNIÀO 蓝枕花蜜鸟
(2:365)

LÁODÈNG 老等
3:31

BLAUKOPFRÖTEL
Phoenicurus coeruleocephalus Vi-gors

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → BLAUSCHWANZ, Tarsiger cyanurus (Pallas). → HÓNG-XIÉ LÁNWEI QU 红肠蓝尾鹀

BLAUAMMER
Latoucheornis siemsseni (Martens)

ZWERGWACHTEL
Coturnix chinensis (Linnaeus)

BLAURACKE
Coracias garrulus Linnaeus

GRAUBRÜSTRALLE
Rallus striatus Linnaeus

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → BLAUSCHWANZ, Tarsiger cyanurus (Pallas). → HÓNGXIÉ LÁNWEI QU 红肠蓝尾鹀

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → KAPPENLIESST, Halcyon pileata (Boddaert). → LÁN FĚI-CUÌ 蓝翡翠

BLAUNACKENPITTA
Pitta nipalensis (Hodgson)

BLAUNACKEN-NEKTARVOGEL
Hypogramma hypogrammicum (S. Müller)

LAO

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → FISCHREIHER (GRAUREIHER), *Ardea cinerea* Linnaeus. → CĀNG LÙ 苍鹭

LÀOGUĀ 老鵠
3:137; 3:139

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) 1. für die → DICKSCHNABEL-KRÄHE, *Corvus macrorhynchos* Wagler, 2. für die → SAATKRÄHE, *Corvus frugilegus* Linnaeus. → HÓNGZUÍ SHĀNLÀOGUĀ 红嘴山老鵠, → SHUǐ LÀOGUĀ 水老鵠, → XIÁO SHĀNLÀOGUĀ 小山老鵠

LÀOYÍNG 老鷹
3:45; 3:48

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) 1. für den → SCHWARZMILAN, *Milvus migrans* (Boddaert), → YUĀN, 鸢 2. für den → MONGOLENBUSSARD, *Buteo hemilasius* Temminck et Schlegel, → DÀ KUÁNG 大鷹. - Auch häufig ganz allgemein für einen größeren Greifvogel unbestimmter Art verwendet.

LEI

LÉINIÀO 雷鸟
1:74

MOORSCHNEEHUHN
Lagopus lagopus (Linnaeus)

LÉINIÀO SHǔ 雷鸟属
1:74

Die Gattung *LAGOPUS* Brisson

LI

LÌBÀNFù Wū 栗斑腹鹀
2:439

JANKOWSKIAMMER
Emberiza jankowskii Taczanovski

LÌBÈI BÓLÁO 栗背伯劳
2:67

BURMAWÜRGER
Lanius colluriooides Lesson

LÌBÈI DUĀNCHÌDÖNG 栗背短翅鹀
2:121

BRAUNRÜCKEN-KURZFLÜGEL
Brachypteryx stellata Gould

LÌBÈI DUĀNJIĀOBĒI 栗背短翅鹀
(2:51)

LÌBÈI LÍN QÚ 栗背林鹀
2:130

LÌBÈI QÍMÉI 栗背奇鹀
2:247

LÌE BĀNCHÌMÉI 栗额斑翅属
2:227

LÌE JUÉMÉI 栗额购鹀
2:225

LÌER DUĀNJIĀOBĒI 栗耳短脚鹀
(2:49)

LÌFÙ GĒQÚ 栗腹歌鹀
(2:125; 3:146)

LÌFÙ SHī 栗腹鹀
2:354

LÌFÙ WÉNNIÀO 栗腹文鸟
2:387

LÌHÓU FĒNGHŪ 栗喉蜂虎
1:215

LÌHÓU JUÉMÉI 栗喉购鹀
2:225

LÌSÈ HUÁNGLÍ 栗色黄鹂
2:74

LÌSÈ QÍMÉI 丽色奇鹛
2:249

LÌSÈ ZÀOMÉI 丽色噪鹛
2:217

LÌTÓU BĀNCHÌMÉI 栗头斑翅鹛
2:229

GOLDFLÜGEL-FLUCHTVOGEL
Hypsipetes flavala (Blyth)

FORMOSABLAUSCHWANZ
Tarsiger johnstoniae (Ogilvie-Grant)
ROTRÜCKENTIMALIE
Heterophasia annectans (Blyth)

BRILLENSIBIA
Actinodura egertoni Gould

ROTSTIRN-WÜRGERTIMALIE
Pteruthius aenobarbus (Temminck)
ORPHEUSFLUCHTVOGEL
Hypsipetes amaurotis (Temminck)

ORANGENACHTIGALL
Larvivora brunnea Hodgson

ZIMTKLEIBER
Sitta castanea Lesson

SCHWARZBAUCHNONNE
Lonchura malacca (Linnaeus)

BLAUSCHWANZSPINT
Merops philippinus Linnaeus
ZIMTKEHL-WÜRGERTIMALIE
Pteruthius melanotis Hodgson

BLUTPIROL
Oriolus traillii (Vigors)
BLAUOKPTIMALIE
Heterophasia pulchella (Godwin-Austen)

PRACHTHÄHERLING
Garrulax formosus (Verreaux)
FORMOSASIBIA
Actinodura morrisoniana Ogilvie-Grant

LÍTÓU BĀSÈDÔNG 栗头八色鸫
2:4

LÍTÓU DÌYÍNG 栗头地莺
(2:251)

LÍTÓU FĒNHŪ 栗头蜂虎
1:215

LÍTÓU FÈNGMÉI 栗头凤鹛
2:236

LÍTÓU HŪBĀNYÁN 栗头虎斑鳽
1:18

LÍTÓU QUÈMÉI 栗头雀鹛
2:238

LÍTÓU WĒNGYÍNG 栗头鹟莺
2:291; 3:196

LÍTÓU XÍMÉI 栗头希鹛
(2:231)

LÍ WĒIYÁN 栗苇鳽
1:20; 3:36

LÍ WŪ 栗鹀
2:431; 3:231

LÍXÍNG LIAÓMÉI 鹊星鹟鹛
2:176

LÍXIÖNG JÍDÔNG 栗胸矶鸫
2:153

LÍXIÖNG TIÁNJÍ 栗胸田鸡
1:116

LÍYÙ 蚁鵙
1:123

LÍYÙ KĒ 蚁鵙科
1:123

BRAUNKOPFPITTA
Pitta oatesi (Hume)

ROTKOPFTESIA
Oligura castaneocoronata (Burton)

HINDUSPINT
Merops viridis Linnaeus

BRAUNKOPFYUHINA
Yuhina brunneiceps Ogilvie-Grant

ROTSCHEITELREIHER
Gorsachius goisagi (Temminck)

KASTANIENALCIPPE
Alcippe castaneiceps (Hodgson)

ROTKOPF-LAUBSÄNGER
Seicercus castaniceps (Blyth)

ROTOHRTIMALIE
Yuhina castaniceps (Moore)

ZIMTDOMMEL
Ixobrychus cinnamomeus (Gmelin)

RÖTELAMMER
Emberiza rutila Pallas

FLECKENBRUST-ZAUNKÖNIGTIMALIE
Spelaeornis formosus (Walden)

RÖTELMERLE
Monticola rufigularis (Jardine et Selby)

MANDARINSUMPFHUHN
Porzana paykullii (Ljungh)

AUSTERNFISCHER
Haematopus ostralegus Linnaeus

Die Familie HAEMATOPODIDAE (Austernfischer)

LÍYÙ SHŪ 蚁鵙属
1:123

LÍYUĀN 栗鹀
1:44

LÍYUĀN SHŪ 栗鹀属
1:44

LÍZHUÓMÙNIÀO 栗啄木鸟
1:223

LÍZHUÓMÙ SHŪ 栗啄木鸟属
1:223

Die Gattung HAEMATOPUS Linnaeus
1:4

BRAHMINENWEIH
Haliastur indus (Boddaert)

Die Gattung HALIASTUR Selby

ROSTSPECHT
Micropternus brachyurus (Vieillot)

Die Gattung MICROPTERNUS Blyth

LIAN

SICHELHUHN
Falcipennis falcipennis (Hartlaub)

Die Gattung FALCIPENNIS Elliot

LIANG

Die Familie STURNIDAE (Stare)

Die Gattungen PASTOR Temminck, STURNUS Linnaeus, STURNOPASTOR Blyth, STURNIA Lesson, TEMENUCHUS Cabanis, GRACUPICA Lesson

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → PARADIESCHNÄPPER, Terpsiphone paradisi (Linnaeus). → SHÒUDÀI 寿带, → SHÒUDÀI-NIĀO 寿带鸟

LIÁNGNIÀO KĒ 棕鸟科
2:80; 3:130

LIÁNGNIÀO SHŪ 棕鸟属
(2:80)

LIÁNGSHĀNBÓ 梁山伯
3:206

	LIAO-LIE	LÍNJÍLÍNG 林鶲鵙 2:33	Anderer Name für die → BAUMSTELZE (WALDSTELZE), <i>Motacilla indica</i> Gmelin. → SHĀNJÍLÍNG 山鶲鵙
LIÁOGĒ 鸟哥 2:87	BEO <i>Gracula religiosa</i> Linnaeus	LÍNJUÉ 林鷦 2:40	BRAUNSCHWANZ-TEPHRODORNIS <i>Tephrodornis gularis</i> (Raffles)
LIÁOGĒ SHǔ 鸟哥属 2:87	Die Gattung GRACULA Linnaeus	LÍNJUÉ SHǔ 林鷦属 2:40	Die Gattung TEPHRODORNIS Swainson
LIÁOMÉI SHǔ 鹩鶲属 2:176	Die Gattung SPELAEORNIS David et Oustalet	LÍN LIÙ 林鹨 2:27	BAUMPIEPEL <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus)
LIÈ SǔN 猎隼 1:66; 3:51	SAKERFALKE (WÜRGFALKE) <i>Falco cherrug</i> J.E. Gray	LÍNQUÈ SHǔ 林雀属 2:345	Die Gattung SYLVIPARUS Burton
LIÈ-XÍNG Mù 猎形目 1:219; 3:100	Die Ordnung PICIFORMES (Spechtvögel)	LÍN SĀNZHÍCHÚN 林三趾鹑 1:109	SPITZSCHWANZ-LAUFHÜHNCHEN <i>Turnix sylvatica</i> (Desfontaines)
LÍN LIN		LÍN SHĀZHUI 林沙锥 1:138	NEPALBEKASSINE <i>Gallinago nemoricola</i> Hodgson
LÍN BĀGĒ 林八哥 (2:86)	DSCHUNGELMAINA <i>Acriotheres grandis</i> Moore	LÍNTÓU SHÙYÍNG 鳞头树莺 (2:252)	KURZSCHWANZ-BUSCHSÄNGER <i>Urosphena squameiceps</i> (Swinhoe)
LÍNBĀN ZÀOMÉI 鳞斑噪鹛 2:214	BLAUFLÜGELHÄHERLING <i>Garrulax squamatus</i> (Gould)	LÍNWĒNG SHǔ 林鶯属 2:306	Die Gattung RHINOMYIAS Sharpe
LÍNDIÀO 林鶲 1:56	MALAIENADLER <i>Ictinaetus malayensis</i> (Temminck)	LÍNXIĀO SHǔ 林鸮属 1:196	Die Gattung STRIX Linnaeus
LÍNDIÀO SHǔ 林鶲属 1:56	Die Gattung ICTINAETUS Blyth	LÍNXIÉ QIŪSHĀYĀ 鳞胁秋沙鸭 1:40	SCHUPPENSÄGER <i>Mergus squamatus</i> Gould
LÍN DÌQUÈ 林地雀 2:396; 3:225	WALDSCHNEEGIMPEL <i>Leucosticte nemoricola</i> (Hodgson)	LÍN YÈYÍNG 林夜莺 1:203	SAVANNENNACHTSCHWALBE <i>Caprimulgus affinis</i> Horsfield
LÍNFù LÙZHUÓMÙNIǎO 鳞腹绿啄木鸟 (1:224)	SCHUPPENBAUCHSPECHT <i>Picus myrmecophoneus</i> Stresemann	LÍN YÙ 林鹬 1:135; 3:71	BRUCHWASSERLÄUFER <i>Tringa glareola</i> Linnaeus
LÍN Gē 林鸽 1:166	RINGELTAUBE <i>Columba palumbus</i> Linnaeus	LÍNG JIÀOXIÀO 领角鸮 1:186; 3:89	LING HALSBANDEULE <i>Otus bakkamoena</i> Pennant

LÍNG XIŪLIÚ 领鸺鹠

1:191; 3:92

LÍNG YÁNLIÙ 领岩鹨

2:114; 3:143

LIŪCHUÀN'R 柳串儿

3:190-195

LIÚHUÁNG WŪ 硫黄鹀

2:435

LIŪ SHŪ 鹊属

2:26

LIÚSŪYŪ 流苏鹀

1:143

LIÚSŪYŪ SHŪ 流苏鹀属

1:143

LIŪYĀ 瘤鸭

1:37

LIŪYĀ SHŪ 瘤鸭属

1:37

LIŪYĪNG SHŪ 柳莺属

2:274

LÓUYĀN 楼燕

3:97

WACHTELKAUZ

Glaucidium brodiei (Burton)

ALPENBRAUNELLE

Prunella collaris (Scopoli)

LIU-LOU

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für die meisten PHYLLOSCOPUS (LAUBSÄNGER)-Arten, → DAVID-, DORN-, DUNKEL-, GELBBRAUEN-, GOLD-BINDEN-, GOLDHÄHNCHEN-, GRÜN-, HIMALAYA-, KRONEN-, STREIFENKOPF- und WANDERLAUBSÄNGER (NORDISCHER LAUBSÄNGER)

SCHWEFELAMMERM

Emberiza sulphurata Temminck et Schlegel

Die Gattung ANTHUS Bechstein

KAMPFLÄUFER

Philomachus pugnax (Linnaeus)

Die Gattung PHILOMACHUS Merrem

GLANZENTE (GLANZGANS)

Sarkidiornis melanotos (Pennant)

Die Gattung SARKIDIORNIS Eyton

Die Gattung PHYLLOSCOPUS Boie

Anderer Name für den → MAUERSEGLER, *Apus apus* (Linnaeus). Synonym → YŪYĀN 雨燕

LU

KORMORAN

Phalacrocorax carbo (Linnaeus).

Synonym → PŪTŌNG LÚCÍ 普通鸬鹚

Die Familie PHALACROCORACIDAE (Kormorane)

Die Gattung PHALACROCORAX Brisson

Die Familie ARDEIDAE (Reiher)

Die Gattung ARDEA Linnaeus

TEICHROHRSÄNGER

Acrocephalus scirpaceus (Hermann)

ROHRAMMER

Emberiza schoeniclus Linnaeus

DICKSCHNABELSÄNGER

Phragmaticola aedon (Pallas)

Die Gattung PHRAGAMATICOLA Jerdon

LUO

SICHELENTE

Anas falcata Georgi

LÜ

HIMALAYA-SALANGANE

Collocalia brevirostris (Horsfield)

LÚCÍ 鸬鹚

1:10

LÚCÍ KĒ 鸬鹚科

1:9; 3:30

LÚCÍ SHŪ 鸬鹚属

1:9

LÙ KĒ 鸳科

1:12; 3:30

LÙ SHŪ 鸳属

1:12

LÚ WĒIYÍNG 芦苇莺

2:267

LÚ WŪ 芦鹀

2:445; 3:238

LÚYÍNG 芦莺

2:270

LÚYÍNG SHŪ 芦莺属

2:269

LUÓWÉN YĀ 罗纹鸭

1:32; 3:41

LÜBÈI JĪNSĪYĀN 绿背金丝燕

(1:203/204)

LÜBÈI SHĀNQUÈ 绿背山雀

2:333; 3:209

LÜCHÌ DUĀNJIĀOBĒI 绿翅短脚鶲

(2:50)

LÜCHÌ YĀ 绿翅鶲

1:31; 3:40

LÚFÈNQIÚ'R 马粪球儿

3:171

LÜHÓU FĒNGHŪ 绿喉蜂虎

1:215

LÜHÓU QIÁNNIĀO 绿喉潜鸟

1:1

LÜHÓU TÀIYÁNGNIĀO 绿喉太阳鸟

2:368

LÜJÍŪ 绿鳆

1:162; 3:78

LÜJÍŪ SHǔ 绿鳆属

1:161

LÜ KǒngQUÈ 绿孔雀

1:109

LÜ KUĀNZUǐDÖNG 绿宽嘴鶲

2:146

LÜLÙ 绿鹭

1:13; 3:32

LÜLÙ SHǔ 绿鹭属

1:13

BERGKOHLMEISE

Parus monticolus Vigors

GRÜNFLÜGEL-FLUCHTVOGEL

Hypsipetes maclellandii Horsfield

KRICKENTE

Anas crecca LinnaeusVolkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → BRAUNKOPF-PAPAGEISCHNABEL (die BRAUNKOPF-PAPAGEIMEISE), *Paradoxornis webbianus* (Gould). → ZÖNGTÓU YĀQUÈ 棕头鶲雀

SMARAGDSPINT

Merops orientalis Latham

PRACHTTAUCHER

Gavia arctica (Linnaeus)

GRÜNSCHWANZ-NEKTARVOGEL

Aethopyga nipalensis (Hodgson)

SIEBOLDTAUBE

Treron sieboldii (Temminck). Synonym → HÓNGCHÌ LÜJÍŪ 红翅绿鳆

SPHENURUS Swainson, von manchen Autoren als Gattung betrachtete Untergruppe der Gattung TRERON Vieillot

ÄHRENTRÄGERFAU

Pavo muticus Linnaeus

GRÜNSCHNÄPPERDROSSEL

Coccyzus viridis Hodgson

MANGROVEREIHER

Butorides striatus (Linnaeus)

Die Gattung BUTORIDES Blyth

LÜMÉI SHǔ 绿鳽属

2:222

LÜ NÁNJIŪ 绿南鳽

1:163

LÜQUÈ SHǔ 绿鶲属

(2:91)

LÜTÓU WĒNGYÍNG 绿头翁莺

2:293

LÜTÓU YĀ 绿头鶲

1:32; 3:41

LÜWÉI HÓNGZHÌ 绿尾虹雉

1:95

LÜXIÖNG BÄSÈDÖNG 绿胸八色鸫

2:4

LÜ YÍNGZUİBĒI 绿alcone嘴鶲

2:60; 3:122

LÜZHĀ 绿鷮

3:71

LÜZHUÓMÙNIĀO 绿啄木鸟

1:225; 3:102

LÜZHUÓMÙ SHǔ 绿啄木鸟属

1:224

LÜZUÍ DÌJUĀN 绿嘴地鹃

(1:182)

Die Gattung MYZORNIS Blyth

BRONZEFRUCHTTAUBE

Ducula aenea (Linnaeus)

Die Gattungen CISSA Boie und URO-CISSA Cabanis

GRÜNKOPF-LAUBSÄNGER

Seicercus affinis (Horsfield et Moore)

STOCKENTE

Anas platyrhynchos Linnaeus

GRÜNSCHWANZ-GLANZFASAN

Lophophorus lhuysii Geoffroy St. Hilaire

KAPPENPITTA

Pitta sordida (P.L.S. Müller)

HALSBANDBÜLBÜL

Spizixos semitorques SwinhoeVolkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → WALDWASSERLÄUFER, *Tringa ochropus* Linnaeus. → BÁIYĀO CÁO YÙ 白腰草鶲

GRAUSPECHT

Picus canus Gmelin

Die Gattung PICUS Linnaeus

KOKIL

Rhopodytes tristis (Lesson)

MA

SCHMALSCHWANZ-OHRFASAN

Crotophylax crotaphytus (Hodgson)

MÁJĪ SHŪ 马鸡属

1:95

MÁQUÈ (1) 麻雀

2:375; 3:221

MÁQUÈ (2) 麻雀

Die Gattung CROSSOPTILON Hodgson
1:95

FELDSPERLING
Passer montanus (Linnaeus). Synonym → SHÙ MÁQUÈ 树麻雀

"SPERLING" oder "SPATZ", bezeichnet in China de facto im allgemeinen den → FELDSPERLING, Passer montanus (Linnaeus), da dieser dort die Rolle des → HAUSSPERLINGS, Passer domesticus (Linnaeus), übernommen hat und daher die verbreitetste und gewöhnlichste Sperlingsart in China ist. Unser HAUSSPERLING, Passer domesticus (Linnaeus), kommt nur im Nordöstlichen Teile der Inneren Mongolei und - in der Unterart parkini - in Tibet vor. Vgl. Verbreitungskarte in 2:374. - In der chinesischen Malerei findet sich dementsprechend nur der FELDSPERLING dargestellt, leicht erkenntlich an dem einheitlich rotbraun gefärbten Oberkopf und dem schwarzen Fleck auf der weißen Wange.

MÁQUÈ SHŪ 麻雀属

2:373

MÁ YĀQUÈ 麻鸭鵠

3:134

MÁYĀ SHŪ 麻鸭属

1:30

MÁYĀN SHŪ 麻鳽属

1:20

Die Gattung CROSSOPTILON Hodgson

FELDSPERLING

Passer montanus (Linnaeus). Synonym → SHÙ MÁQUÈ 树麻雀

"SPERLING" oder "SPATZ", bezeichnet in China de facto im allgemeinen den → FELDSPERLING, Passer montanus (Linnaeus), da dieser dort die Rolle des → HAUSSPERLINGS, Passer domesticus (Linnaeus), übernommen hat und daher die verbreitetste und gewöhnlichste Sperlingsart in China ist. Unser HAUSSPERLING, Passer domesticus (Linnaeus), kommt nur im Nordöstlichen Teile der Inneren Mongolei und - in der Unterart parkini - in Tibet vor. Vgl. Verbreitungskarte in 2:374. - In der chinesischen Malerei findet sich dementsprechend nur der FELDSPERLING dargestellt, leicht erkenntlich an dem einheitlich rotbraun gefärbten Oberkopf und dem schwarzen Fleck auf der weißen Wange.

Die Gattung PASSER Brisson

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für die → ROTSCHNABELKITTA, Urocissa erythrorhyncha (Boddaert). → HÓNGZUǐ LÁNQUÈ 红嘴蓝鹊

Die Gattungen CASARCA Bonaparte und TADORNA Oken

Die Gattung BOTaurus Stephens

MÁ YÀNZI 麻燕子

3:108

MÀZHÀ YÍNG 蚂鷺鷯

3:51

MÀIE 麦鹅

3:38

MÁOBĀN HUÁNGYÍNG 斑翅蝗莺

2:265

MÁOJIÀO KUÁNG 毛脚鶲

1:51; 3:49

MÁOJIÀOYÀN 毛脚燕

2:24; 3:111

MÁOJIÀOYÀN SHŪ 毛脚燕属

2:24

MÁOJIÀO YÚXIĀO 毛脚鱼鶲

1:190; 3:90

MÁOMÀOJĪ (1) 毛毛鸡

3:121

MÁOMÀOJĪ (2) 毛毛鸡

3:60

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für die → UFERSCHWALBE, Riparia riparia (Linnaeus). → HUÍ SHĀYÀN 灰沙燕

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → ROTFUSSFALKEN, Falco vespertinus Linnaeus. → HÓNGJIÀO SŪN 红脚隼

MAI-MAO

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für die → SAATGANS, Anser fabalis (Latham). → DÒU YÀN 犀雁

STRICHELSCHWIRL

Locustella lanceolata (Temminck)

RAUHFUSSBUSSARD

Buteo lagopus (Pontoppidan)

MEHLSCHWALBE

Delichon urbica (Linnaeus)

Die Gattung DELICHON Horsfield et Moore

HIMALAYA-FISCHUHU

Ketupa flavipes (Hodgson)

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → GELBSTEISSBÜLBÜL, Pycnonotus xanthorrhous Anderson. → HUÁNGTÚN BĒI 黄臀鵙

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → GOLDFASAN, Chrysocolaphus pictus (Linnaeus). → HÓNGFŪ JÍNJĪ 红腹锦鸡, → JÍNJĪ 金鸡, → JÍNJĪ 锦鸡

MÁO SŪN 猛隼

1:66

MÁOTUISHĀJÍ 毛腿沙鸡

1:160

MÁOTUISHĀJÍ SHÙ 毛腿沙鸡属

1:159

MÁOWÉN CǎOMÉI 斑纹草鹛

2:198; 3:172

GERFALKE

Falco rusticulus Linnaeus

STEPPENHUHN

Syrrhaptes paradoxus (Pallas)

Die Gattung SYRRHAPTES Illiger

STREIFENBABAX

Babax lanceolatus (Verreaux)

MEI-MENG

MÉIQUÈ SHÙ 鹊雀属

2:185

MÉI SHĀNQUÈ 煤山雀

2:337; 3:210

MÉI SHŪ 鹊属

2:184

MÉNG 鸟

(1:7-8)

MĚNGGŪ SHĀ HÉNG 蒙古沙鸻

1:128

MÉNG KĒ 鸮科

1:7

MÉNG SHŪ 鸮属

1:7

MĚNG SŪN 猛隼

1:69

MĚNGXIĀO 猛鸮

1:191

MĚNGXIĀO SHŪ 猛鸮属

1:191

Die Gattung CHRYSONOMA Blyth

TANNENMEISE

Parus ater Linnaeus

Die Gattung TIMALIA Horsfield

TROPIKVOGEL (Sammelbezeichnung)

MONGOLENREGENPFEIFER

Charadrius mongolus Pallas

Die Familie PHAETHONTIDAE (Tropikvögel)

Die Gattung PHAETHON Linnaeus

MALAIENBAUMFALKE

Falco severus Horsfield

SPERBEREULE

Surnia ulula (Linnaeus)

Die Gattung SURNIA Duméril

MIAN

MIANDIĀN ZHÚJÍ 缅甸竹鸡

1:89

MIÁNFÚ 棉凫

1:37

MIÁNFÚ SHÙ 棉凫属

1:37

MIĀN LIÜYÍNG 晃柳莺

2:286; 3:195

MIÁNQUÈ 晃雀

2:345

MIÁNQUÈ SHÙ 晃雀属

2:345

GRAUBRAUEN-BAMBUSHUHN

Bambusicola fytchii Anderson

WEISSBAUCH-ZWERGGANS

Nettapus coromandelianus (Gmelin)

Die Gattung NETTAPUS Brandt

KRÖNENLAUBSÄNGER

Phylloscopus coronatus (Temminck et Schlegel). → LIUCHUÀN'R 柳串儿

GOLDSCHOPFMEISE (SULTANSMEISE)

Melanochlora sultanea (Hodgson)

Die Gattung MELANOCHLORA Lesson

MO

WÜSTENSTEINSCHMÄTZER

Oenanthe deserti (Temminck)

MONGOLENGIMPEL

Bucanetes mongolicus (Swinhoe)

WÜSTENGRASMÜCKE

Sylvia nana (Hemprich et Ehrenberg)

NAN

NÁN DÀ WÉIYÍNG 南大苇莺

2:267

STENTORROHRSÄNGER

Acrocephalus stentoreus (Hemprich et Ehrenberg)

NÁNJIŪ SHŪ 南鳩屬
1:163

Die Gattung DUCULA Hodgson

NÍDÀ ZHŪQUÈ 拟大朱雀
2:402

NÍLÀZUĬ SHŪ 拟蜡嘴属
2:427

NÍWÙJÌÙ 拟兀鹫
(1:60)

NÍWÙJÌÙ SHŪ 拟兀鹫属
(1:60)

NÍZHŪÓMÙ SHŪ 拟啄木属
1:219

NI

ALPENGIMPEL

Carpodacus rubicilloides Przevalski

Die Gattung MYCEROBAS Cabanis

BENGALENGEIER

Gyps bengalensis (Gmelin)

PSEUDOGYPS Sharpe, eine Untergat-
tung der Gattung GYPS Savigny

Die Gattung MEGALAIMA G.R. Gray

NIU

KUHREIHER

Bubulcus ibis (Linnaeus)

Die Gattung BUBULCUS Bonaparte

NIÚBÈILÙ 牛背鹭
1:15; 3:34

NIÚBÈILÙ SHŪ 牛背鹭属
1:15

NIÚSHÍ BĀGĒ 牛屎八哥
(3:131)

NIÚSHÍDÀN 牛屎蛋
3:171

Volkstümliche Bezeichnung (in S-
Shensi) für den → SEIDENSTAR,
Sturnopastor sericeus (Gmelin).
→ SÍGUĀNG LIÁNGNIÃO 丝光椋鸟

Volkstümliche Bezeichnung (in S-
Shensi) für den → BRAUNKOPF-PAPA-
GEISCHNABEL (die BRAUNKOPF-PAPA-
GEIMEISE), *Paradoxornis webbianus*
(Gould). → ZÖNGTÓU YĀQUÈ 棕头鸦
雀

NI

NIÚTÓU BÓLÁO 牛头伯劳
2:68; 3:126

NI

BÜFFELWÜRGER

Lanius bucephalus Temminck et
Schlegel

OU

ŌU GĒ 欧鸽

1:166

ŌU KĒ 鸥科

1:146; 3:75

ŌU SHŪ 鸥属

1:146

ŌU-XÍNG MÙ 鸥形目

1:146; 3:75

ŌU YÈYÍNG 欧夜鹰

1:202

ŌUZUĬ YĀN'ŌU 鸥嘴燕鸥

1:153

HOHLTAUBE

Columba oenas Linnaeus

Die Familie LARIDAE (Möwen)

Die Gattung LARUS Linnaeus

Die Ordnung LARIFORMES (Möwenvögel)

ZIEGENMELKER

Caprimulgus europaeus Linnaeus

Anderer Name für die → LACHSEE-
SCHWALBE, *Gelochelidon nilotica*
(Gmelin). — Synonym → ZÀOŌU 采鸥

PA

PÁSHÙNIÃO 爬树鸟

3:216

PÁYÁNNIÃO 爬岩鸟

3:216

Volkstümliche Bezeichnung (in S-
Shensi) für den → MAUERLÄUFER,
Tichodroma muraria (Linnaeus).
→ HÓNGCHÌ XUÁNBÌQUÈ 红翅旋壁雀

Volkstümliche Bezeichnung (in S-
Shensi) für den → MAUERLÄUFER,
Tichodroma muraria (Linnaeus).
→ HÓNGCHÌ XUÁNBÌQUÈ 红翅旋壁雀

PAN

PĀNQUÈ 攀雀
2:358

PĀNQUÈ KĒ 攀雀科
2:358; 3:218

PĀNQUÈ SHŪ 攀雀属
2:358

PÁNWĒI SHÙQUÈ 盘尾树鹊
(2:99)

PÍLÙ SHŪ 翎鹭属
1:25

PÌTĪ 鹈鹕
(1:2)

PÌTĪ KĒ 鹈鹕科
3:29

PÌTĪ MÙ 鹈鹕目
(1:2); 3:29

PÌTĪ SHŪ 鹈鹕属
(1:2)

PÍZUǐ YĀ 比拟角鸮
1:34

BEUTELMEISE
Remiz pendulinus (Linnaeus)
Die Familie REMIZIDAE (Beutelmeisen)
Die Gattung REMIZ Jarocki

BUCHTSCHWANZELSTER
Temnurus temnurus (Temminck)

PI

Die Gattung PLATALEA Linnaeus

LAPPENTAUCHER oder STEISSLFUSS,
(Sammelbezeichnung); im engeren
Sinne häufig für den → ZWERGTAU-
CHER, Tachybaptus ruficollis (Pal-
las), verwendet. → XIÀO PÌTĪ 小鹈
鹕, → PÌTĪ MÙ 鹈鹕目, → PÌTĪ
KĒ 鹈鹕科

Die Familie PODICIPEDIDAE (Lappen-
taucher oder Steißfüße)

Die Ordnung PODICIPEDIFORMES (Lap-
penstaucher oder Steißfüße)

Die Gattungen TACHYBAPTUS Reichen-
bach und PODICEPS Latham

LÖFFELENTE
Anas clypeata Linnaeus

PÍNGYUÁN LIÙ 平原鹨
(2:26)

PÜTÖNG CUÌNIÀO 普通翠鸟
3:98

PÜTÖNG DÀYÀN 普通大雁
3:38

PÜTÖNG DIÀOXIÀO 普通雕鸮
3:89

PÜTÖNG LÚCÍ 普通鸬鹚
3:30

PÜTÖNG QIŪSHĀYĀ 普通秋沙鸭
3:44

PÜTÖNG SHÍ 普通鳾
2:352; 3:215

PÜTÖNG XUÁNMÙQUÈ 普通旋木雀
3:217

PÜTÖNG YĀNGJÍ 普通秧鸡
(1:113); 3:62

PING

BRACHPIEPER, Anthus campestris
(Linnaeus) und GODLEWSKIPIEPER,
Anthus godlewskii (Taczanowski)

PU

Andere Bezeichnung für den → EIS-
VOGEL, Alcedo atthis (Linnaeus).
Synonym → CUÌNIÀO 翠鸟

Volkstümliche Bezeichnung (in S-
Shensi) für die → SAATGANS, Anser
fabalis (Latham). → DÒU YÀN 豆雁

Andere Bezeichnung für den → UHU,
Bubo bubo (Linnaeus). Synonym
→ DIÀOXIÀO 雕鸮

Andere Bezeichnung für den → KOR-
MORAN, Phalacrocorax carbo (Linnae-
us). Synonym → LÚCÍ 鸬鹚

Andere Bezeichnung für den → GÄN-
SESÄGER, Mergus merganser Linnae-
us. → QIŪSHĀYĀ 秋沙鸭

KLEIBER
Sitta europaea Linnaeus

Andere Bezeichnung für den → WALD-
BAUMLÄUFER, Certhia familiaris
Linnaeus. → XUÁNMÙQUÈ 旋木雀

Anderer Name für die → WASSERRALLE,
Rallus aquaticus Linnaeus. Synonym
→ YĀNGJÍ 秧鸡

PÜTÖNG YÀN'ŌU 普通燕鸥
3:77

PÜTÖNG YÙ 普通鹬
3:71

PÜ WŪ 圈鹀
2:436

QIMÉI SHŪ 奇鹛属
2:247

QIÁNNIÃO KĒ 潜鸟科
1:1

QIÁNNIÃO MÙ 潜鸟目
1:1

QIÁNNIÃO SHŪ 潜鸟属
1:1

QIÁNYĀ SHŪ 潜鸭属
1:34

QIÁOBÍ MÁYĀ 翘鼻麻鸭
1:30

QIAOZUÍYÙ 翘嘴鹬
(1:136)

QIAOZUÍYÙ SHŪ 翘嘴鹬属
(1:136)

Andere Bezeichnung für die → FLUSS-SEESCHWALBE, *Sterna hirundo* Linnaeus. Synonym → YÀN'ŌU 燕鸥

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → FLUSSUFERLÄUFER, *Actitis hypoleucos* Linnaeus. → JĪ YÙ 犀鶲

ORTOLAN
Emberiza hortulana Linnaeus

QI

Die Gattung *HETEROPHASIA* Blyth

QIAN-QIAO-QIN

Die Familie *GAVIIDAE* (Seetaucher)

Die Ordnung *GAVIIFORMES* (Seetaucher)

Die Gattung *GAVIA* J.R. Forster

Die Gattung *AYTHYA* Boie

BRANDGANS
Tadorna tadorna (Linnaeus)

TEREKWASSERLÄUFER
Xenus cinereus (Güldenstädt)

Die Gattung *XENUS* Kaup

QÍNJÍ SHŪ 琴鸡属
1:73

QINGGUĀNQUÈ 青冠准
3:122

QINGHĀI FÈNGTÓUQUÈYÍNG 青海凤头
雀莺
2:297

QINGJIÀO YÙ 青脚鹬
1:134

QINGMÁLIÀO 青麻料
3:225

QINGTIÁOZI 青条子
3:51

QINGTÓU QIÁNYĀ 青头潜鸭
1:35

QINGYÍNG 青鹰
3:51

QINGZHUĀNG 青莊
3:31

QIŪSHĀYĀ 秋沙鸭
1:41; 3:44

Die Gattung *LYRURUS* Swainson

QING-QIU

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → HALSBANDBÜLBÜL, *Spizixos semitorques* Swinhoe. → LÜ YÍNGZUÍBĒI 绿鹏嘴鹀

SCHOPFHÄHNCHEN
Lophobasileus elegans (Przevalski)

GRÜNSCHENKEL
Tringa nebularia (Gunnerus)

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für das Weibchen des → KARMINGIMPEL, *Carpodacus erythrinus* (Pallas). → ZHŪQUÈ 朱雀, → HÓNG-MÁLIÀO 红麻料

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → BAUMFALKEN, *Falco subbuteo* Linnaeus. → YÀN SŪN 燕隼

BAERENTE
Aythya baeri (Radde)

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → ROTFUSSFALKEN, *Falco vespertinus* Linnaeus. → HÓNGJIÀO SŪN 红脚隼

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → FISCHREIHER (GRAU-REIHER), *Ardea cinerea* Linnaeus. → CĀNG LÜ 苍鹭

GÄNSESÄGER
Mergus merganser Linnaeus. Synonym → PÜTÖNG QIŪSHĀYĀ 普通秋沙鸭

QIŪSHĀYĀ SHŪ 秋沙鶲属
(1:39)

QIŪYÙ 竹鶲
1:139

QIŪYÙ SHŪ 竹鶲属
1:139

QÚ SHŪ 鸩属
2:130

QÚ WĒNG 鸩翁
2:308

QÚ YÁNLÌU 鸩岩鶲
2:116

QUÈBĒI SHŪ 崎鶲属
2:61

QUÈJUÈ SHŪ 鵠鶲属
2:43

QUÈ KĒ 崎科
2:388; 3:222

QUÈMÉI SHŪ 崎眉鶲属
2:237

QUÈQÚ 鵠鶲
2:133

QUÈQÚ SHŪ 鵠鶲属
2:133

Die Gattungen MERGELLUS Selby und
MERGUS Linnaeus

WALDSCHNEPFE
Scolopax rusticola Linnaeus

Die Gattung SCOLOPAX Linnaeus

QU

Die Gattung TARSIGER Hodgson

MUGIMAKISCHNÄPPER
Ficedula mugimaki (Temminck)

ROTKEHLBRAUNELLE
Prunella rubeculoides (Horsfield
et Moore)

QUE

Die Gattung AEGITHINA Vieillot

Die Gattung HEMIPUS Hodgson

Die Familien FRINGILLIDAE (Finken)
und EMBERIZIDAE (Ammern)

Die Gattung ALCIPPE Blyth

DAJAL
Copsychus saularis (Linnaeus)

Die Gattung COPSYCHUS Wagler

QUÈSÈ HUÁNGLÍ 鵠色黄鹂
2:75

QUÈSÈ QÍMÉI 鵠色奇鹛
2:249

QUÈ SHŪ 鵠属
2:95

QUÈ-XÍNG MÙ 崎形目
3:106

QUÈYÀ 鵠鸭
(1:39; 3:44)

QUÈYÀ SHŪ 鵠鸭属
(1:39)

QUÈ YÀO 鵠鹤
1:61

QUÈYÀO 崎鶲
3:47

QUÈ YÍNG 崎鹰
1:47; 3:47

QUÈYÍNG SHŪ 崎莺属
2:295

SEIDENPIROL
Oriolus mellianus Stresemann

TICKELLTIMALIE
Heterophasia melanoleuca (Blyth)

Die Gattung PICA Brisson

Die Ordnung PASSERIFORMES Singvögel
(Sperlingsvögel)

SCHELLENTE
Glaucionetta clangula (Linnaeus)

Die Gattung GLAUCIONETTA Stejneger
(von manchen Autoren mit der Gattung
BUCEPHALA Baird vereinigt)

ELSTERWEIHE
Circus melanoleucus (Pennant)

Volkstümliche Bezeichnung (in S-
Shensi) für den → TRILLERSPERBER,
Accipiter virgatus (Temminck).
→ SŌNG QUÈ YÍNG 松雀鹰

SPERBER
Accipiter nisus (Linnaeus)

Die Gattung LEPTOPOECILE Severtzov

RE-RI-RONG-ROU

RÈ-HÔNGHÔNG 热烘烘
3:100

Volkstümliche Bezeichnung (in S-
Shensi) für den → WIEDEHOPF, Upupa
epops Linnaeus. → DÀISHÈNG 戴胜

RÌBÈN GĒQÚ 日本歌鸲
(2:124)

ROSTKEHLNACHTIGALL
Larvivora akahige (Temminck)

RÓNGÉ SHĪ 绒额鶲

2:350

RÓNGYĀ 绒鸭

(1:37)

RÓNGYĀ SHŪ 绒鸭属

(1:37)

RÒUCHUÍMÀIJĪ 肉垂麦鸡

1:124

RÒUCHUÍMÀIJĪ SHŪ 肉垂麦鸡属

1:124

SĀNBĀONIĀO 三宝鸟

1:217

SĀNBĀONIĀO SHŪ 三宝鸟属

1:216

SĀNDÀOMÉI CĀO WŪ 三道眉草鹀

2:438; 3:235

SĀNZHÍCHŪN KĒ 三趾鹑科

1:109

SĀNZHÍCHŪN MÙ 三趾鹑目

1:109

SĀNZHÍCHŪN SHŪ 三趾鹑属

1:109

SĀNZHÍCUIΝIĀO 三趾翠鸟

1:212

SĀNZHÍCUIΝIĀO SHŪ 三趾翠鸟属

1:212

BRILLENKLEIBER

Sitta frontalis Swainson

SCHECKENTE

Polysticta stelleri (Pallas)

Die Gattungen SOMATERIA Leach (in China nicht vorkommend) und POLYSTICTA Eyton

ROTLAPPENKIEBITZ

Lobivanellus indicus (Boddaert)

Die Gattung LOBIVANELLUS G.R. Gray

SAN

DOLLARVOGEL

Eurystomus orientalis Linnaeus

Die Gattung EURYSTOMUS Vieillot

WIESENAMMER

Emberiza cicoides Brandt

Die Familie TURNICIDAE (Wachtelaufhühnchen)

Die Ordnung TURNICIFORMES (Laufhühnchen)

Die Gattung TURNIX Bonnaterre

DSCHUNGELFISCHER

Ceyx erithacus (Linnaeus)

Die Gattung CEYX Lacépède

SĀNZHÍŌU 三趾鶲

1:151

SĀNZHÍŌU SHŪ 三趾鶲属

1:151

SĀNZHÍ YĀQUÈ 三趾鹤雀

2:188; 3:169

SĀNZHÍYÙ 三趾鹤

(1:142)

SĀNZHÍYÙ SHŪ 三趾鹤属

1:142

DREIZEHENMÖWE

Larus tridactylus Linnaeus

RISSA Stephens, von manchen Autoren als Gattung angesehene Untergattung der Gattung LARUS Linnaeus

DREIZEHEN-PAPAGEISCHNABEL (DREIZEHEN-PAPAGEIMEISE)

Paradoxornis paradoxus (Verreaux)

SANDERLING

Calidris alba (Pallas)

CROCETHIA Billberg, eine von manchen Autoren als Gattung angesehene Untergattung der Gattung CALIDRIS Merrem

DREIZEHENSPECHT

Picoides tridactylus (Linnaeus)

Die Gattung PICOIDES Lacépède

SHA

SĀNZHÍZHUÓMÙNIĀO 三趾啄木鸟

1:239

SĀNZHÍZHUÓMÙ SHŪ 三趾啄木属

1:239

SHĀBĀILÍNG 沙百灵

(2:5)

SHĀBĀILÍNG SHŪ 沙百灵属

2:5

SHĀ HUÀMÉI 傻画眉

3:163

STUMMELLERCHE, *Calandrella rufescens* (Vieillot) und TSCHILILERCHE, *Calandrella cheleensis* (Swinhoe)

Die Gattung CALANDELLA Kaup

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für die → NAUMANNDROSSEL, *Turdus naumanni* Temminck. → BĀN Dōng 斑鸫

ISABELLSTEINSCHMÄTZER

Oenanthe isabellina (Temminck)

SHĀJĪ KĒ 沙鸡科

1:159

SHĀJĪ MÙ 沙鸡目

1:159

SHĀJĪ SHŪ 沙鸡属

(1:161)

SHĀQUÈ SHŪ 沙雀属

(2:399)

SHĀSÈ ZHŪQUÈ 沙色朱雀

2:405

SHĀYÀN 沙燕

3:108

SHĀYÀN SHŪ 沙燕属

2:18

SHĀZHŪI SHŪ 沙锥属

(1:137)

SHAN

SHĀN BĀNJIŪ 山斑鸠

1:168; 3:80

SHĀNCHŪN 山鹑

1:83

SHĀNCHŪN SHŪ 山鹑属

1:82

Die Familie PTEROCLIDAE (Flughühner)

Die Ordnung PTEROCLIFORMES (Flughühner)

Die Gattung EREMIALECTOR W.L. Slater. [Anmerkung: Die Gattung PTEROCLES Temminck, zu der das Sandflughuhn rechnet, ist auf das mediterrane Spießflughuhn, *Pterocles alchata* (Gmelin) zu beschränken. Vgl. H.E. Wolters, Bonner Zool. Beiträge, 25 (1974), S. 286-289]

Die Gattungen RHODOPECHYS Cabanis, BUCANETES Cabanis und RHODOSPIZA Sharpe

EINÖDGIMPEL

Carpodacus synoicus (Temminck)Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für die → UFERSCHWALBE, *Riparia riparia* (Linnaeus). → HUĪ SHĀYÀN 灰沙燕

Die Gattung RIPARIA Forster

Die Gattung GALLINAGO Brisson

MEENATAUBE

Streptopelia orientalis (Latham)

REBHUHN

Perdix perdix (Linnaeus)

Die Gattung PERDIX Brisson

SHĀN DÀIZĪ 山带子

3:235

SHĀNDōNGBĚI 山东北

3:161

SHĀNDōNG SHŪ 山鹑属

2:166

SHĀN HÉSHĀNG 山和尚

3:100

SHĀN JĪ (1) 山鸡

3:58

SHĀN JĪ (2) 山鸡

3:53

SHĀNJIĀONIĀO KĒ 山椒鸟科

2:40; 3:119

SHĀNJIĀONIĀO SHŪ 山椒鸟属

2:43

SHĀNJÍLÍNG 山鹛鶲

(2:33; 3:114)

SHĀNJÍLÍNG SHŪ 山鹛鶲属

(2:33)

SHĀN JIŪ SHŪ 山鸠属

1:162

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für die → WIESENAMMER, *Emberiza cioides* Brandt. → SĀNDÀOMÉI CÁO WŪ 三道眉草鹀Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für die → AMSEL, *Turdus merula* Linnaeus. → WŪ DōNG 乌鵲

Die Gattung ZOOTHERA Vigors

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → WIEDEHOPF, *Upupa epops* Linnaeus. → DÀISHèNG 戴胜Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → JAGDFASAN (Fasan), *Phasianus colchicus* Linnaeus. → HUÁNJǐNG ZHÌ 环颈雉Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für das → CHUKARHUHN, *Alectoris chukar* (J.E. Gray). → SHÍJĪ 石鸡

Die Familie CAMPEPHAGIDAE (Stachelbürlzer)

Die Gattung PERICROCOTUS Boie

BAUMSTELZE (WALDSTELZE)
Motacilla indica Gmelin. Synonym
→ LÍNJÍLÍNG 林鹛鶲

Die Untergattung DENDRONANTHUS Blyth der Gattung MOTACILLA Linnaeus

Die Gattung TRERON Vieillot, s. dazu die Bemerkungen zur Gattung → SPHENURUS Swainson

SHĀN LÁN WĒNG 山蓝翁
(2:320)

SHĀN LIŪ 山鶲
2:32

SHĀN MÁQUÈ 山麻雀
2:377; 3:222

SHĀNMÉI 山鹛
2:246; 3:184

SHĀNMÉI SHÙ 山鹛属
2:246

SHĀN NÍZHŪOMÙ 山拟啄木
1:220

SHĀNQUÈ KÈ 山雀科
(2:331; 3:207)

SHĀNQUÈ SHÙ 山雀属
2:331

SHĀN SHÙYĪNG 山树莺
(2:254; 3:186)

SHĀNWĒI SHĀZHŪI 扇尾沙锥
(1:139; 3:73)

SHĀNWĒIWĒNG SHÙ 扇尾鹟属
(2:329)

SHĀNWĒIYĪNG SHÙ 扇尾莺属
2:299

SHĀNYĀ SHÙ 山鶲属
(2:102)

SHĀN ZÀOMÉI 山噪鹛
2:206; 3:175

SHĀNZHÈGŪ 山鶲鵙
1:89

SHĀNZHÈGŪ SHÙ 山鶲鵙属
1:87

BERGBLAUSCHNÄPPER
Cyornis banyumas (Horsfield)

SCHMALSCHWANZPIEPER
Anthus sylvanus (Hodgson)

RÖTELSPERLING
Passer rutilans (Temminck)

PEKINGSÄNGER
Rhopophilus pekinensis (Swinhoe)

Die Gattung RHOPOPHILUS Giglioli et Salvadori

SCHWARZBRAUEN-BARTVOGEL
Megalaima oorti (S. Müller)

Die Familien PARIDAE (Meisen) und AEGITHALIDAE (Schwanzmeisen)

Die Gattung PARUS Linnaeus

BERGBUSCHSÄNGER
Cettia montana (Horsfield)

BEKASSINE
Gallinago gallinago (Linnaeus)

Die Gattungen RHIPIDURA Vigors et Horsfield und CHELIDORYNX Hodgson

Die Gattung CISTICOLA Kaup

Die Gattung PYRRHOCORAX Tunstall

DAVIDHÄHERLING
Garrulax davidi (Swinhoe)

CHINABUSCHWACHTEL
Arborophila gingica (Gmelin)

Die Gattung ARBOROPHILA Hodgson

SHÁOJĪ 勺鸡
1:100; 3:57

SHÁOJĪ SHÙ 勺鸡属
1:100

SHÁOYÙ SHÙ 勾嘴鹛属
1:131

SHÁOZUÍYÙ 勾嘴鹛
(1:143)

SHÁOZUÍYÙ SHÙ 勾嘴鹛属
1:142

SHAO

KOKLASFASAN
Pucrasia macrolopha (Lesson)

Die Gattung PUCRASIA G.R. Gray

Die Gattung NUMENIUS Brisson

LÖFFELSTRANDLÄUFER
Calidris pygmaea (Linnaeus)
EURYNORHYNCHUS Nilsson, eine von manchen Autoren als Gattung angesehene Untergattung der Gattung CALIDRIS Merrem

SHE

SCHLANGENWEIHE
Spilornis cheela (Latham)

Die Gattung SPILORNIS G.R. Gray

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → WENDEHALS, *Jynx torquilla* Linnaeus. → YÍLIÈ 蚁䴕

SHI

SHÍÈRHÓNG 十二红
2:64

Anderer Name für den → ROTBINDEN-SEIDENSCHWANZ, *Bombycilla japonica* (Siebold). → XIĀO TÀIPÍNGNIÀO 小太平鸟

SHÍERHUÁNG 十二黄
2:64

SHÍHÉNG 石鶴
(1:146)

SHÍHÉNG KĒ 石鶴科
1:146

SHÍHÉNG SHŪ 石鶴属
1:146

SHÍJĪ 石鸡
(1:80; 3:53)

SHÍJĪ SHŪ 石鸡属
1:80

SHÍJÍ SHŪ 石鷄属
2:146

SHĪ KĒ 鸱科
(2:350); 3:215

SHÍQUÈ 石雀
2:378

SHÍQUÈ SHŪ 石雀属
2:378

SHĪ SHŪ 鸱属
2:350

SHÍYÀN'R 石燕儿
3:153

Anderer Name für den → SEIDEN-SCHWANZ, *Bombycilla garrulus* (Linnaeus). → TÀIPÍNGNIĀO 太平鸟

KRABBENTRIEL
Burhinus recurvirostris (Cuvier)

Die Familie BURHINIDAE (Trielle)

ESACUS Lesson, eine von manchen Autoren als Gattung angesehene UnterGattung der Gattung BURHINUS Illiger

CHUKARHUHN
Alectoris chukar (J.E. Gray)

Die Gattung ALECTORIS Kaup

Die Gattung SAXICOLA Bechstein

Die Familien SITTIDAE (Spechtmeisen oder Kleiber) und TICHODROMIDAЕ (Mauerläufer)

STEINSPERLING
Petronia petronia (Linnaeus)

Die Gattung PETRONIA Kaup

Die Gattung SITTA Linnaeus

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → WASSERRÖTEL, *Rhyacornis fuliginosus* (Vigors). → HÓNGWĒI SHUǐQÚ 红尾水鸲

SHOU 寿

SHÒUDÀI 寿带
2:328

SHÒUDÀINIĀO 寿带鸟
2:328; 3:206

SHÒUDÀI SHŪ 寿带属
2:328

PARADIESSCHNÄPPER
Terpsiphone paradisi (Linnaeus).
Synonym → SHÒUDÀINIĀO 寿带鸟

Anderer Name für den → PARADIES-SCHNÄPPER, *Terpsiphone paradisi* (Linnaeus). Synonym → SHÒUDÀI 寿带

Die Gattung TERPSIPHON Gloger

SHU

SHÙCHUÀN'R 树串儿
3:192

SHŪHÓNG ZHŪQUÈ 曙红朱雀
2:410

SHÙ LIÙ 树鶲
2:27; 3:112

SHÙ MÁQUÈ 树麻雀
2:375

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → GELBBRAUEN-LAUBSÄNGER, *Phylloscopus inornatus* (Blyth). → HUÁNGMÉI LIҮYÍNG 黄眉柳莺, → LIÜCHUÀN'R 柳串儿

AURORAGIMPEL
Carpodacus eos (Stresemann)

WALDPIEPER
Anthus hodgsoni Richmond

Andere Bezeichnung für den → FELD-SPERLING, *Passer montanus* (Linnaeus), → MÁQUÈ (1) 麻雀. - Die chinesische Namensform SHÙ MÁQUÈ 树麻雀 ("Baumsperling") ist offenbar in Anlehnung an die englische Bezeichnung "Treesparrow" gebildet.

Die Gattungen DENDROCITTA Gould und TEMNURUS Lesson

GRAUAMMER
Emberiza calandra Linnaeus

SHÙQUÈ SHŪ 树鹊属
(2:97)

SHŪ WŪ 泰鶲
2:429

SHÙYĀ 树鸭	JAVAPFEIFGANS	SHUÍ LIŪ 水鶲	WASSERPIEPER
1:30	Dendrocygna javanica (Horsfield)	2:30; 3:113	Anthus spinolella (Linnaeus)
SHÙYĀ SHǔ 树鸭属	Die Gattung DENDROCYGNA Swainson	SHUÍ LUÒTUǑ 水骆驼	Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für die → ZIMTDOMMEL, Ixobrychus cinnamomeus (Gmelin). → LÌ WĒIYÁN 紫苇鳽
1:29		3:36	
SHÙYÍNG SHǔ 树莺属	Die Gattungen CETTIA Bonaparte und UROSPHENNA Swinhoe	SHUÍPÚ WĒIYÍNG 水蒲苇莺	SCHILFROHRSÄNGER
2:252		2:269	Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus)
SHUANG		SHUÍQÚ SHǔ 水鶲属	Die Gattung RHYACORNIS Blanford
SHUĀNGBIÀN-BĀSÈDÔNG 双瓣八色鸫	SICHELPITTA	(3:153)	Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → EISVOGEL, Alcedo atthis (Linnaeus). → CUÌNIÁO 翠鸟, → PŪTÔNG CUÌNIÁO 普通翠鸟
2:5	Anthocincla phayrei Blyth	SHUÍQUÈ 水雀	
SHUĀNGBIÀN-BĀSÈDÔNG SHǔ 双瓣八色鸫属	Die Gattung ANTHOCINCLA Blyth	3:98	
2:4		SHUÍYĀQUÈ (1) 水鶲雀	Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → WEISSSCHEITEL-SCHERENSCHWANZ, Enicurus leschnaulti (Vieillot). → HĒIBÈI YÀNWĒI 黑背燕尾
SHUI		3:156	
SHUÍ ĀNHŪN 水鹤鹑	Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für das → ROTNACKEN-LAUFHÜHNCHEN, Turnix tanki Blyth. → HUÁNGJIǎO SĀNZHǐCHŪN 黄脚三趾鹑	SHUÍ YĀQUÈ (2) 水鶲雀	Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → BACHSTUTZSCHWANZ, Enicurus scouleri Vigors. → XIǎo YÀNWĒI 小燕尾
3:61		3:156	
SHUÍ HÚLÚ 水葫芦	Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → ZWERGTAUCHER, Tachybaptus ruficollis (Pallas). → XIǎo PÌTÍ 小䴙䴘	SHUÍZHÌ 水雉	WASSERFASAN
(3:29)		1:122	Hydrophasianus chirurgus (Scopoli)
SHUÍ LĀOGUĀ 水老鸹	Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für die → BACHWASSERAMSEL, Cinclus pallasi Temminck. → HÉ HÉWŪ 禾河乌	SHUÍZHÌ SHǔ 水雉属	Die Gattung HYDROPHASIANUS Wagler
3:141		1:122	
SHUÍ LĀOYĀ 水老鸹	Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → KORMORAN, Phalacrocorax carbo (Linnaeus). → LÚCÍ 鸬鹚, → PŪTÔNG LÚCÍ 普通鸬鹚	SI	
3:30		SÌCHUĀN ZHÌCHŪN 四川雉鹑	SZETSCHWAN-KEILSCHWANZHUHN
		1:80	Tetraophasis szechenyii Madarász

SĪGUĀNG LIÁNGNIĀO 丝光椋鸟
(2:83; 3:131)

SĪGUĀNNIĀO SHŪ 丝冠鸟属
2:1

SĪQUÈ SHŪ 丝雀属
2:389

SÌSHĒNG DÙJUĀN 四声杜鹃
(1:177; 3:85)

SŌNGHUĀJĪ 松花鸡
3:55

SŌNGJĪ 松鸡
3:57

SŌNGJĪ KĒ 松鸡科
1:73

SŌNGJĪ SHŪ 松鸡属
1:73

SŌNGQUÈ 松雀
2:415

SŌNGQUÈ SHŪ 松雀属
2:414

SŌNG QUÈ YÍNG 松雀鹰
1:48; 3:47

SŌNGYĀ 松鸦
2:89; 3:133

SEIDENSTAR
Sturnopastor sericeus (Gmelin)

Die Gattung SERIOPHUS Swainson

Die Gattung SERINUS Koch

KURZFLÜGELKUCKUCK
Hierococcyx micropterus (Gould)

SONG-SOU

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → BLUTFASAN, *Ithaginis cruentus* (Hartwicke). → XUÈZHÌ 血雉

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → KOKLASFASAN, *Pucrasia macrolopha* (Lesson). → SHÁOJĪ 勺鸡

Die Familie TETRAONIDAE (Rauhfüß-hühner), heute gewöhnlich als Unterfamilie der → PHASIANIDAE angesehen

Die Gattung TETRAO Linnaeus

HAKENGIMPEL
Pinicola enucleator (Linnaeus)

Die Gattung PINICOLA Vieillot

TRILLERSPERBER
Accipiter virgatus (Temminck)

EICHELHÄHER
Garrulus glandarius (Linnaeus)

SŌNGYĀ SHŪ 松鸦属
2:89

SŌUMÉI SHŪ 紫鹃属
2:219

SUÌ JÍ 穗鹛
2:149

SUÌMÉI SHŪ 穗鹛属
2:180

SŪN KĒ 隼科
1:65; 3:50

SŪN SHŪ 隼属
1:65

SŪN-XÍNG MÙ 隼形目
1:41; 3:45

SUŌYŪHÈ 蓑羽鹤
1:112

SUŌYŪHÈ SHŪ 蓑羽鹤属
1:112

Die Gattung GARRULUS Brisson

Die Gattung LIOCICHLA Swinhoe

SUI-SUN-SUO

STEINSCHMÄTZER
Oenanthe oenanthe (Linnaeus)

Die Gattung STACHYRIS Blyth

Die Familie FALCONIDAE (Falken)

Die Gattung FALCO Linnaeus

Die Ordnung FALCONIFORMES (Greif-vögel). Synonym → YÍNG-XÍNG MÙ 鹰形目

JUNGFERNKRANICH
Anthropoides virgo (Linnaeus)

Die Gattung ANTHROPOIDES Vieillot

TAI

TÀIBÁIJĪ 太白鸡
3:55

TÀIPÍNGNIĀO 太平鸟
2:64; 3:123

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → BLUTFASAN, *Ithaginis cruentus* (Hartwicke). → XUÈ-ZHÌ 血雉

SEIDENSCHWANZ
Bombycilla garrulus (Linnaeus).
Synonym → SHÍERHUÁNG 十二黄

TÀIPÍNGNIĀO KĒ 太平鸟科

2:64; 3:123

TÀIPÍNGNIĀO SHŪ 太平鸟属

2:64

TÁIWĀN ÀN LÁNQUÈ 台湾暗蓝雀

(2:94)

TÁIWĀN BĒI 台湾鹀

2:55

TÁIWĀN HUÁNG SHĀNQUÈ 台湾黄山雀

2:334

TÁIWĀN SHĀNZHÈGŪ 台湾山鹧鸪

1:88

TÁIWĀN Zǐ XIÀODŌNG 台湾紫啸鸫

2:156

TÀIYÁNGNIĀO KĒ 太阳鸟科

2:364; 3:219

TÀIYÁNGNIĀO SHŪ 太阳鸟属

2:365

Die Familie BOMBYCILLIDAE (Seidenschwänze)

Die Gattung BOMBYCILLA Vieillot

DICKSCHNABELKITTA

Urocissa caerulea Gould

FORMOSABÜLBÜL

Pycnonotus taivanus Styani

FORMOSAMEISE

Parus holsti Seeböhm

FORMOSABUSCHWACHTEL

Arborophila crudigularis (Swinhoe)

FORMOSAPFEIFDROSSEL

Myophonus insularis (Gould)

Die Familie NECTARINIIDAE (Nektarvögel)

Die Gattung AETHOPYGA Cabanis

TIĀNÉ 天鹅

1:28

TIĀNÉ SHŪ 天鹅属

1:28

TIĀNJĪ SHŪ 田鸡属

1:115

TIĀNJIZĪ 田鸡子

3:63

TIÁN LIŪ 田鹨

(2:31); 3:114

TIÁN WŪ 田鶲

2:441; 3:236

TIÁNYÙ SHŪ 田鹤属

(1:137)

SINGSCHWAN

Cygnus cygnus (Linnaeus). Synonym
→ DÀ TIĀNÉ 大天鹅Die Gattung CYGNUS Bechstein. Synonym
→ HÚ SHŪ 鹅属

Die Gattung PORZANA Vieillot

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) 1. für das → ZIMTSUMPFHUHN, *Porzana fusca* (Linnaeus), 2. für das → ZWERGSUMPFHUHN, *Porzana pusilla* (Pallas)

SPORNPIEPER

Anthus novaeseelandiae (Gmelin)

WALDDAMMER

Emberiza rustica PallasAnderer Name für die Gattung → *GALLINAGO* Brisson. Synonym → SHĀ-ZHŪI SHŪ 沙锥属

TI

TÍHÚ KĒ 鹈鹕科

1:8

TÍHÚ SHŪ 鹈鹕属

1:8

TÍ-XÍNG MÙ 鹳形目

1:7; 3:30

Die Familie PELECANIDAE (Pelikane)

Die Gattung PELECANUS Linnaeus

Die Ordnung PELECANIFORMES (Ruderfüßer)

TIĚLIÀNJIĀ 铁炼甲

3:128

TIĚLÍNJIA 铁鳞甲

3:99

TIĒSHÙPÍ 贴树皮

3:95

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → KÖNIGSDRONGO,

Dicrurus macrocercus Vieillot.

→ HĒI JUĀNWĒI 黑卷尾

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → DOLLARVOGEL, *Eurystomus orientalis* Linnaeus. → SĀNBĀONIĀO 三宝鸟Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für die → JOTAKANACHT-SCHWALBE, *Caprimulgus indicus* Latham. → YÈYÍNG 夜鹰

TIĀN

TIĀN DŌNG 田 鸽

2:165

WACHOLDERDROSSEL

Turdus pilaris Linnaeus

TIĚ YĀNZI 铁燕子

3:128

TIĚZHĀOWŪ 铁爪鹀

2:448

TIĚZHĀOWŪ SHŪ 铁爪鹀属

2:448

TIĚZUĪ SHĀ HÉNG 铁嘴沙鸻

1:130; 3:70

TÓNGLÁN WĒNG 铜蓝鹟

(2:325; 3:205)

TŪBÍ WŪ YĀ 兀鼻乌鵲

2:104; 3:137

TŪGUÀN 兀鹤

1:23

TŪGUÀN SHŪ 兀鹤属

1:23

TŪHŪ 兔虎

3:51

TŪJIÙ 兀鹫

1:59; 3:50

TŪJIÙ SHŪ 兀鹫属

1:59

TŪYĀN 兀雁

1:31

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → KÖNIGSDRONGO, *Dicrurus macrocercus* Vieillot.
→ HĒI JUĀNWĒI 黑卷尾

SPORNAMMER
Calcarius lapponicus (Linnaeus)

Die Gattung CALCARIUS Bechstein

WÜSTENREGENPFEIFER
Charadrius leschenaultii Lesson
LAZULISCHNÄPPER (MEERBLAUER FLIEGENSCHNÄPPER)
Eumyias thalassina (Swainson)

TU

SAATKRÄHE
Corvus frugilegus Linnaeus

MALAIENSTORCH (ADJUTANT)
Leptoptilos javanicus (Horsfield)
Die Gattung LEPTOPTILOS Lesson

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → SAKERFALKEN (Würgfalken), *Falco cherrug* J.E. Gray. → LIÈ SŪN

MÖNCHSGEIER (KUTTENGEIER)
Aegypius monachus (Linnaeus)

Die Gattung AEGYPIUS Savigny

NILGANS
Alopochen aegyptiacus (Linnaeus)

TŪYĀN SHŪ 兀雁属

1:31

TŪ YĀNZI 土燕子

3:75

WĀIBÓ 垂脖

3:101

WĀNDŌU BĀGĒ 豌豆八哥

3:85

WĀNDŌUQUÈ 豌豆雀

3:122

WĀNZUĪ BĀNYŪ 弯嘴滨鹬

1:142

WĒI WŪ 莺鶲

2:445; 3:237

WĒIYÁN SHŪ 莺鶲属

1:19

WĒIYÍNG SHŪ 莺鶲属

2:266

Die Gattung ALOPOCHEN Stejneger

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für die → ROTBRUST-BRACHSCHWALBE, *Glareola maldivarum* J.R. Forster. → YĀNHÉNG 燕衙

WAI-WAN

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → WENDEHALS, *Jynx torquilla* Linnaeus. → YǐLIÈ 叉髻

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → KURZFLÜGELKUCKUCK, *Hierococcyx micropterus* (Gould). → SÍSHĒNG DŪJUĀN 四声杜鹃

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → HALSBANDBÜLBÜL, *Spizixos semitorques* Swinhoe. → LÙ YÍNGZUĪBĒI 绿莺嘴鹀

SICHELSTRANDLÄUFER
Calidris ferruginea (Pontoppidan)

WEI

GRAUSCHULTER-ROHRAMMER
Emberiza pallasi (Cabanis)

Die Gattung IXOBRYCHUS Billberg

Die Gattung ACROCEPHALUS J.A. und F. Naumann

WÉNBÈI BŪZHŪNIÀO 纹背捕蛛鸟

2:370

WÉNBÈI SHĀN JIĀOYÍNG 纹背山鹛鸟
莺

2:304

WÉNHÓU BĒI 纹喉鹛

2:58

WÉNHÓU Fèngméi 纹喉凤鹛

2:233

WÉNNIÀO KĒ 文鸟科

(2:373; 3:221)

WÉNNIÀO SHŪ 文鸟属

2:386

WÉNTÓU BĀNCHIMÉI 纹头斑翅鹛

(2:227)

WÉNXIÖNG DÖNGMÉI 纹胸鹛

2:176

WÉNXIÖNGMÉI 纹胸鹛

(2:183)

WÉNXIÖNGMÉI SHŪ 纹胸鹛属

(2:183)

WÉNXIÖNG ZHIBUNIÀO 纹胸织布鸟

2:384

WÉNXIÖNG ZHŪMÙNIÀO 纹胸啄木鸟

1:236

WÉNXŪQUÈ 文须雀

2:186

WEN

STREIFEN-SPINNENJÄGER

Arachnothera magna Blyth

BERGPRINIE

Prinia criniger (Hodgson)

STREIFENKEHLBÜLBÜL

Pycnonotus finlaysoni Strickland

KEHLSTREIFENYUHINA

Yuhina gularis Hodgson

Die Familien ESTRILDIDAE (Pracht-finken), PLOCEIDAE (Webervögel) und PASSERIDAE (Sperlinge)

Die Gattung LONCHURA Sykes

YÜNNANSIBIA

Actinodura waldeni Godwin-Austen

STREIFENBRUST-ZAUNKÖNIGTIMALIE

Napothera epilepidota (Temminck)

GELBBRUST-BAUMTIMALIE

Mixornis gularis (Horsfield)

Die Gattung MIXORNIS Blyth

MANYARWEBER

Ploceus manyar (Horsfield)

STREIFENBRUSTSPECHT

Dendrocopos atratus (Blyth)

BARTMEISE

Panurus biarmicus (Linnaeus)

WÉNXŪQUÈ SHŪ 文须雀属

2:186

Die Gattung PANURUS Koch

WENG

WĒNG KĒ 翁科

2:121

WĒNG SHŪ 翁属

(2:321)

WĒNG YÀKĒ 翁亚科

2:306

Die Familie MUSCICAPIDAE (Sänger)

Die Gattungen MUSCICAPA Brisson und EUMYIAS Cabanis

Die Unterfamilie MUSCICAPINAE (Fliegenschnäpper). - Die Familie MONARCHIDAE (Monarchen), für die bisher in der chinesischen ornithologischen Literatur noch kein Name vorhanden ist, wird von den Ornithologen Chinas bislang noch zu den MUSCICAPINAE - hier die Gattungen HYPOTHYMIS, TERPSIPHONE, RHIPIDURA, CULICICAPA und CHELIDORYNX - gerechnet

Die Gattungen SEICERCUS Swainson und ABROSCOPUS Stuart Baker

WU

WŪ DIĀO 乌雕

1:55

SCHELLADLER

Aquila clanga Pallas

WŪ DŌNG 乌鵲

2:160; 3:161

AMSEL

Turdus merula Linnaeus

WŪ GUĀN 乌鶲

3:36

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → SCHWARZSTORCH, *Ciconia nigra* (Linnaeus). → HĒI GUĀN 黑鶲

WŪHUIĒ DŌNG 乌灰鵙

2:159

WŪHUIĒ YÀO 乌灰鵠

1:61

WŪJIĀO BĪNYÙ 乌脚滨鹬

1:141; 3:74

WŪ JIĀOXIĀO 乌角鵠

1:189

WŪJIŪ 兀鹫

1:59

WŪJIŪ SHŪ 兀鹫属

1:59

WŪJUĀN 乌鹃

1:181

WŪ JUĀNJIŪ 乌鹃鳩

1:168

WŪJUĀN SHŪ 乌鹃属

1:181

WŪ LÍNXIĀO 乌林鵠

1:198

WŪ SHŪ 鸥属

(2:429)

WŪ WĒNG 乌翁

2:321; 3:204

WŪ YĀ 乌鸦

3:139

WŪ YĀN'ŌU 乌燕鸥

1:156

WŪZUĬ LIŪYĪNG 乌嘴柳莺

2:283

SCHECKENDROSSEL

Turdus cardis Temminck

WIESENWEIHE

Circus pygargus (Linnaeus)

TEMMINCKSTRANDLÄUFER

Calidris temminckii (Leisler)

KOROMANDELHU

Bubo coromandus (Latham)

HIMALAYAGEIER

Gyps himalayensis HumeDie Gattung *GYPS* Savigny

DRONGOKUCKUCK

Surniculus lugubris (Horsfield)

MARONENTAUBE

Macropygia phasianella (Temminck)Die Gattung *SURNICULUS* Lesson

BARTKAUZ

Strix nebulosa J.R. ForsterDie Gattungen *EMBERIZA* Linnaeus,
LATOUCHORNIS Bangs und *TISA* Clark

RUSSSCHNÄPPER

Muscicapa sibirica GmelinVolkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für die → *DICKSCHNABEL-KRÄHE*, *Corvus macrorhynchos* Wagler.
→ *DÀZUĬ WŪ YĀ* 大嘴乌鸦

RUSSSEESCHWALBE

Sterna fuscata Linnaeus

SCHLUCHTENLAUBSÄNGER

Phylloscopus magnirostris Blyth

XI

Xīgòulóu 溪雎嗟

3:74

Xīkāng zhìchún 西康雉鹑

1:80

Xīméi shǔ 希鹛属

2:229

Xīniǎo 犀鸟

1:219

Xīniǎo kē 犀鸟科

1:218

Xīniǎo shǔ 犀鸟属

1:219

Xīquú shǔ 溪鶲属

2:139

Xǐquè 喜鹊

2:96; 3:136

Xìwén wěiyīng 细纹苇莺

2:269

Xìwén zàoméi 细纹噪鹛

2:213

Xīyù máquè 西域麻雀

2:374

Xīzàng máotuǐshājī 西藏毛腿沙

鸡

1:160

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → *IBISSCHNABEL*,
Ibidorhyncha struthersii Vigors.
→ *HUÁNZUÍYÙ* 鸦嘴鵙SIKANG-KEILSCHWANZHUHN
Tetraophasis obscurus (J. Verreaux)Die Gattung *MINLA* HodgsonDOPPELHORNVOGEL
Buceros bicornis LinnaeusDie Familie *BUCEROTIDAE* (Nashornvögel)Die Gattung *BUCEROS* LinnaeusDie Gattung *CHAIMARRORNIS* HodgsonELSTER
Pica pica (Linnaeus)HIRSEROHRSÄNGER
Acrocephalus sorghophilus (Swinhoe)BORSTENHÄHERLING
Garrulax lineatus (Vigors)Anderer Name für den → *SAXAULSPERLING*, *Passer ammodendri* Gould.
→ *HĒIDÍNG MÁQUÈ* 黑顶麻雀TIBETFLUGHUHN
Syrrhaptes tibetanus Gould

XÍZUǐ 锡嘴
3:230

XÍZUǐ BÍNYÙ 细嘴滨鹬
1:140

XÍZUǐ HUÁNGLÍ 细嘴黄鹂
(2:74)

XÍZUǐ QUÈ 锡嘴雀
2:426; 3:230

XÍZUǐ SHĀBAILÍNG 细嘴沙百灵
2:8

XÍZUǐ SHǔ 锡嘴属
2:426

XÍZUǐ SÖNGJÍ 细嘴松鸡
(1:73)

XIAN

XIĀN HÈ 仙鹤
1:111

XIÁN SHǔ 鹳属
1:97

XIĀNWĒNG SHǔ 仙翁属
(2:315)

Verkürzte und in der Umgangssprache übliche Namensform für den → KERNBEISSE, *Coccothraustes coccothraustes* (Linnaeus). → XÍZUǐ QUÈ 锡嘴雀

GROSSER KNUTT
Calidris tenuirostris (Horsfield)

Oriolus chinensis tenuirostris
Blyth, eine Rasse des → SCHWARZNACKENPIROLS

KERNBEISSE
Coccothraustes coccothraustes
(Linnaeus)

TIBETLERCHE
Calandrella acutirostris Hume
Die Gattung COCCOTHRUSTES Brisson

FELSENAUERHUHN
Tetrao parvirostris Bonaparte

MANDSCHURENKRANICH
Grus japonensis (P.L.S. Müller).
Synonym → DĀNDÍNG HÈ 丹顶鹤

Die Gattung LOPHURA Fleming

Die Gattungen NILTAVA Hodgson und
CYORNIS Blyth

XIANG

XIĀNG BĒNDĀMÙ 香槟打木
3:102

XIĀNGSĪNIĀO SHǔ 相思鸟属
2:220

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → GRAUSPECHT, *Picus canus* Gmelin. → LŪZHŪMÙNIĀO 绿啄木鸟

Die Gattung LEIOTHRIX Swainson

XIAO

XIĀO BÁIÉ YÀN 小白额雁
1:27

XIĀO BÁIHÓU YÍNG 小白喉莺
2:273

XIĀO BÁIYÀO YÜYÀN 小白腰雨燕
1:207

XIĀO BĀN WĒNG 小斑鶲
2:312

XIĀO BĀN ZHUÓMÙNIĀO 小斑啄木鸟
1:236

XIĀO Bǎo 小鸨
1:121

XIĀO BÚZHŪNIĀO 小捕蛛鸟
2:370

XIĀO DIĀO 小雕
(1:56)

XIÀODōNG SHǔ 喜鹊属
2:155

XIĀO DÙJUĀN 小杜鹃
1:180; 3:87

ZWERGBLÄSSGANS
Anser erythropus (Linnaeus)

BUSCHGRASMÜCKE
Sylvia minula Hume

HAUSSEGLER
Apus affinis (J.E. Gray)

ELSTERSCHNÄPPER
Ficedula westermanni (Sharpe)

KLEINSPECHT
Dendrocopos minor (Linnaeus)

ZWERGTRAPPE
Tetrax tetrax (Linnaeus)

GRAUKEHL-SPINNENJÄGER
Arachnothera longirostris (Latham)

ZWERGADLER
Hieraetus pennatus (Gmelin)

Die Gattung MYOPHONUS Temminck et Laugier

GACKELKUCKUCK
Cuculus poliocephalus Latham

XIǎo Fèngtóuyàn'ōu 小 凤头 燕 鸥 1:157	SCHANTUNG-SEESCHWALBE <i>Thalasseus zimmermanni</i> (Reichenow)
XIǎo Hēilǐng zàoméi 小 黑 领 噪 鹊 2:202	LÄTZCHENHÄHERLING <i>Garrulax moniliger</i> (Hodgson)
XIǎo huángyīng 小 蜡 鹦 2:263	STREIFENSCHWIRL <i>Locustella certhiola</i> (Pallas)
XIǎo huī shānjiāoniǎo 小 灰 山 板 鸟 3:119	Die Rasse <i>Pericrocotus roseus cantonensis</i> Swinhoe des → ROSENMENNIG-VOGEL, → FĚNHÓNG SHĀNJIĀONIǎO
XIǎo jiāoméi 小 焦 眉 鹊 2:179; 3:168	MOOSTIMALIE <i>Pnoepyga pusilla</i> Hodgson
XIǎo ōu 小 鸥 1:150	ZWERGMÖWE <i>Larus minutus</i> Pallas
XIǎo pánwěi 小 盘 尾 2:79	SPATELSCHWANZDRONGO <i>Dicrurus remifer</i> (Temminck)
XIǎo pítī 小 破 鸟 鹈 (1:2; 3:29)	ZWERGTAUCHER <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas)
XIǎo qīngjiǎo yù 小 青 脚 鹈 1:135	KURZFUSS-WASSERLÄUFER <i>Tringa guttifer</i> (Nordmann)
XIǎo shābāilǐng 小 沙 百 灵 (2:7; 3:106)	KURZZEHENLERCHE <i>Calandrella brachydactyla</i> (Leisler)
XIǎo shānlǎoguā 小 山 老 鹅 3:138	Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für die → DOHLE, <i>Corvus monedula</i> Linnaeus, und die → EL-STERDOHLE, <i>Corvus dauuricus</i> Pallas. → HÁN YĀ 寒 鹅
XIǎo sháoyù 小 杓 鹈 1:131	ZWERGBRACHVOGEL <i>Numenius minutus</i> Gould
XIǎo shuǐlùotuō 小 水 骆 驼 3:35	Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für die → CHINESENDOMMEL, <i>Ixbrychus sinensis</i> (Gmelin). → HUÁNGBĀN WĒIYÁN 黄 斑 莺 鹈

XIǎo shuǐyā 小 水 鸭 3:40	XIǎosūn 小 雉 1:65	Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für die → KRICKENTE, <i>Anas crecca</i> Linnaeus. → LÜCHÌ YĀ 绿 翅 鸭
XIǎosūn shǔ 小 雉 属 1:65	XIǎo tāipíngniǎo 小 太 平 鸟 2:64	ELSTER-ZWERGFALKE <i>Microhierax melanoleucus</i> (Blyth) Die Gattung MICROHIERAX Sharpe
XIǎo tiánjī 小 田 鸡 1:115; 3:63	XIǎo wěiyán 小 莺 鹈 1:19	ROTBINDEN-SEIDENSCHWANZ <i>Bombycilla japonica</i> (Siebold). Synonym → SHÍERHÓNG 十 二 红
XIǎo wū 小 鸽 2:441; 3:237	XIǎo xiānwēng 小 仙 鹮 2:316	ZWERGSUMPFHUHN <i>Porzana pusilla</i> (Pallas)
XIǎoxiāo 小 鸮 1:194	XIǎoxiāo shǔ 小 鸮 属 1:194	ZWERGDOMMEL <i>Ixbrychus minutus</i> (Linnaeus)
XIǎoxiāo-xíng mù 鸮 形 目 1:183; 3:88	XIǎoxiāo zhūomùniǎo 小 星 头 啄 木 鸟 1:238	ZWERGAMMER <i>Emberiza pusilla</i> Pallas
XIǎoxiāo zhūomùniǎo 小 星 头 啄 木 鸟 1:238	XIǎoyājuān 小 鸦 鹈 1:183	FEENNILTAVA <i>Niltava macgrigoriae</i> (Burton)
XIǎoyājuān 小 鸦 鹈 1:183	KIZUKISPECHT <i>Yungipicus kizuki</i> (Temminck)	STEINKAUZ <i>Athene noctua</i> (Scopoli). Synonym → ZÒNGWÉNFÙ XIǎoxiāo 纵 纹 腹 小 鸮
	BENGALENKUCKUCK <i>Centropus bengalensis</i> (Gmelin)	Die Gattung ATHENE Boie
		Die Ordnung STRIGIFORMES (Eulen)

XIÀO YÀN WĒI 小燕尾

2:143; 3:156

XIÀO YÚN QUÈ 小云雀

2:16; 3:107

XIÀO ZUĪ HÉNG 小嘴衡阳

1:131

XIÀO ZUĪ WŪ YĀ 小嘴乌鸦

2:107; 3:140

XIÈ DÔNG 榆鶲

2:165

XIĒWĒI BÓLÁO 楔尾伯劳

2:70; 3:126

XIĒWĒI LÙJIŪ 楔尾绿鸠

(1:161)

XIĒWĒI ÒU 楔尾鸥

1:151

XIĒWĒI ÒU SHŪ 楔尾鸥属

1:151

XÌNJIĀNG GĒQÚ 新疆歌鸲

2:123

XÌNJIĀNG JIÀOXIĀO 新疆角鸮

1:185

BACHSTUTZSCHWANZ

Enicurus scouleri Vigors

KLEINE FELDLERCHE

Alauda gulgula Franklin

MORNELLREGENPFEIFER

Eudromias morinellus (Linnaeus)

AASKRÄHE (RABEN- und NEBELKRÄHE)

Corvus corone Linnaeus

XIE

MISTELDROSSEL

Turdus viscivorus Linnaeus

KEILSCHWANZWÜRGER

Lanius sphenocercus Cabanis. Synonym → CHÁNGWĒI HUĪ BÓLÁO 长尾灰伯劳

KEILSCHWANZ-GRÜNTAUBE

Treron sphenurus (Vigors)

ROSENMÖWE

Larus roseus MacGillivray

RHODOSTETHIA MacGillivray, von manchen Autoren als Gattung angesehene Untergattung der Gattung LARUS Linnaeus

XIN

NACHTIGALL

Luscinia megarhynchos C.L. Brehm

ZWERGOHREULE

Otus scops (Linnaeus)

XÌNTIĀN WĒNG KĒ 信天翁科

1:4

XÌNTIĀN WĒNG SHŪ 信天翁属

1:4

Die Familie DIOMEDEIDAE (Albatrosse)

Die Gattung DIOMEDEA Linnaeus

XING

XÌNGTÓU ZHUÓMÙNIÀO 星头啄木鸟

(1:236; 3:105)

XÌNGYĀ 星鸦

2:100; 3:136

XÌNGYĀ SHŪ 星鸦属

2:100

GRAUSCHEITELSPECHT

Yungipicus canicapillus (Blyth)

TANNENHÄHER

Nucifraga caryocatactes (Linnaeus)

Die Gattung NUCIFRAGA Brisson

XIU

XIÙLIĀN GŌUZUÍMÉI 镶脸钩嘴鹛

2:172; 3:167

XIÙLIÚ 鸩鹛

(1:192; 3:92)

XIÙLIÚ SHŪ 鸩鹛属

1:191

XIÙXIÖNG LÁN WĒNG 镶胸蓝翁

2:311

XIÙYÀNNIÀO KĒ 绣眼鸟科

2:371; 3:219

XIÙYÀNNIÀO SHŪ 绣眼鸟属

2:371

ROTWANGENSÄBLER

Pomatorhinus erythrogenys Vigors

TRILLERKAUZ

Glaucidium castanopterum (Horsfield)

Die Gattung GLAUCIDIUM Boie

FICHTENSCHNÄPPER

Ficedula hodgsonii (Verreaux)

Die Familie ZOSTEROPIDAE (Brillenvögel)

Die Gattung ZOSTEROPS Vigors et Horsfield

	XU	XUĚJĪ SHŪ 雪鸡属 1:77	Die Gattung TETRAOGALLUS J.E. Gray
XŪ FÚŌU 须浮鸥 1:152	WEISSBART-SEESCHWALBE Chlidonias hybrida (Pallas)	XUĒLÍYĪNG 草鹀莺 2:271	BUSCHSPÖTTER Hippolais caligata (Lichtenstein)
XŪLIÈ KĒ 须䴕科 1:219	Die Familie CAPITONIDAE (Bartvögel)	XUĒLÍYĪNG SHŪ 草鹀莺属 2:270	Die Gattung HIPPOLAIS Conrad
	XUAN	XUÈQUÈ 血雀 2:419	SCHARLACHGIMPEL Haematoxipha sipahi (Hodgson)
XUÁNBÍQUÈ SHŪ 旋壁雀属 2:355	Die Gattung TICHODROMA Illiger	XUÈQUÈ SHŪ 血雀属 2:419	Die Gattung HAEMATOSPIZA Blyth
XUÁNMÙQUÈ 旋木雀 2:356	WALDBAUMLÄUFER Certhia familiaris Linnaeus. Synonym → PŪTŌNG XUÁNMÙQUÈ 普通旋木雀	XUĒWŪ 雪鹀 2:449	SCHNEEAMMER Plectrophenax nivalis (Linnaeus)
XUÁNMÙQUÈ KĒ 旋木雀科 2:355; 3:217	Die Familie CERTHIIDAE (Baumläufer)	XUĒWŪ SHŪ 雪鹀属 2:449	Die Gattung PLECTROPHENAX Stejneger
XUÁNMÙQUÈ SHŪ 旋木雀属 2:355	Die Gattung CERTHIA Linnaeus	XUĚXIĀO 雪鶲 1:190; 3:91	SCHNEEEULE Nyctea scandiaca (Linnaeus)
	XUE	XUĚYÀN 雪雁 1:28	Die Gattung NYCTEA Stephens
XUĚCHÚN 雪鹑 1:76	HALDENHUHN Lerwa lerwa (Hodgson)	XUÈZHÌ 血雉 1:90; 3:55	SCHNEEGANS Anser caerulescens (Linnaeus)
XUĚCHÚN SHŪ 雪鹑属 1:76	Die Gattung LERWA Hodgson	XUÈZHÌ SHŪ 血雉属 1:90	BLUTFASAN Ithaginis cruentus (Hardwicke)
XUĚ GĒ 雪鸽 1:164	SCHNEETAUBE Columba leuconota Vigors		Die Gattung ITHAGINIS Wagler
XUĚJĪ 雪鸡 1:77	TIBET-KÖNIGSHUHN Tetraogallus tibetanus Gould	YĀJUĀN SHŪ 鸽鹃属 1:183	YA Die Gattung CENTROPUS Illiger

YĀ KĒ 鸭科

1:25; 3:37

YĀ KĒ 鸭科

2:88; 3:133

YĀMÉI SHŪ 雉鶲属

2:170

YĀQUÈ 鸭鵠

3:136

YĀQUÈ SHŪ 鸭雀属

(2:188)

YĀ SHŪ 鸭属

1:31

YĀ SHŪ 鸭属

2:104

YĀZUǐ JUĀNWEI 鸭嘴卷尾

2:77

YĀN BĀGĒ 燕八哥

(3:130)

YĀN BÁILÙ 岩白鹭

1:17

YĀN GĒ (1) 岩鸽

1:165

Die Familie ANATIDAE (Entenartige)

Die Familie CORVIDAE (Rabenvögel)

Die Gattung TRICHOSTOMA Blyth

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für die → ELSTER, *Pica pica* (Linnaeus). → XÍQUÈ 喜鹊

Die Gattung PARADOXORNIS Gould (einschl. CHOLORNIS Verreaux, SUTHORA Hodgson, CHLEUASICUS Blyth und NEOSUTHORA Hellmayr)

Die Gattung ANAS Linnaeus

Die Gattung CORVUS Linnaeus

KRÄHEN SCHNABEL DRONGO
Dicrurus annectans (Hodgson)

YAN

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → MONGOLENSTAR, *Sturnia sturnina* (Pallas). → BĚI LIÁNGNIĀO 北椋鸟Andere Bezeichnung für den → RIFF-REIHER, *Egretta sacra* (Gmelin). Synonym → YĀNLÙ 岩鹭

KLIPPENTAUPE

Columba rupestris Pallas

YĀN GĒ (2) 岩鸽

3:80

YĀNHÉNG 燕鹤

1:146; 3:75

YĀNHÉNG KĒ 燕鹤科

1:146; 3:75

YĀNHÉNG SHŪ 燕鹤属

1:146

YĀNUÒ 燕鹱

1:6

YĀNUÒ SHŪ 燕鹱属

1:6

YĀNJĪ 岩鸡

3:53

YĀNJUÉ KĒ 燕鷗科

2:87

YĀNJUÉ SHŪ 燕鷗属

2:87

YĀN KĒ 燕科

2:18; 3:108

YĀNLIÙ KĒ 岩鷗科

2:114; 3:142

YĀNLIÙ SHŪ 岩鷗属

2:114

YĀNLÙ 岩鹭

1:17

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für die → SCHWARZSCHNABEL-OLIVENTAUBE, *Columba hodgsonii* Vigors. → BĀNDIĀN GĒ 斑点鸽ROTBRUST-BRACHSCHWALBE
Glareola maldivarum J.R. Forster

Die Familie GLAREOLIDAE (Brachschwalbenartige)

Die Gattung GLAREOLA Brisson

BULWERSTURMVOGEL
Bulweria bulwerii (Jardine et Selby)

Die Gattung BULWERIA Bonaparte

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für das → CHUKARHUHN, *Alectoris chukar* (J.E. Gray). → SHÍJĪ 石鸟

Die Familie ARTAMIDAE (Schwalbenstare)

Die Gattung ARTAMUS Vieillot

Die Familie HIRUNDINIDAE (Schwalben)

Die Familie PRUNELLIDAE (Braunellen)

Die Gattung PRUNELLA Vieillot

RIFFREIHER
Egretta sacra (Gmelin). Synonym → YĀN BÁILÙ 岩白鹭

YĀN'ŌU 燕鷗

1:154; 3:77

YĀN'ŌU SHŪ 燕鷗屬

1:153

YĀNQUÈ 燕雀

2:388; 3:223

YĀNQUÈ SHŪ 燕雀屬

2:388

YĀN SHŪ 雁屬

1:26

YĀN SHŪ 燕屬

2:20

YĀN SŪN 燕隼

1:68; 3:51

YĀNWĒI SHŪ 燕尾屬

2:143

YĀNWÉN ZÀOMÉI 眼紋噪鶥

2:209

YĀN-XÍNG MÙ 雁形目

1:25; 3:37

YÁNYÀN (1) 岩燕

3:111

YÁNYÀN (2) 岩燕

2:23

YÁNYÀN SHŪ 岩燕屬

2:23

YÁNYÍNG 岩鷹

3:45

FLUSSSEESCHWALBE

Sterna hirundo Linnaeus. Synonym
→ PŪTŌNG YĀN'ŌU 普通燕鷗

Die Gattung STERNA Linnaeus

BERGFINK

Fringilla montifringilla Linnaeus

Die Gattung FRINGILLA Linnaeus

Die Gattung ANSER Brisson

Die Gattungen HIRUNDO Linnaeus und
CECROPIS Boie

BAUMFALKE

Falco subbuteo Linnaeus

Die Gattung ENICURUS Temminck

WALDHÄHERLING

Garrulax ocellatus (Vigors)

Die Ordnung ANSERIFORMES (Enten-
vögel)Volkstümliche Bezeichnung (in S-
Shensi) für die → MEHLSCHWALBE,
Delichon urbica (Linnaeus). →
MÁOJIÀOYÀN 毛脚燕

FELSENSCHWALBE

Ptyonoprogne rupestris (Scopoli)

Die Gattung PTYONOPROGNE Reichen-
bachVolkstümliche Bezeichnung (in S-
Shensi) für den → SCHWARZMILAN,
Milvus migrans (Boddaert). → YUĀN
鳶

YĀNZǐ 燕子

3:109; 3:110

Volkstümliche Bezeichnung (in S-
Shensi) 1. für die → RAUCHSCHWALBE,
Hirundo rustica Linnaeus, 2. für
die → RÖTELNSCHWALBE, Cecropis dau-
rica (Linnaeus)

YANG

WASSERRALLE

Rallus aquaticus Linnaeus. Synonym
→ PŪTŌNG YĀNGJĪ 普通秧鸡

Die Familie RALLIDAE (Rallen)

Die Ordnung RALLIFORMES (Rallen)

Die Gattung RALLUS Linnaeus

Volkstümliche Bezeichnung (in S-
Shensi) für den → SPERBERKUCKUCK,
Hierococcyx sparverioides (Vigors).
→ YÍNGTÓU DÙJUĀN 鹰头杜鹃

SÜDSEESCHWALBE

Hirundo tahitica Gmelin

YAO

YÀO HÚLŪ 药葫蘆

(3:29)

Volkstümliche Bezeichnung (in S-
Shensi) für den → ZWERGTAUCHER,
Tachybaptus ruficollis (Pallas).
→ XIĀO PÌTĪ 小䴙䴘

YÀOJUĀN KĒ 咬鹃科

1:208

Die Familie TROGONIDAE (Trogone)

YĀOJUĀN MÙ 咬鹃目

1:208

YĀOJUĀN SHŪ 咬鹃属

1:208

YÀO SHŪ 鹞属

1:60

YÀOYÍNG 鹞鹰

3:47

YÀOZI 鹞子

3:46; 3:47

Die Ordnung TROGONIFORMES (Trogone)

Die Gattung HARPACTES Swainson

Die Gattung CIRCUS Lacépède

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → SPERBER, Accipiter nisus (Linnaeus). → QUÈ YÍNG 雀鹰

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) 1. für den → CHINESENSCHIKRA, Accipiter soloensis (Horsfield), → CHÌFÙ YÍNG 赤腹鹰, 2. für den → SPERBER, Accipiter nisus (Linnaeus), → QUÈ YÍNG 雀鹰, 3. für den → TRILLERSPERBER, Accipiter virgatus (Temminck), → SŌNG QUÈ YÍNG 松雀鹰

YE

YÈBĒI SHŪ 叶鹎属

2:62

YÈFĒNGHŪ 夜蜂虎

1:216

YÈFĒNGHŪ SHŪ 夜蜂虎属

1:216

YĚ GĒZI 野鸽子

3:79

Die Gattung CHLOROPSIS Jardine et Selby

BLAUBARTSPINT

Nyctyornis athertoni (Jardine et Selby)

Die Gattung NYCTYORNIS Jardine et Selby

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für die → FELSENTAUBE, Columba livia Gmelin. → YUÁN GĒ 原鸽

YĚJĪ 野鸡

3:58

YÈLŪ 夜鹭

1:17; 3:35

YÈLŪ SHŪ 夜鹭属

(1:17)

YÈ MĀOZI 夜猫子

3:88

YÈWĒI HUÒ 夷尾鹱 → YIWĒI HUÒ

YĚYĀN 野雁

3:66

YĚYĀN 野燕

1:205; 3:97

YĚYÍNG 夜鹰

1:201; 3:95

YĚYÍNG KĒ 夜鹰科

1:201; 3:95

YĚYÍNG MÙ 夜鹰目

1:201; 3:95

YĚYÍNG SHŪ 夜鹰属

1:201

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → JAGDFASAN, (Fasan), Phasianus colchicus Linnaeus. → HUÁNJÍNG ZHÌ 环颈雉

NACHTREIHER

Nycticorax nycticorax (Linnaeus)

Die Gattungen NYCTICORAX T. Forster und OROANASSA Peters

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für die → ZWERGOHREULE, Otus scops (Linnaeus). → HÓNG JIĀOXIĀO 红角鸮

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für die → GROSSTRAPPE, Otis tarda Linnaeus. → DÀ BĀO 大鸨, → DIPŪ 地鶲

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → MAUERSEGLER, Apus apus (Linnaeus). → BĚIJīNG YŪYĀN 北京雨燕, → LÓUYĀN 楼燕

JOTAKANACHTSCHWALBE

Caprimulgus indicus Latham

Die Familie CAPRIMULGIDAE (Ziegenmelker)

Die Ordnung CAPRIMULGIFORMES (Schwalmvögel)

Die Gattung CAPRIMULGUS Linnaeus

YI

WENDEHALS

Jynx torquilla Linnaeus

YÍLÌE SHŪ 蚁鶲属

1:221

YÍSÈ SHÙYÍNG 黑色树莺

2:255; 3:186

YÍSHÌ ZÀOMÉI 伊氏噪鹛

2:215

YÍWĒI HUÒ 鬼尾鹱

1:5

Die Gattung JYNX Linnaeus

OLIBUSCHSÄNGER

Cettia flavigularis (Blyth)

ELLIOTTHÄHERLING

Garrulax elliotii (Verreaux). Synonym → CHÉNGCHÌ ZÀOMÉI 橙翅噪鹛

KEILSCHWANZ-STURMTAUCHER

Puffinus pacificus (Gmelin)

YIN

YÍNĚR XIĀNGSINIÃO 银耳相思鸟

2:220

YÍNHÓU CHÁNGWÉISHĀNQUÈ 银喉长尾山雀

2:346; 3:213

YÍNHÓU SHĀNQUÈ 银喉山雀

2:346; 3:213

YÍNLIÁN CHÁNGWÉISHĀNQUÈ 银脸长尾山雀

2:349; 3:214

YÍNLIÁN SHĀNQUÈ 银脸山雀

2:349

YÍNNÁN Zǐ XIÀODÖNG 印南紫嘴鵙
→ TÁIWĀN Zǐ XIÀODÖNG 台湾紫嘴

鵙

(2:156)

SILBEROHR-SONNENVOGEL

Leiothrix argentauris (Hodgson)

SCHWANZMEISE

Aegithalos caudatus (Linnaeus).

Synonym → YÍNHÓU SHĀNQUÈ 银喉山雀

Anderer Name für die → SCHWANZMEISE, Aegithalos caudatus (Linnaeus). Synonym → YÍNHÓU CHÁNGWÉI-SHĀNQUÈ 银喉长尾山雀

GRAUKOPF-SCHWANZMEISE

Aegithalos fuliginosus (Verreaux).

Synonym → YÍNLIÁN SHĀNQUÈ 银脸山雀

Anderer Name für die → GRAUKOPF-SCHWANZMEISE, Aegithalos fuliginosus (Verreaux). → YÍNLIÁN CHÁNGWÉI-SHĀNQUÈ 银脸长尾山雀

YÍN ŌU 银鸥

1:148

YÍNXIŌNG SīGUĀNNIÃO 银胸丝冠

鸟

2:1

SILBERMÖWE

Larus argentatus Pontoppidan

SILBERBRUST-BREITMAUL

Serilophus lunatus (Gould)

YING

BERGADLER

Nisaetus nipalensis Hodgson

Die Gattung NISAETUS Hodgson

(1:52)

YÍNGDIĀO 鹰雕

(1:52)

YÍNGDIĀO SHŪ 鹰雕属

(1:52)

YÍNGGĒ 婴鸽

3:99

(1:52)

YÍNG KĒ 鹰科

1:41

YÍNG KĒ 莺科

(2:250)

YÍNG SHŪ 鹰属

1:44

YÍNG SHŪ 莺属

2:271

YÍNGTÓU DÙJUĀN 鹰头杜鹃

(1:176; 3:84)

YÍNGWÚ KĒ 婴鸟武鸟科

1:173

YÍNGWÚ SHŪ 婴鸟武鸟属

1:173

YÍNGXIĀO 鹰鸮

1:194; 3:93

(1:176)

Die Gattung SYLVIA Scopoli

Die Gattung ACCIPITER Brisson

Die Gattung SYLVIA Scopoli

SPERBERKUCKUCK

Hierococcyx sparverioides (Vigors)

Die Familie PSITTACIDAE (Papageien)

Die Gattung PSITTACULA Cuvier

FALKENKAUZ

Ninox scutulata (Raffles)

YÍNGXIĀO SHǔ 鹰鸮属
1:193

YÍNG-XÍNG Mù 鹰形目
1:173

YÍNG-XÍNG Mù 鹰形目
1:41

YÍNGZUĪBĒI SHǔ 鹰嘴鵟属
2:59

YÓUBÍ TIĀNÉ 疣鼻天鹅
1:29

Yōuméi shǔ 幽鹛属
2:169

Yóu Sǔn 游隼
(1:67)

Yùdài Hǎidiāo 玉带海雕
1:57

Yúdiāo 渔雕
(1:58)

Yúdiāo shǔ 渔雕属
1:58

Yúgǒu shǔ 鱼狗属
1:209

Yù Kē 鹕科
1:131; 3:70

Die Gattung NINOX Hodgson

Die Ordnung PSITTACIFORMES (Papageien)

Anderer Name für die Ordnung →
FALCONIFORMES (Greifvögel). →
SŪN-XÍNG Mù 隼形目

Die Gattung SPIZIXOS Blyth

YOU

HÖCKERSCHWAN

Cygnus olor (Gmelin)

Die Gattung PELLORNEUM Swainson

WANDERFALKE, *Falco peregrinus* Tunstall, sowie WÜSTENFALKE, *Falco pelegrinoides* Temminck

YU

BINDENSEEADLER

Haliaeetus leucoryphus (Pallas)

BRAUNSCHWANZ-SEEADLER

Ichthyophaga humilis (Müller)

Die Gattung ICHTHYOPHAGA Lesson

Die Gattung CERYLE Boie

Die Familie SCOLOPACIDAE (Schnepfen)

YÚ ŌU 鱼鸥

1:149

YUSHĀN ZÀOMÉI 玉山噪鹛

2:217

YÙ SHǔ 鹮属
(1:133)

YÙTÓU WĒNG 玉头鵙

2:314; 3:201

YÚXIĀO SHǔ 鱼鸮属

1:190

YÙ-XÍNG Mù 鹰形目

1:122

YŪYÀN 雨燕

(1:205)

YŪYÀN Kē 雨燕科

1:203; 3:96

YŪYÀN Mù 雨燕目

1:203; 3:96

YŪYÀN SHǔ 雨燕属

1:205

YÚ YÍNG 鱼鹰

3:30

YUĀN 鹰

1:43; 3:45

FISCHMÖWE

Larus ichthyaetus Pallas

MORRISONHÄHERLING

Garrulax morrisonianus (Ogilvie-Grant)

Die Gattungen TRINGA Linnaeus, ACTITIS Illiger und HETEROSCELUS Baird

SAPHIRSCHNÄPPER

Ficedula sapphira Blyth

Die Gattung KETUPA Lesson

Andere Bezeichnung für die Ordnung CHARADRIIFORMES (Watvögel). → HÉNG-XÍNG Mù 鹤形目

MAUERSEGLER

Apus apus (Linnaeus). Synonym → LÓUYÀN 楼燕

Die Familie APODIDAE (Segler)

Die Ordnung APODIFORMES (Segler-vögel)

Die Gattung APUS Scopoli

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → KORMORAN, *Phalacrocorax carbo* (Linnaeus). → LÚCÍ 鸬鹚, → PŪTŌNG LÚCÍ 普通鸬鹚

YUAN

SCHWARZMILAN

Milvus migrans (Boddaert)

YUÁN GĒ 原鸽

1:165; 3:79

YUÁNJĪ 原鸡

1:100

YUÁNJĪ SHÙ 原鸡属

1:99

YUÁNQUÈ SHÙ 原雀属

2:418

YUĀN SHÙ 鸢属

1:43

YUÁNWĒIHUÒ SHÙ 园尾鹱属

1:6

YUÁNWĒI LÜ BĒI 园尾绿鵙

2:59

YUĀNYĀNG (US YUĀNYĀNG) 鸳鸯

(1:36)

YUĀNYĀNG SHÙ 鸳鸯属

(1:36)

YÚNQUÈ 云雀

2:14; 3:107

YÚNQUÈ SHÙ 云雀属

2:14

FELSENTAUBE

Columba livia Gmelin

BANKIVAHUHN

Gallus gallus (Linnaeus)Die Gattung *GALLUS* BrissonDie Gattung *PROPYRRHULA* Hodgson,
(heute gewöhnlich als Untergattung
der Gattung *PINICOLA* Vieillot be-
trachtet).Die Gattung *MILVUS* LacépèdeDie Gattung *PTERODROMA* Bonaparte

BLASSWANGENBÜLBÜL

Pycnonotus flavescens Blyth

MANDARINENTE

Dendronessa galericulata (Linnaeus)Die Gattung *DENDROLESSA* Swainson
(von manchen Autoren mit der Gat-
tung *AIX* Boie vereinigt)

YUN

FELDLERCHE

Alauda arvensis LinnaeusDie Gattung *ALAUDA* Linnaeus

ZÁSÈ SHĀNQUÈ 杂色山雀

ZÀNG HUÁNGQUÈ 藏黄雀

(2:393)

ZÀNGQUÈ 藏雀

2:414

ZÀNGQUÈ SHÙ 藏雀属

2:414

ZÀNG WŪ 藏鹀

2:443

ZA-ZANG

BUNTMEISE

Parus varius Temminck et Schlegel

HIMALAYAGIRLITZ

Serinus thibetanus (Hume)

ROBOROWSKIGIMPEL

Carpodacus roborowskii (Przevalski)Die Gattung *KOZLOWIA* Bianchi (heute
gewöhnlich als Untergattung der Gat-
tung *CARPODACUS* Kaup angesehen)

KOSLOWAMMER

Emberiza koslowi Bianchi

ZAO

KOËL

Eudynamys scolopacea (Linnaeus)Die Gattung *EUDYNAMYS* Vigors et
HorsfieldDie Gattung *GARRULAX* Lesson

ZÀOJUĀN 噪鹃

1:182; 3:87

ZÀOJUĀN SHÙ 噪鹃属

1:182

ZÀOMÉI SHÙ 噪鹛属

2:200

ZÀOŌU 噪鸥

1:153

ZÀOŌU SHÙ 噪鸥属

1:152

ZÀOYĀ SHÙ 噪鶲属

2:88

ZÀOZHUÓMÙ SHÙ 噪啄木属

1:240

LACHSEESCHWALBE

Gelochelidon nilotica (Gmelin)Die Gattung *GELOCHELIDON* C.L. BrehmDie Gattung *PERISOREUS* BonaparteDie Gattung *BLYTHIPICUS* Bonaparte

ZÉ YÙ 泽鶲
1:134

ZĒNGKŌU ZÀOMÉI 增口噪鹛
(2:208)

ZE-ZENG

- TEICHWASSERLÄUFER
Tringa stagnatilis (Bechstein)
Garrulax lunulatus bieti (Oustalet),
eine Rasse des → WELLENHÄHERLINGS,
Garrulus lunulatus (Verreaux)

ZHAO

ZHĀOZÉ DÀWÉIYÍNG 沼泽大尾莺
2:262

ZHĀOZÉ SHĀNQUÈ 沼泽山雀
2:340; 3:212

- SCHILFSTEIGER
Megalurus palustris Horsfield
SUMPFMEISE
Parus palustris Linnaeus

ZHE-ZHEN

ZHÈGŪ 鹨
1:82

ZHÈGŪ SHŪ 鹢属
1:82

ZHĚ HÓNGWĒIQÚ 赤红尾鸲
2:135; 3:150

ZHÈNDÀN YĀQUÈ 震旦鸦雀
2:197

ZHĒNJI 榛鸡
1:75

ZHĒNJI SHŪ 榛鸡属
1:74

- PERLHUHNFRANKOLIN
Francolinus pintadeanus (Scopoli)
Die Gattung FRANCOLINUS Stephens
HAUSROTSCHWANZ
Phoenicurus ochruros (Gmelin)
YANGTSE-PAPAGEISCHNABEL (YANGTSE-PAPAGEIMEISE)
Paradoxornis heudei David

- HASELHUHN
Tetrastes bonasia (Linnaeus)
Die Gattung TETRASTES Keyserling et Blasius

ZE-ZENG

ZHĒNWĒI SHĀZHUI 针尾沙锥
1:138; 3:72

ZHĒNWĒI YĀ 针尾鸭
1:31; 3:40

ZHĒNWĒIYŪYĀN 针尾雨燕
1:204

ZHĒNWĒIYŪYĀN SHŪ 针尾雨燕属
1:204

STIFTBEKASSINE (SPIESSBEKASSINE)
Gallinago stenura (Bonaparte)

SPIESENTE
Anas acuta Linnaeus

STACHELSCHWANZSEGLER
Hirundapus caudacutus (Latham)
Die Gattung HIRUNDAPUS Hodgson

ZHI

Anderer Name für den → JAGDFASAN (Fasan), *Phasianus colchicus* Linnaeus. → HUÁNJÍNG ZHÌ 环颈雉

Die Gattung PLOCEUS Cuvier

ZHÌ 稚

1:102

ZHĪBŪNIĀO SHŪ 织布鸟属
2:384

ZHÌCHŪN SHŪ 稚鹑属
1:79

ZHÌHÉNG KĒ 稚鹤科
1:122

ZHÌJĪ 稚鸡
3:58

ZHÌ KĒ 稚科
1:76; 3:53

ZHÌ SHŪ 稚属
1:101

Die Gattung TETRAOPHASIS Elliot

Die Familie JACANIDAE (Blatthühnchen)

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → JAGDFASAN (Fasan), *Phasianus colchicus* Linnaeus. → HUÁNJÍNG ZHÌ 环颈雉

Die Familie PHASIANIDAE (Fasanenartige)

Die Gattung PHASIANUS Linnaeus

ZHONG

ZHōNG BÁILÙ 中白鹭
1:17

MITTELREIHER
Casmerodius intermedius (Wagler)

ZHÖNG DÜJUÄN 中杜鵑

1:179; 3:86

ZHÖNG SHÄOYÜ 中杓鶲

1:132

ZHÖNGYÄ GÄ 中亚鸽

1:166

HOPFKUCKUCK

Cuculus saturatus Blyth

REGENBRACHVOGEL

Numenius phaeopus (Linnaeus)

GELBAUGENTAUBE

Columba eversmanni Bonaparte

ZHU

ZHÜBÈI ZHUÓHUĀNIÄO 朱背啄花鸟

2:362

ZHÜHUÄN 朱鵙

1:24; 3:37

ZHÜHUÄN SHÜ 朱鵙属

1:24

ZHÜJÄ 竹鸡

1:89; 3:54

ZHÜJÄ SHÜ 竹鸡属

1:89

ZHÜJING BÄNJIÜ 珠颈斑鸠

1:170; 3:82

ZHÜQUE 朱雀

2:412; 3:225

ZHÜQUE SHÜ 朱雀属

2:401

ZHÜWÜ 朱鹀

2:429

ZHÜWÜ SHÜ 朱鹀属

2:428

SCHARLACH-MISTELFRESSER (SCHARLACH-BLÜTENPICKER)

Dicaeum cruentatum (Linnaeus)

NIPPONIBIS

Nipponia nippon (Temminck)Die Gattung *NIPPONIA* Reichenbach

GELBBRAUEN-BAMBUSHUHN

Bambusicola thoracica (Temminck)Die Gattung *BAMBUSICOLA* Gould

PERLHALSTAUBE

Streptopelia chinensis (Scopoli)

KARMINGIMPEL

Carpodacus erythrinus (Pallas)Die Gattung *CARPODACUS* Kaup

MEISENAMMER (SCHWANZGIMPEL)

Urocynchramus pylzowi PrzevalskiDie Gattung *UROCYNCHRAMUS* Przevalski

1:228

ZHÜZHUÓMÙ SHÜ 竹啄木属

ZHÜZHUÓMÙNIÄO 竹啄木鸟

1:228

BLASSKOPFSPECHT

Gecinulus grantia (McClelland)Die Gattung *GECINULUS* Blyth

ZHUO

Die Familie *DICAEIDAE* (Mistelfresser oder Blütenpicker)Die Gattung *DICAEUM* CuvierVolkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → BUNTSPECHT, *Dendrocopos major* (Linnaeus). → BÄN ZHUÓMÙNIÄO 斑啄木鸟, → DÀ BÄN ZHUÓMÙNIÄO 大斑啄木鸟Die Familie *PICIDAE* (Spechte)Die Gattungen *DENDROCOPOS* Koch und *YUNGIPICUS* Bonaparte

ZI

SCHNATTERENTE

Anas strepera Linnaeus

VIOLETTRÜCKENSTAR (ROSTBACKENSTAR)

Sturnia philippensis (J.R. Forster)

MANDSCHURENDOMMEL

Ixobrychus eurhythmus (Swinhoe)Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für die → KOHLMEISE, *Parus major* Linnaeus. → BÁILIÄN SHÄNQUÈ 白脸山雀, → DÀ SHÄNQUÈ 大山雀

Zǐchì liángniǎo 紫翅椋鸟

2:82

Zǐjiátiāiyángniǎo 紫颊太阳鸟

2:364

Zǐjiátiāiyángniǎo shǔ 紫颊太阳

鸟属

2:364

Zǐ jīnjuān 紫金鹃

(1:181)

Zǐ kuānzuidōng 紫宽嘴鶲

2:146

Zǐliàn 紫练

3:206

Zǐ lín gē 紫林鸽

1:167

Zǐ shòudài 紫寿带

2:329

Zǐ shòudàiniǎo 紫寿带鸟

2:329

Zǐshuǐjī 紫水鸡

1:119

Zǐshuǐjī shǔ 紫水鸡属

1:119

Zǐ xiāodōng 紫啸鸫

2:155; 3:159

STAR

Sturnus vulgaris Linnaeus

ROTOHR-NEKTARVOGEL

Anthreptes singalensis (Gmelin)

Die Gattung ANTHREPTES Swainson

AMETHYSTKUCKUCK

Chrysococcyx xanthorhynchus (Horsfield)

PURPURSCHNÄPPERDROSSEL

Chochoa purpurea HodgsonVolkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → PARADIESSCHNÄPPER, *Terpsiphone paradisi* (Linnaeus).

→ SHÒUDÀI 寿带, → SHÒUDÀINIĀO 寿带鸟

KUPFERTAUBE

Columba punicea Blyth

PRINZENSCHNÄPPER

Terpsiphone atrocaudata (Eyton).

Synonym → Zǐ shòudàiniǎo 紫寿带鸟

Anderer Name für den → PRINZENSCHNÄPPER, *Terpsiphone atrocaudata* (Eyton). → Zǐ shòudài 紫寿带

PURPURHUHN

Porphyrio porphyrio (Linnaeus)

Die Gattung PORPHYRIO Brisson

PURPURFEIFDROSSEL

Myophonus caeruleus (Scopoli)

ZONG

PALMTAUBE (SENEGALTAUBE)

Streptopelia senegalensis (Linnaeus)

SCHACHWÜRGER

Lanius schach Linnaeus

RHODODENDRONDROSSEL

Turdus kessleri (Przevalski)

ZWEIFARBEN-SUMPFHUHN

Porzana bicolor Walden

BLANFORD-SCHNEEFINK (BLANFORD-SCHNEESPERLING)

Montifringilla blanfordi Hume

ROTKOPF-BUSCHSÄNGER

Cettia brunnifrons (Hodgson)Paradoxornis nipalensis poliotis (Blyth), eine Rasse des → GRAUOHRPAPAGEISCHNABELS (GRAUOHР-PAPAGEIMEISE), *Paradoxornis nipalensis* (Hodgson)

ROTBAUCHADLER

Lophotriorchis kienerii (Geoffroy)

FLUCHTKUCKUCK

Hierococcyx fugax (Horsfield)

ROTBAUCH-WÜRGERTIMALIE

Pteruthius rufiventer Blyth

SWINHOE-NILTAVA

Niltava vivida (Swinhoe)

DORNLAUBSÄNGER

Phylloscopus subaffinis Ogilvie-Grant. → LIUCHUAN'R 柳串儿

ZÖNGFÙ XIĀNWENG 棕腹仙鹟
2:317; 3:203

ZÖNGFÙ ZHUÓMÙNIÀO 棕腹啄木鸟
1:235; 3:104

ZÖNGHÈ DUĀNCHÌYÍNG 棕褐短翅莺
2:261; 3:188

ZÖNGJÍNG GŌUZUÍMÉI 棕颈钩嘴鹛
2:170; 3:166

ZÖNGJÍNG XUÉQUÈ 榆领雀
2:382

ZÖNGLIÁN WĒNGYÍNG 棕脸鹟莺
2:295

ZÖNG LIÜYÍNG 棕柳莺
2:274

ZÖNGMÉI LIÜYÍNG 棕眉柳莺
2:277; 3:191

ZÖNGMÉI SHĀN YÁNLÌU 棕眉山岩
鹨
2:118; 3:144

ZÖNG SĀNZHÍCHÚN 棕三趾鹑
1:110

ZÖNG SHÀNWÉIYÍNG 棕扇尾莺
2:299; 3:198

ZÖNG SHĀYÀN 棕沙燕
2:19

ZÖNGTÓU GĒQÚ 棕头歌鸲
(2:130; 3:148)

ZÖNGTÓU ÒU 棕头鸥
1:150

ROTBACH-NILTAVA (SCHWARZKEHL-
NILTAVA)

Niltava sundara Hodgson

ROSTBAUCHSPECHT

Dendrocopos hyperythrus (Vigors)

ROSTBUSCHSÄNGER

Bradypterus luteoventris (Hodgson)

ROTHALSSÄBLER

Pomatorhinus ruficollis Hodgson

ROTHALS-SCHNEEFINK (ROTHALS-SCHNEE-
SPERLING)

Montifringilla ruficollis Blanford

ROSTWANGEN-LAUBSÄNGER

Seicercus albogularis (Horsfield
et Moore)

ZILPZALP

Phylloscopus collybita (Vieillot)

DAVIDLAUBSÄNGER

Phylloscopus armandii (Milne-Ed-
wards). → LIÜCHUÀN'R 柳串儿

BERGBRAUNELLE

Prunella montanella (Pallas)

BINDENLAUFHÜNCHEN

Turnix suscitator (Gmelin)

CISTENSÄNGER

Cisticola juncidis (Rafinesque)

BRAUNKEHL-UPERSCHWALBE

Riparia paludicola (Vieillot)

ROTKOPFNACHTIGALL

Larvivora ruficeps Hartert

TIBETLACHMÖWE

Larus brunneicephalus Jerdon

ZÖNGTÓU QUÈMÉI 棕头雀鹛
2:240; 3:181

ZÖNGTÓU YĀQUÈ 棕头鸦雀
2:190; 3:171

ZÖNGTÓU YŌUMÉI 棕头幽鹛
2:169

ZÖNGWÉI HÓNGZHÌ 棕尾虹雉
1:94

ZÖNGWÉI KUĀNG 棕尾鵟
1:49

ZÖNGWÉNFÙ XIĀOXIĀO 纵纹腹小鸮
1:194; 3:93

ZÖNGWÉN JIĀOXIĀO 纵纹角鸮
1:185

ZÖNGWÉN LÜ BĒI 纵纹绿鹛
2:58

ZÖNGXIÉ FĒNGMÉI 棕胁凤鹛
2:234

ZÖNGXIÖNG LÁN WĒNG 棕胸蓝鹟
2:310

ZÖNGXIÖNG SHĀNZHÈGŪ 棕胸山鹧
鸪
(1:88)

ZÖNGXIÖNG YĀMÉI 棕胸雅鹛
2:170

ZÖNGXIÖNG YÁNLÌU 棕胸岩鹨
2:117; 3:143

ZÖNGYÜYÀN 棕雨燕
1:207

ROTSCHETTELALCIPPE

Alcippe ruficapilla (Verreaux)

BRAUNKOPF-PAPAGEISCHNABEL (BRAUN-
KOPF-PAPAGEIMEISE)

Paradoxornis webbianus (Gould)

STREIFENTIMALIE

Pellorneum ruficeps Swainson

GELBSCHWANZ-GLANZFASAN

Lophophorus impejanus (Latham)

ADLERBUSSARD

Buteo rufinus (Cretzschmar)

Andere Bezeichnung für den → STEIN-
KAUZ, Athene noctua (Scopoli).

Synonym → XIĀOXIĀO

STREIFENOHREULE

Otus brucei (Hume)

STREIFENBÜLBÜL

Pycnonotus striatus (Blyth)

ROSTSTEISSYUHINA

Yuhina occipitalis Hodgson

ROTBURST-GRUNDSCHNÄPPER

Ficedula hyperythra (Blyth)

NACKTKEHL-BUSCHWACHTEL

Arborophila brunnepectus (Blyth)

ROSTBRUST-MAUSTIMALIE

Trichastoma tickelli (Blyth)

STRICHELBRAUNELLE

Prunella strophiata (Blyth)

PALMENSEGLER

Cypsiurus parvus (Lichtenstein)

ZÖNGYÜYÀN SHÙ 棕雨燕属

1:207

Die Gattung CYPSTURUS Lesson

ZÖNG ZÀOMÉI 棕噪鹛

(2:211)

Eine Rassengruppe des → GRAUFLANKENHÄHERLINGS, *Garrulax caerulatus* (Hodgson)

ZÖNGZHUÓMÙNIÀO 棕啄木鸟

1:223

WEISSBRAUEN-MAUSSPECHT

Sasia ochracea Hodgson

ZÖNGZHUÓMÙ SHÙ 棕啄木属

1:223

Die Gattung SASIA Hodgson

ZÖNG ZHŪQUÈ 棕朱雀

2:407

EDWARDSGIMPEL

Carpodacus edwardsii Verreaux

DEUTSCH-CHINESISCHES GLOSSAR

ZUO

ZUÒSHĀNDIÀO 坐山雕

3:50

Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi) für den → MÖNCHSGEIER (Kuttengeier), *Aegypius monachus* (Linnaeus). → TŪJIÙ 兀鹫

A

AASKRÄHE (RABEN- und NEBELKRÄHE)	XIÀOZUĪ WŪ YĀ 小嘴乌鸦
<i>Corvus corone</i> Linnaeus	2:107; 3:140
ABROSCOPUS	
Die Gattung ABROSCOPUS Stuart Baker	→ WĒNGYÍNG SHŪ 翁莺属 (2:291)
ACANTHIS	→ JīNCHÌ SHŪ 金翅属
Die Gattung ACANTHIS Borkhausen	(2:390)
ACCIPITER	YÍNG SHŪ 鹰属
Die Gattung ACCIPITER Brisson	1:44
ACCIPITRIDAE	YÍNG KĒ 鹰科
Die Familie ACCIPITRIDAE (Greife)	1:41
ACRIDOTHERES	BĀGĒ SHŪ 八哥属
Die Gattung ACRIDOTHERES Vieillot	2:85
ACROCEPHALUS	WĒIYÍNG SHŪ 纹莺属
Die Gattung ACROCEPHALUS J.A. und F. Naumann	2:266
ACTINODURA	BĀNCHIMÉI SHŪ 长翅鶲属
Die Gattung ACTINODURA Gould	2:226
ACTITIS	→ YÙ SHŪ 鹩属
Die Gattung ACTITIS Illiger	(1:133)
ADAMS-SCHNEEFINK (ADAMS-SCHNEE-SPERLING)	HÈCHÌ XUĚQU, 禾翅雪雀
<i>Montifringilla adamsi</i> Adams	2:380
ADAMS-SCHNEESPERLING → ADAMS-SCHNEEFINK	
ADJUTANT → MALAIENSTORCH	
ADLER (Sammelbezeichnung)	DIĀO 鸱
→ BERG-, BINDENSEE-, BRAUNSCHWANZ-SEE-, HABICHTS-, KAISER-, MALAIEN-, RIESENSEE-, ROTBAUCH-,	(1:53)

SCHELL-, SCHLANGEN-, SEE-,
STEIN-, STEPPEN-, WEISSBAUCH-SEE-,
ZWERGADLER.
Der → FISCHADLER trägt seit den
ältesten Zeiten einen eigenen,
nicht mit DIĀO (Adler) gebilde-
ten Namen, nämlich È 鹸

ADLERBUSSARD

Buteo rufinus (Cretzschmar)

ZÖNGWÉI KUÁNG 棕尾鶲

1:49

AEGITHALIDAE

Die Familie AEGITHALIDAE (Schwanz-
meisen)

→ SHĀNQUÈ KĒ 山雀科

(2:331; 3:207)

AEGITHALOS

Die Gattung AEGITHALOS Hermann

CHÁNGWÉISHĀNQUÈ SHÙ 長尾山雀
屬

2:346

AEGITHINA

Die Gattung AEGITHINA Vieillot

QUÈBÉI SHÙ 雀鶥屬

2:61

AEGITHINIDAE

Die Familie AEGITHINIDAE (Eioras)

→ HÉPÍNGNIÀO KĒ 和平鳥科

(2:61)

AEGOLIUS

Die Gattung AEGOLIUS Kaup

GUÍXIĀO SHÙ 鬼鴞屬

1:200

AEGYPIUS

Die Gattung AEGYPIUS Savigny

TŪJIÙ SHÙ 穎鷺屬

1:59

ÄHRENTRÄGERFAU

Pavo muticus Linnaeus

LÜ KÖNGQUÈ 绿孔雀

1:109

AETHOPYGA

Die Gattung AETHOPYGA Cabanis

TÀIYÁNGNIÀO SHÙ 太阳鸟屬

2:365

AIX

Die Gattung AIX Boie, → DENDRO-
NESSA

YÚNQUÈ SHÙ 云雀屬

2:14

ALAUDIDAE

Die Familie ALAUDIDAE (Lerchen)

ALBATROS (Sammelbezeichnung)

→ KURZSCHWANZ-, SCHWARZFUSS-

ALBATROS

ALBATROSSE (Familie) → DIOMEDEIDAE

ALCEDINIDAE

Die Familie ALCEDINIDAE (Eis-
vögel)

ALCEDO

Die Gattung ALCEDO Linnaeus

ALCIDAE

Die Familie ALCIDAE (Alken)

ALCIFORMES

Die Ordnung ALCIFORMES (Alken)

ALCIPPE

Die Gattung ALCIPPE Blyth

ALCIPPE (Sammelbezeichnung für
die zur Gattung ALCIPPE gehö-
renden Timalien)→ BERG-, BRAUNKOPF-, BUNTKOPF-,
GOLD-, GRAUAUGEN-, GRAUKOPF-,
KASTANIEN-, ROTKOPF-, ROTSCHEITEL-,
WEISSBRAUENALCIPPE

ALECTORIS

Die Gattung ALECTORIS Kaup

ALEXANDERSITTICH → KLEINER
ALEXANDERSITTICH

ALK (Sammelbezeichnung)

→ NASHORN-, SILBER-, MARMELALK

ALKEN (1) (Familie) → ALCIDAE

BĀILÍNG KĒ 百灵科

2:5; 3:106

XÌNTIĀNWĒNG 信天翁

1:4

CUÌNIÀO KĒ 翠鸟科

1:209; 3:97

CUÌNIÀO SHÙ 翠鸟属

1:211

HĀIQUÈ KĒ 海雀科

1:158

HĀIQUÈ MÙ 海雀目

1:158

QUÈMÉI SHÙ 雀鹛属

2:237

QUÈMÉI

(2:237)

SHÍJĪ SHÙ 石鸡属

1:80

HĀIQUÈ 海雀

(1:158)

ALKEN (2) (Ordnung) → ALCIFORMES

ALOPOCHEN

Die Gattung ALOPOCHEN Stejneger

ALPENBRAUNELLE

Prunella collaris (Scopoli)

ALPENDOHLE

Pyrrhocorax graculus (Linnaeus)

ALPENGIMPEL

Carpodacus rubicilloides Prze-
valski

ALPENKRÄHE

Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus)

ALPENROTSCHWANZ

Phoenicurus frontalis Vigors

ALPENRUBINKEHLCHEN

Calliope pectoralis Gould

ALPENSTRANDLÄUFER

Calidris alpina (Linnaeus)

AMANDAVA

Die Gattung AMANDAVA Blyth

AMAURORNIS

Die Gattung AMAURORNIS Reichen-
bach

AMETHYSTKUCKUCK

Chrysococcyx xanthorhynchus
(Horsfield)AMMER (Sammelbezeichnung für An-
gehörige der Gattung Emberiza)→ BRAUNKOPF-, FELSEN-, FICHTEN-,
GOLD-, GRAU-, GRAUKOPF (= BRAUN-
OHR)-, GRAUSCHULTER-ROHR-, HAUBEN-,

TŪYĀN SHŪ 兮雁属

1:31

LǏNG YÁNLÌU 领岩鹨

2:114; 3:143

HUÁNZUĬ SHĀNYĀ 黄嘴山鹤

(2:103)

NÍDÀ ZHŪQUÈ 拟大朱雀

2:402

HÓNGZUĬ SHĀNYĀ 红嘴山鹤。 -

Volkstümliche Bezeichnung (in S-
Shensi): HÓNGZUĬ SHĀNLĀOGUÀ 红嘴
山老鹤
(2:102; 3:137)

LÁNÉ HÓNGWĒIQÚ 蓝额红尾鸲

2:136; 3:151

HĒIXIŌNG GĒQÚ 黑胸歌鸲

(2:128)

HĒIFÙ BĪNYÙ 黑腹滨鹬

1:142

HÓNGMÉIHUĀQUÈ SHŪ 红梅花雀属

(2:385)

KÜENIĀO SHŪ 苦恶鸟属

1:117

Zǐ JīNJUĀN 紫金鹃

(1:181)

WŪ 鸥

2:429

JANKOWSKI-, KAPPEN-, KOSLOW-,

MANDSCHUREN-, MASKEN-, PRACHT-,

RÖTEL-, ROHR-, SCHMUCK-, SCHWEFEL-,

TRISTRAM-, WALD-, WEIDEN-, WIESEN-,

ZIPP-, ZWERGAMMER. Ferner → ORTO-

LAN und → STEINORTOLAN

→ BAMBUSAMMER (Gattung Tisa)

→ BLAUAMMER (Gattung Latoucheornis)

→ MEISENAMMER (Gattung Urocynchra-
mus)→ SCHNEEAMMER (Gattung Plectro-
phenax)

→ SPORNAMMER (Gattung Calcarius)

AMMERN (Familie) → FRINGILLIDAE

→ QUÈ KĒ 雀科

(2:388; 3:222)

AMSEL

Turdus merula Linnaeus

WŪ Dōng 乌鵲。 - Volkstümliche
Bezeichnung (in S-Shensi): HĒI-
YÁNGQUÈ 黑洋雀; SHĀNDĀNGBĒI 山
东北
2:160; 3:161

AMURRÖTEL

Monticola gularis (Swinhoe)

BÁIHÓU JÍDōNG 白喉矶鸫

2:152

ANAS

Die Gattung ANAS Linnaeus

YĀ SHŪ 鸭属

1:31

ANATIDAE

Die Familie ANATIDAE (Entenartige)

YĀ KĒ 鸭科

1:25; 3:37

ANOUS

Die Gattung ANOUS Stephens

HĒIYĀN'ŌU SHŪ 黑燕鸥属

1:157

ANSER

Die Gattung ANSER Brisson

YĀN SHŪ 雁属

1:26

ANSERIFORMES

Die Ordnung ANSERIFORMES (Enten-
artige)

YĀN-XÍNG MÙ 雁形目

1:25; 3:37

ANTHOCINCLA

Die Gattung ANTHOCINCLA Blyth

SHUĀNGBIĀN-BĀSÈDōNG SHŪ 双瓣八
色鸫属
2:4

ANTHROCOCEROS	BĀNXĪNIÀO SHŪ 斑犀鸟属
Die Gattung ANTHRACOCEROS Reichenbach	1:218
ANTHREPTES	ZÍJIÁTÀIYÁNGNIÀO SHŪ 紫颊太阳鸟属
Die Gattung ANTHREPTES Swainson	2:364
ANTHROPOIDES	SUÓYŪHÈ SHŪ 索羽鹤属
Die Gattung ANTHROPOIDES Vieillot	1:112
ANTHUS	LIÙ SHŪ 鹟属
Die Gattung ANTHUS Bechstein	2:26
APODIDAE	YŪYÀN KĒ 雨燕科
Die Familie APODIDAE (Segler)	1:203; 3:96
APODIFORMES	YŪYÀN MÙ 雨燕目
Die Ordnung APODIFORMES (Segler-vögel)	1:203; 3:96
APUS	YŪYÀN SHŪ 雨燕属
Die Gattung APUS Scopoli	1:205
AQUILA	→ DIĀO SHŪ 鸱属
Die Gattung AQUILA Brisson	(1:53)
ARACHNOTHERA	BŪZHŪNIÀO SHŪ 捕蛛鸟属
Die Gattung ARACHNOTHERA Temminck	2:370
ARBOROPHILA	SHĀNZHÈGŪ SHŪ 山鹧鸪属
Die Gattung ARBOROPHILA Hodgson	1:87
ARDEA	LÙ SHŪ 鹭属
Die Gattung ARDEA Linnaeus	1:12
ARDEIDAE	LÙ KĒ 鹭科
Die Familie ARDEIDAE (Reiher)	1:12; 3:30
ARDEOLA	CHÍLÙ SHŪ 池鹭属
Die Gattung ARDEOLA Boie	1:14
ARENARIA	FĀNSHÍYÙ SHŪ 翻石鹬属
Die Gattung ARENARIA Brisson	1:136
ARTAMIDAE	YĀNJUÉ KĒ 燕鷗科
Die Familie ARTAMIDAE (Schwalbenstare)	2:87

ARTAMUS	YĀNJUÉ SHŪ 燕鷗属
Die Gattung ARTAMUS Vieillot	2:87
ASIO	ĚRXIÀO SHŪ 耳鷦属
Die Gattung ASIO Brisson	1:198
ATHENE	XIĀOXIÀO SHŪ 小鷦属
Die Gattung ATHENE Boie	1:194
AUGENBRAUENHÄHERLING (CHINESISCHE SPOTTDROSSEL)	HUÀMÉI 画眉
Garrulax canorus (Linnaeus) (Einer der bekanntesten chinesischen Käfigvögel)	2:212; 3:177
AURORAGIMPEL	SHŪHÓNG ZHŪQUÈ 曙红朱雀
Carpodacus eos (Stresemann)	2:410
AUSTERNFISCHER (1)	LÌYÙ 虾鰈
Haematopus ostralegus Linnaeus	1:123
AUSTERNFISCHER (2) (Familie) → HAEMATOPODIDAE	
AVICEDA	JUĀNSŪN SHŪ 鹩隼属
Die Gattung AVICEDA Swainson	1:41
AYTHYA	QIĀNYĀ SHŪ 潜鸭属
Die Gattung AYTHYA Boie	1:34
B	
BABAX (1)	CĀOMÉI SHŪ 草鶲属
Die Gattung BABAX David	2:198
BABAX (2) (Sammelbezeichnung) → KOSLOW-, RIESEN-, STREIFENBABAX	CĀOMÉI 草鶲 (2:198)
BACCHUSREIHER	CHÍLÙ 池鹭
Ardeola bacchus (Bonaparte)	1:14; 3:33
BACHKIEBITZ	JÙCHÌMÀIJÍ 距翅麦鸡
Hoplopterus duvaucelii (Lesson)	1:125

BACHSTELZE	BÁI JÍLÍNG 白鹡鸰 . - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): DIĀNSHUIQUÈ 点水雀 2:34; 3:115
BACHSTUTZSCHWANZ	XIÀO YÀNWEI 小燕尾 . - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): SHUÍYĀQUÈ 水鹤雀 2:143; 3:156
BACHWASSERAMSEL	HÈ HÉWU 褐河乌 . - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): SHUÍ LÀOQUÀ 水老鸹 2:111; 3:141
BÄNDERSIVA	BĀNHÓU XÍMÉI 斑喉希鹛 2:230
BAERENTE	QīNGTÓU QIÁNYÀ 青头潜鸭 1:35
BAJAWEBER	HUÁNGXIÖNG ZHÍBÙNIÀO 黄胸织布鸟 2:384
BAMBUSAMMER	HUĪ WU 灰鵙 (2:443)
BAMBUSBUSCHSÄNGER	HUÁNGFÙ SHÙYÍNG 黄腹树莺 2:256; 3:187
BAMBUSHUHN (Sammelbezeichnung) → GELBBRAUEN-BAMBUSHUHN, GRAUBRAUEN-BAMBUSHUHN	ZHÚJÍ 竹鸡 (1:89)
BAMBUSICOLA	ZHÚJÍ SHÙ 竹鸡属 1:89
BAMBUSLAUBSÄNGER	HUÁNGFÙ WĒNGYÍNG 黄腹翁莺 (2:294)
BAMBUSSCHNÄPPER	HÈXIÖNG WĒNG 褐胸翁 2:324
BANKIVAHUHN	YUÁNJÍ 原鸡 1:100

BARTGEIER (LÄMMERGEIER)	HÚWÜJIÙ 胡兀鹫
Gypaetus barbatus (Linnaeus)	1:60
BARTKAUZ	WŪ LÍNXIĀO 乌林鸮
Strix nebulosa J.R. Forster	1:198
BARTLAUBSÄNGER	JÙZUÍ LIҮYÍNG 巨嘴柳莺
Phylloscopus schwarzi (Radde)	2:278
BARTMEISE	WÉNXŪQUÈ 文须雀
Panurus biarmicus (Linnaeus)	2:186
BARTREBHUHN	BĀNCHÌ SHĀNCHÚN 斑翅山鹑
Perdix dauricae (Pallas)	1:83
BARTSITTICH	FĒIXIÖNG YĪNGWU 绯胸鹦鹉
Psittacula alexandri (Linnaeus)	1:173
BARTVOGEL (Familie) → CAPITONIDAE	
BARTVOGEL (Sammelbezeichnung) → BLAUOPF-, BLAUWANGEN-, GOLDKEHL-, (1:219) GRÜNOHR-, KUPferschmied (= ROTSCHEI-TEL-), SCHWARZBRAUEN-BARTVOGEL	NÍZHUÓMÙ 拟啄木鸟
BAUMFALKE	YÀN SŪN 燕隼 . - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): QīNGTIÁO-ZI 青条子
Falco subbuteo Linnaeus	1:68; 3:51
BAUMLÄUFER (1) (Sammelbezeichnung) → BRAUNKEHL-, HIMALAYA-, WALD-	XUÁNMÙQUÈ 旋木雀
BAUMLÄUFER	2:355
BAUMLÄUFER (2) (Familie) → CERTHIIDAE	
BAUMPIEPER	LÍN LIÜ 林鹨
Anthus trivialis (Linnaeus)	2:27
BAUMROTSCHWANZ	BÁIHÓU HÓNGWÉIQÚ 白喉红尾鸲
Phoenicurus schisticeps (Gray)	2:137; 3:151
BAUMSEGLER (Familie) → HEMIPROCNIDAE	

BAUMSTELZE (WALDSTELZE)	SHĀNJÍLÍNG 山鹛鶲, auch LÍNJÍ-LÍNG 林鹛鶲
<i>Motacilla indica</i> Gmelin	(2:33; 3:114)
BECHSTEINDROSSEL (→ ROTKEHLDROSSEL und → SCHWARZKEHLDROSSEL)	CHÌJÍNG DÖNG 赤颈鶲
<i>Turdus ruficollis</i> Pallas	2:164; 3:162
BEHRINGMÖWE	HUÍCHÌ ÓU 灰翅鸥
<i>Larus glaucescens</i> Naumann	1:149
BEKASSINE (1)	SHÀNWĒI SHĀZHUI 扇尾沙锥
<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus)	(1:139; 3:73)
BEKASSINE (2) (Sammelbezeichnung) → BEKASSINE (1), BERG-, KREISCH-, NEPAL-, STIFT-(= SPIESSBEKASSINE). → WALDBEKASSINE	SHĀZHUI 沙锥 (1:137)
BENGALENGEIER	NǐWÙJIŪ 拟兀鹫
<i>Gyps bengalensis</i> (Gmelin)	1:60
BENGALENGRASSÄNGER	CÁOYÍNG 草鳩
<i>Graminicola bengalensis</i> Jerdon	2:301
BENGALENKUCKUCK	XIÀO YĀJUĀN 小鸦鹃
<i>Centropus bengalensis</i> (Gmelin)	1:183
BENGALENSPINT	HĒIXIÓNG FĒNGHŪ 黑胸蜂虎
<i>Merops leschenaulti</i> Vieillot	1:214
BEO	LIÁOGĒ 鸾哥
<i>Gracula religiosa</i> Linnaeus	2:87
BERGADLER	YÍNGDIĀO 鹰鹃
<i>Nisaetus nipalensis</i> Hodgson	(1:52)
BERGALCIPPE	GĀOSHĀN QUÈMÉI 高山雀鹛
<i>Alcippe striaticollis</i> (Verreaux)	2:239
BERGBEKASSINE	QŪ SHĀZHUI 狐沙锥
<i>Gallinago solitaria</i> Hodgson	(1:137; 3:72)
BERGBLAUSCHNÄPPER	SHĀN LÁN WĒNG 山蓝鹟
<i>Cyornis banyumas</i> (Horsfield)	(2:320)

BERGBRAUNELLE	ZÖNGMÉI SHĀN YÁNLIÙ 棕眉山岩鶲
<i>Prunella montanella</i> (Pallas)	2:118; 3:144
BERGBUSCHSÄNGER	SHĀN SHÙYÍNG 山树鳩
<i>Cettia montana</i> (Horsfield)	(2:254; 3:186)
BERGDROSSEL (Sammelbezeichnung, Gattung <i>Zoothera</i>)	SHĀNDÖNG 山鶲
→ BRAUNRÜCKEN-, LANGSCHWANZ-BERGDROSSEL; ferner → LANGSCHNABEL-DROSSEL, → ERDDROSSEL (GOLDDROSSEL)	2:166
BERGENTE	BĀNBÈI QIÁNYĀ 斑背潜鸭
<i>Aythya marila</i> (Linnaeus)	1:36
BERGFINK	YÀNQUÈ 燕雀. - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): HŪPÍQUÈ 虎皮雀
<i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus	2:388; 3:223
BERGGIMPEL	DÀ ZHŪQUÈ 大朱雀
<i>Carpodacus rubicilla</i> (Güldenstädt)	2:401
BERGHÄNFLING	HUÁNGZUĪ ZHŪDǐNGQUÈ 黄嘴朱顶雀
<i>Linaria flavirostris</i> (Linnaeus)	(2:394)
BERGKALANDLERCHE	ÈRBĀN BĀILÍNG 二斑百灵
<i>Melanocorypha bimaculata</i> (Ménétries)	2:9
BERGKOHLMEISE	LÜBÈI SHĀNQUÈ 绿背山雀
<i>Parus monticolus</i> Vigors	2:333; 3:209
BERGKURZFLÜGEL	LÁN DUĀNCHÌDÖNG 蓝短翅鶲
<i>Brachypteryx montana</i> Horsfield	(2:122;) 3:145
BERGPRINIE	WÉNBÈI SHĀN JIĀOYÍNG 纹背山鷦鷯
<i>Prinia criniger</i> (Hodgson)	2:304
BERGSCHNEIDERVOGEL	JÍNTÓU FÉNGYÈYÍNG 金头缝叶莺
<i>Orthotomus cucullatus</i> Temminck	2:297
BEUTELMEISE	PĀNQUÈ 攀雀
<i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus)	2:358
BEUTELMEISEN (Familie) → REMIZIDAE	

BIENENFRESSER (1)	HUÁNGHÓU FÉNGHŪ 黄喉蜂虎	BIRKHUHN	HĒI QÍNJĪ 黑琴鸡
Merops apiaster Linnaeus	1:215	Lyrurus tetrix (Linnaeus)	1:73
BIENENFRESSER (2) (Familie)		BLÄSSGANS	BAÍÉ YÀN 白额雁
→ MEROPIDAE		Anser albifrons (Scopoli)	1:27
BIENENFRESSER (3) (Sammelbezeichnung)	FÉNGHŪ 蜂虎	BLÄSSHUHN	GŪDÍNGJĪ 骨顶鸡, auch BÁIGŪDÍNG
→ SPINT	(1:214)	Fulica atra Linnaeus	白骨顶 1:120; 3:65
BINDENFREGATTVOGEL	JŪNJIĀNNIĀO 军舰鸟	BLANFORDGIMPEL	CHÌ ZHŪQUÈ 赤朱雀
Fregata minor (Gmelin)	1:11	Carpodacus rubescens (Blanford)	2:405
BINDENGIMPEL	BĀNCHÌ ZHŪQUÈ 斑翅朱雀	BLANFORD-SCHNEEFINK (BLANFORD-SCHNEESPERLING)	ZŌNGBÈI XUĒQUÈ 棕背雪雀
Carpodacus trifasciatus Verreaux	2:413; 3:226	Montifringilla blanfordi Hume	2:382
BINDEN-GRÜNTAUBE	CHÉNGXIōNG SHĀNJIŪ 橙胸山鸠	BLANFORD-SCHNEESPERLING → BLANFORD-SCHNEEFINK	
Treron bicincta (Jerdon)	1:163	BLASSBAUCH-SCHOPFBÜLBÜL	BÁIHÓU GUĀNBĒI 白喉冠鵙
BINDENKREUZSCHNABEL	BÁICHÌ JIĀOZUīQUÈ 白翅交嘴雀	Criniger pallidus Swinhoe	2:48
Loxia leucoptera Gmelin	2:416	BLASSKOPFSPECHT	ZHÚZHUÓMÙNIĀO 竹啄木鸟
BINDENLAUFHÜHNCHEN	ZŌNG SĀNZHÍCHŪN 棕三趾鹑	Gecinulus grantia (McClelland)	1:228
Turnix suscitator (Gmelin)	1:110	BLASSWANGENBÜLBÜL	YUÁNWĒI LÜ BĒI 园尾绿鹑
BINDENSCHWANZTAUBE	JUĀNJIŪ 鹌鹑	Pycnonotus flavescent Blyth	2:59
Macropygia unchall (Wagler)	1:167	BLATTHÜHNCHEN (Familie) → JACANIDAE	
BINDENSEEADLER	YÙDÀI HĀIDIĀO 玉带海雕	BLATTVOGEL (Familie) → CHLOROPS-EIDAE	
Haliaeetus leucoryphus (Pallas)	1:57	BLATTVOGEL (Sammelbezeichnung) → BLAUBART-, GELBKOPF-, GOLDSTIRN- BLATTVOGEL	YÈBĒI 叶鹑 (2:62)
BINDEN-ZAUNKÖNIGTIMALIE	BĀNCHÌ LIÁOMÉI 斑翅鹩鹛	BLAUAMMER	LÁN WŪ 蓝鵠
Spelaeornis troglodytoides (Verreaux)	2:177; 3:167	Latoucheornis siemsseni (Martens)	(2:447; 3:238)
BIRKENMEISE	HÈGUĀN SHĀNQUÈ 褐冠山雀	BLAUBART-BLATTVOGEL	CHÉNGFÙ YÈBĒI 橙腹叶鹑
Parus dichrous Blyth	2:339; 3:211	Chloropsis hardwickii Jardine et Selby	2:62
BIRKENZEISIG (1)	BÁIYĀO ZHŪDÍNGQUÈ 白腰朱顶雀		
Acanthis flammea (Linnaeus)	(2:393)		
BIRKENZEISIG (Sammelbezeichnung)	ZHŪDÍNGQUÈ 朱顶雀. - Unter diese		
→ BIRKENZEISIG (1), → POLARBIRKEN- ZEISIG	Sammelbezeichnung fallen nach chinesischem Sprachgebrauch auch die Hänflinge; → HÄNFLING (2)		
	(2:392/394)		

BLAUBARTSPINT
Nyctyornis athertoni (Jardine et
 Selby)

BLAUBRUSTSCHNÄPPER
Cyornis unicolor Blyth

BLAUELSTER
Cyanopica cyana (Pallas)

BLAUER OHRFASAN
Crossoptilon auritum (Pallas)

BLAUFLÜGELHÄHERLING
Garrulax squamatus (Gould)

BLAUFLÜGELSIVA (BLAUFLÜGEL-SONNEN-
 VOGEL)
Minla cyanuroptera (Hodgson)

BLAUFLÜGEL-SONNENVOGEL → BLAU-
 FLÜGELSIVA

BLAUKEHLCHEN
Cyanosylvia svecica (Linnaeus)

BLAUKEHLSCHNÄPPER
Cyornis rubeculoides (Vigors)

BLAUKOPF-BARTVOGEL
Megalaima virens (Boddaert)

BLAUKOPFRÖTEL
Phoenicurus coeruleocephalus
 Vigors

BLAUKOPTIMALIE
Heterophasia pulchella (Godwin-
 Austen)

BLAUMERLE
Monticola solitarius (Linnaeus)

YÈFĒNGHŪ 夜蜂虎
 1:216

CHÚNLÁN WĒNG 纯蓝鹟
 (2:318)

HUÍXÍQUÈ 灰喜鹊. - Volkstümliche
 Bezeichnung (in S-Shensi): HUÍQUÈ
 灰鹊
 2:94; 3:135

LÁN MĀJĪ 蓝马鸡
 1:97

LÍNBĀN ZÀOMÉI 鳞斑噪鹛
 2:214

LÁNCΗI XīMÉI 蓝翅希鹛
 2:231

LÁNDIĀNKĒ 蓝点颏
 (2:126)

LÁNHÓU WĒNG 蓝喉鹟
 (2:319; 3:203)

DÀ NÍZHUÓMÙ 大拟啄木
 1:220

LÁNTÓU HÓNGWĒIQŪ 蓝头红尾鸲
 2:134

LÌSÈ QÍMÉI 丽色奇鹛
 2:249

LÁN JÍDŌNG 蓝矶鸫
 2:154; 3:159

BLAUNACHTIGALL
Larvivora cyane (Pallas)

BLAUNACKEN-NEKTARVOGEL
Hypogramma hypogrammicum (S.Müller)

BLAUNACKENPITTA
Pitta nipalensis (Hodgson)

BLAURACKE
Coracias garrulus Linnaeus

BLAURÜCKENPITTA
Pitta soror Ramsay

BLAUSCHWANZ
Tarsiger cyanurus (Pallas) s.
 auch → FORMOSABLAUSCHWANZ, → WEISS-
 BRAUEN-BLAUSCHWANZ

BLAUSCHWANZSPINT
Merops philippinus Linnaeus

BLAUWANGEN-BARTVOGEL
Megalaima asiatica (Latham)

BLÜTENPICKER (1) (Familie)
 → DICAЕIDAE

BLÜTENPICKER (2) (Sammelbezeich-
 nung) gleichbedeutend mit → MISTEL-
 FRESSER (2)

BLUTFASAN
Ithaginis cruentus (Hardwicke)

BLUTHÄNFLING → HÄNFLING

BLUTPIROL
Oriolus traillii (Vigors)

LÁN GĒQÚ 蓝歌鸲
 (2:124; 3:146)

LÁNZHĒN HUĀMÌNIĀO 蓝枕花蜜鸟
 (2:365)

LÁNZHĒN BĀSÈDŌNG 蓝枕八色鸫
 2:2

LÁNXIōNG FÓFASĒNG 蓝胸佛法僧
 1:216

LÁNBÈI BĀSÈDŌNG 蓝背八色鸫
 2:3

HÓNGXIÉ LÁNWĒI QÚ 红肠蓝尾鸲 .
 - Volkstümliche Bezeichnung (in S-
 Shensi): LÁNWĒIBĀ GĒNZI (= LÁNYÍBĀ
 GĒNZI) 蓝尾巴根子
 2:131; 3:148

LÌHÓU FĒNGHŪ 栗喉蜂虎
 1:215

LÁNHÓU NÍZHUÓMÙ 蓝喉拟啄木
 1:221

XUÈZHÌ 血雉. - Volkstümliche Be-
 zeichnung (in S-Shensi): GUĀLĀJĪ
 哇拉鸡; SÔNGHUAJĪ 松花鸡; TÀI-
 BÁIJĪ 太白鸡
 1:90; 3:55

LÌSÈ HUÁNGLÍ 栗色黄鹂
 2:74

BLYTHIPICUS	ZÀOZHUÓMÙ SHŪ 噪啄木属
Die Gattung BLYTHIPICUS Bonaparte	1:240
BOMBYCILLA	TÀIPÍNGNIÀO SHŪ 太平鸟属
Die Gattung BOMBYCILLA Vieillot	2:64
BOMBYCILLIDAE	TÀIPÍNGNIÀO KĒ 太平鸟科
Die Familie BOMBYCILLIDAE (Seidenschwänze)	2:64; 3:123
BORSTENHÄHERLING	XÌWÉN ZÀOMÉI 细纹噪鹛
Garrulax lineatus (Vigors)	2:213
BOTAURUS	MÁYÁN SHŪ 麻鹀属
Die Gattung BOTAURUS Stephens	1:20
BOULTONBUSCHWACHTEL	HÓNGXIōNG SHĀNZHÈGŪ 红胸山鹧鸪
Arborophila rufipectus Boulton	1:88
BRACHPIEPER	PÍNGYUÁN LIŪ 平原鹨。 - Dieser
Anthus campestris (Linnaeus)	Name gilt auch für den → GODLEWSKI-PIEPER, Anthus godlewskii (Taczanowski)
	(2:26)
BRACHSCHWALBE → ROTBRUST-BRACH-SCHWALBE	
BRACHSCHWALBENARTIGE (Familie) → GLAREOLIDAE	
BRACHVOGEL (Sammelbezeichnung) → GROSSER-, ISABELL-, REGEN-, ZWERGBRACHVOGEL	SHÁOYÙ 杓鶲 (1:131)
BRACHYPTERYX	DUĀNCHÌDōNG SHŪ 短翅鸫属
Die Gattung BRACHYPTERYX Horsfield	2:121
BRACHYRAMPHUS	BĀNHÁIQÜE SHŪ 斑海雀属
Die Gattung BRACHYRAMPHUS Brandt	1:158
BRADYPTERUS	DUĀNCHÌYÍNG SHŪ 短翅莺属
Die Gattung BRADYPTERUS Swainson	2:258
BRAHMAKAUZ	HÉNGBāNFÙ XIĀOXIÀO 横斑腹小鸮
Athene brama (Temminck)	1:195

BRAHMINENWEIH	LÌYUĀN 栗鹀
Haliastur indus (Boddaert)	1:44
BRANDGANS	QIÁOBÍ MÁYĀ 翘鼻麻鸭
Tadorna tadorna (Linnaeus)	1:30
BRANTA	HĒIYÀN SHŪ 黑雁属
Die Gattung BRANTA Scopoli	1:25
BRAUENROHRSÄNGER (STREIFENROHR-SÄNGER)	HĒIMÉI WĒIYÍNG 黑眉苇莺
Acrocephalus bistrigiceps Swinhoe	2:268; 3:189
BRAUENSCHNÄPPER	BÁIMÉI LÁN WĒNG 白眉蓝鹟
Ficedula superciliaris (Jerdon)	2:312
BRAUNBAUCH-KIELRALLE	HÓNGJIÀO KÜENIÀO 红脚苦恶鸟
Amaurornis akool (Sykes)	1:117
BRAUNBAUCHKUCKUCK	BĀSHĒNG DÙJUĀN 八声杜鹃
Cacomantis merulinus (Scopoli)	1:181
BRAUNBAUCHSPECHT	HUÁNGFù ZHUÓMÙNIÀO 黄腹啄木鸟
Dendrocopos darjellensis (Blyth)	1:232
BRAUNBAUCH-TRAGOPAN	HUÁNGFù JIÀOZHÌ 黄腹角雉
Tragopan caboti (Gould)	1:94
BRAUNBRUST-BLAUSCHNÄPPER	HĒIKĒ LÁN WĒNG 黑额蓝鹟
Cyornis tickelliae Blyth	(2:321)
BRAUNELLE (Sammelbezeichnung) → ALPEN-, BERG-, FAHL-, HIMALAYA-, ROTKEHL-, SCHWARZKEHL-, STEPPEN-, STRICHEL-, WALDBRAUNELLE	YÁNLIÙ 岩鹨 (2:114)
BRAUNELLEN (Familie) → PRUNELLIDAE	
BRAUNER OHRFASAN	HÈ MĀJĪ 褐马鸡
Crossoptilon mantchuricum Swinhoe	1:97
BRAUNKEHL-BAUMLÄUFER	HÈHÓU XUÁNMÙQUÈ 褐喉旋木雀
Certhia discolor Blyth	2:358
BRAUNKEHL-UFERSCHWALBE	ZÖNG SHĀYÀN 棕沙燕
Riparia paludicola (Vieillot)	2:19

BRAUNKOPFALCIPPE	HÈTÓU QUÈMÉI 褐头雀鹛
Alcippe cinereiceps (Verreaux)	2:241; 3:182
BRAUNKOPFAMMER	HÈTÓU WŪ 褐头鹀
Emberiza bruniceps Brandt	2:431
BRAUNKOPFDROSSEL	HÈTÓU DŌNG 褐头鶲
Turdus feae (Salvadori)	2:163
BRAUNKOPF-PAPAGEIMEISE → BRAUNKOPF-PAPAGEISCHNABEL	
BRAUNKOPF-PAPAGEISCHNABEL (BRAUNKOPF-PAPAGEIMEISE)	ZÖNGTÓU YĀQUÈ 棕头鸦雀. - Volks-tümliche Bezeichnung (in S-Shensi):
Paradoxornis webbianus (Gould)	LÚFÈNQIÚ'R 驴糞球儿; NIUSHÍDÀN 牛屎蛋 2:190; 3:171
BRAUNKOPFPITTA	LÌTÓU BĀSÈDŌNG 栗头八色鸫
Pitta oatesi (Hume)	2:4
BRAUNKOPFPRINIE	HÈTÓU JIĀOYÍNG 褐头鵙莺
Prinia inornata Sykes (von man-chen Autoren als Rassengruppe der → RAHMBRUSTPRINIE, Prinia subflava (Gmelin), angesehen	2:302
BRAUNKOPFYUHINA	LÌTÓU FÈNGMÉI 栗头凤鹛
Yuhina brunneiceps Ogilvie-Grant	2:236
BRAUNLIEST	BÁIXIÖNG FĚICUÌ 白胸翡翠
Halcyon smyrnensis (Linnaeus)	1:213
BRAUNOHRAMMER → GRAUKOPFAMMER	
BRAUNRÜCKEN-BERGDROSSEL	GUĀNGBÈI SHĀNDŌNG 光背山鶲
Zoothera mollissima (Blyth)	2:166
BRAUNRÜCKEN-KURZFLÜGEL	LÌBÈI DUĀNCHÌDŌNG 栗背短翅鶲
Brachypteryx stellata Gould	2:121
BRAUNSCHNÄPPER	HUĪ WĒNG 灰翁, auch → BĒI HUĪ
Muscicapa latirostris Raffles	WĒNG 北灰翁 sowie → KUÒZUÍ WĒNG 阔嘴翁; die beiden letzteren Namen gelten eigentlich für Muscicapa davurica Pallas, die heute

BRAUNSCHWANZ-SEEADLER	aber als Rasse des Braunschnäppers angesehen wird.
Ichthyophaga humilis (Müller)	2:323; 3:204
BRAUNSCHWANZ-TEPHRODORNIS	YÚDIĀO 渔雕
Tephrodornis gularis (Raffles)	(1:58)
BRAUNSICHLER	LÍNJUÉ 林鵠
Plegadis falcinellus (Linnaeus)	2:40
BRAUNTÖLPEL (WEISSBAUCHTÖLPEL)	CĀIHUÁN 彩鹮
Sula leucogaster (Boddaert)	1:24
BREITMAUL (Sammelbezeichnung) → LANGSCHWANZ-, SILBERBRUST-BREITMAUL	HÈ JIĀNNIÃO 褐颈噪鸟 1:9
BREITRACHEN → EURYLAIMIDAE	KUÒZUÍNIÃO 阔嘴鸟 (Gattung Psarisomus), oder SĪGUĀNNIÃO 丝冠鸟 (Gattung Serilophus) (2:1; 2:2)
BRILLENKLEIBER	RÓNGÉ SHĪ 绒额鶲
Sitta frontalis Swainson	2:350
BRILLENLAUBSÄNGER	JĪNKUÀNG WĒNGYÍNG 金眶鹟莺
Seicercus burkii (Burton)	2:292; 3:197
BRILLEN-PAPAGEIMEISE → BRILLEN-PAPAGEISCHNABEL	
BRILLEN-PAPAGEISCHNABEL (BRILLEN-PAPAGEIMEISE)	BÁIKUÀNG YĀQUÈ 白眶鸦雀 2:189; 3:170
Paradoxornis conspicillatus (David)	
BRILLENSIBIA	LÌÉ BĀNCHÌMÉI 栗额斑翅鶲
Actinodura egertoni Gould	2:227
BRILLENVÖGEL (Familie) → ZOSTEROPIDAE	
BRILLENVOGEL (Sammelbezeichnung) → GANGES-, JAPAN-, ROTFLANKEN-Brillenvogel	XIÙYĀNNIÃO 绣眼鸟 (2:371)

BRONZEDRONGO	GÜTÓNGSÈ JUĀNWÉI 古铜色卷尾
Dicrurus aeneus Vieillot	2:78
BRONZEFRUCHTTAUBE	LÜ NÁNJIŪ 绿南鳩
Ducula aenea (Linnaeus)	1:163
BRUCHWASSERLÄUFER	LÍN YÙ 林鶲
Tringa glareola Linnaeus	1:135; 3:71
BRUSTBANDHÄHERLING	HĒILÍNG ZÀOMÉI 黑领噪鹛
Garrulax pectoralis (Gould)	2:201; 3:174
BRUSTBAND-NIMMERSATT	CÁIGUÀN 彩鹤
Ibis leucocephalus (Pennant)	1:21
BRUSTBAND-STURMVOGEL	BÁIFÙ YUÁNWÉIHUÒ 白腹园尾鹱
Pterodroma leucoptera (Gould)	1:6
BUBO	DIÀOXIÀO SHÙ 鹈鵟属
Die Gattung BUBO Duméril	1:187
BUBULCUS	NIÚBÈILÙ SHÙ 牛背鹭属
Die Gattung BUBULCUS Bonaparte	1:15
BUCANETES	→ SHĀQUÈ SHÙ 沙雀属
Die Gattung BUCANETES Cabanis	(2:399)
BUCEPHALA Baird → GLAUCIONETTA	
BUCEROS	XĪNIÀO SHÙ 犀鸟属
Die Gattung BUCEROS Linnaeus	1:219
BUCEROTIDAE	XĪNIÀO KĒ 犀鸟科
Die Familie BUCEROTIDAE (Nashornvögel)	1:218
BUCHTSCHWANZELSTER	PÁNWÉI SHÙQUÈ 盘尾树鹊
Temnurus temnurus (Temminck)	(2:99)
BÜFFELWÜRGER	NIÚTÓU BÓLÁO 牛头伯劳
Lanius bucephalus Temminck et Schlegel	2:68; 3:126
BÜLBÜL (Sammelbezeichnung) → BLASSWANGEN-, CHINESEN-, FINKEN-, (2:53)	BĒI 鹊
FORMOSA-, GELBSTEISS-, GOLDBRUST-,	

HALSBAND-, ROTOHRR-, STREIFEN-, STREIFENKEHL-, TONKIBÜLBÜL	
BÜLBÜLDROSSEL	HUÍCHÌ DÖNG 灰翅鸽
Turdus boulboul (Latham)	2:160
BÜLBÜLS (Familie) → PYCNONOTIDAE	
BULWERIA	YÀNHUÒ SHÙ 燕鹱属
Die Gattung BULWERIA Bonaparte	1:6
BULWERSTURMVOGEL	YÀNHUÒ 燕鹱
Bulweria bulwerii (Jardine et Selby)	1:6
BUNTKOPFALCIPPE	JÍNÉ QUÈMÉI 金额雀鹛
Alcippe variegaticeps Yen	2:238
BUNTMEISE	ZÁSÈ SHĀNQUÈ 杂色山雀
Parus varius Temminck et Schlegel	2:344
BUNTSPECHT	BĀN ZHUÓMÙNIÀO 斑啄木鸟, auch DÀ BĀN ZHUÓMÙNIÀO 大斑啄木鸟. - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): HUĀ BĒNDĀMÙ 花嘴打木; ZHUÓMÙGUĀN 啄木冠
Dendrocopos major (Linnaeus)	1:230; 3:103
BURGUNDERGIMPEL	JIŪHÓNG ZHŪQUÈ 酒红朱雀
Carpodacus vinaceus Verreaux	2:408; 3:225
BURHINIDAE	SHÍHÉNG KĒ 石鸻科
Die Familie BURHINIDAE (Triele)	1:146
BURMAFASAN	HĒIJÍNG CHÁNGWÉIZHÌ 黑颈长尾雉
Syrmaticus humiae (Hume)	1:106
BURMAWÜRGER	LÌBÈI BÓLÁO 栗背伯劳
Lanius colluriooides Lesson	2:67
BUSCHELSTER	DUĀNWÉI LÜQUÈ 短尾绿鹊
Cissa thalassina (Temminck)	(2:91)
BUSCHGRASMÜCKE	XIĀO BÁIHÓU YÍNG 小白喉莺
Sylvia minula Hume	2:273

BUSCHLERCHE
Mirafra javanica Horsfield

GĒBAILÍNG 歌百灵
2:5

BUSCHSÄNGER (Sammelbezeichnung)
für Vögel der Gattungen
→ BRADYPTERUS (DUĀNCHÌYÍNG SHŪ 短翅莺属),
→ CETTIA und UROSPHENA (SHÙYÍNG SHŪ 树莺属).
→ BAMBUS-, BERG-, FLECKEN-,
JAPAN-, KASCHMIR-, KURZSCHWANZ-,
OLIV-, RHODODENDRON-, ROST-, ROT-
KOPF-, TACZANOWSKI-, WEISSFUSS-
BUSCHSÄNGER sowie SEIDENSÄNGER
(2:252; 2:258)

BUSCHSPÖTTER
Hippolais caligata (Lichtenstein)
BUSCHWACHTEL (Sammelbezeichnung)
→ BOULTON-, CHINA-, FORMOSA-,
HAINAN-, NACKTKEHL-, ROTKEHL-
BUSCHWACHTEL sowie HÜGELHUHN

BUSSARD (Sammelbezeichnung)
→ ADLER-, MÄUSE-, MONGOLEN-, RAUH-
FUSSBUSSARD. Der → WESPENBUSSARD
(FĒNGYÍNG 蜂鹰) gehört nach chi-
nesischem Sprachgebrauch nicht zu
den Bussarden (KUÁNG 鹰) sondern
zu den "Greifvögeln" im weitesten
Sinne (YÍNG 鹰)

BUTASTUR
Die Gattung BUTASTUR Hodgson

BUTEO
Die Gattung BUTEO Lacépède

BUTORIDES
Die Gattung BUTORIDES Blyth

XUĒLÍYÍNG 鞍篱莺
2:271

SHĀNZHÈGŪ 山鶲鶲
(1:87)

KUÁNG 鹰
(1:49)

KUÁNGYÍNG SHŪ 鹰属
1:51

KUÁNG SHŪ 鹰属
1:49

LÜLÜ SHŪ 绿鹭属
1:13

		C
BUSCHSÄNGER (Sammelbezeichnung) für Vögel der Gattungen → BRADYPTERUS (DUĀNCHÌYÍNG SHŪ 短翅莺属), → CETTIA und UROSPHENA (SHÙYÍNG SHŪ 树莺属). → BAMBUS-, BERG-, FLECKEN-, JAPAN-, KASCHMIR-, KURZSCHWANZ-, OLIV-, RHODODENDRON-, ROST-, ROT- KOPF-, TACZANOWSKI-, WEISSFUSS- BUSCHSÄNGER sowie SEIDENSÄNGER (2:252; 2:258)	CACOMANTIS Die Gattung CACOMANTIS S. Müller	→ DŪJUĀN SHŪ 杜鹃属 (1:175)
BUSCHSPÖTTER <i>Hippolais caligata</i> (Lichtenstein) BUSCHWACHTEL (Sammelbezeichnung) → BOULTON-, CHINA-, FORMOSA-, HAINAN-, NACKTKEHL-, ROTKEHL- BUSCHWACHTEL sowie HÜGELHUHN	CALANDRELLA Die Gattung CALANDRELLA Kaup	SHĀBAILÍNG SHŪ 沙百灵属 2:5
BUSSARD (Sammelbezeichnung) → ADLER-, MÄUSE-, MONGOLEN-, RAUH- FUSSBUSSARD. Der → WESPENBUSSARD (FĒNGYÍNG 蜂鹰) gehört nach chi- nesischem Sprachgebrauch nicht zu den Bussarden (KUÁNG 鹰) sondern zu den "Greifvögeln" im weitesten Sinne (YÍNG 鹰)	CALCARIUS Die Gattung CALCARIUS Bechstein	TIĚZHÀOWŪ SHŪ 铁爪鹀属 2:448
BUTASTUR Die Gattung BUTASTUR Hodgson	CALIDRIS Die Gattung CALIDRIS Merrem	BINYŪ SHŪ 滨鹬属 1:140
BUTEO Die Gattung BUTEO Lacépède	CALLIOPE Die Gattung CALLIOPE Gould	→ GĒQÚ SHŪ 歌鸽属 (2:123)
BUTORIDES Die Gattung BUTORIDES Blyth	CALONECTRIS Die Gattung CALONECTRIS Mathews et Iredale	→ HUÒ SHŪ 鸬属, → JIĀNSHUIHUÒ SHŪ 剪水鷗属 (1:5)
	CAMPEPHAGIDAE Die Familie CAMPEPHAGIDAE (Stachel- bürzler)	SHĀNJIAONIĀO KĒ 山椒鸟科 2:40; 3:119
	CAPITONIDAE Die Familie CAPITONIDAE (Bartvögel)	XŪLIÈ KĒ 须䴕科 1:219
	CAPRIMULGIDAE Die Familie CAPRIMULGIDAE (Ziegen- melker)	YÈYÍNG KĒ 夜鹰科 1:201; 3:95
	CAPRIMULGIFORMES Die Ordnung CAPRIMULGIFORMES (Schwalmvögel)	YÈYÍNG MÙ 夜鹰目 1:201; 3:95
	CAPRIMULGUS Die Gattung CAPRIMULGUS Linnaeus	YÈYÍNG SHŪ 夜鹰属 1:201
	CARDUELIS Die Gattung CARDUELIS Brisson	→ JĪNCHÌ SHŪ 金翅属 (2:390)
	CARPODACUS Die Gattung CARPODACUS Kaup	ZHŪQUÈ SHŪ 朱雀属 2:401

CASARCA	→ MÁYĀ SHŪ 麻鸭属 (1:30)
Die Gattung CASARCA Bonaparte	
CASMERODIUS	→ BÁILÙ SHŪ 四鹭属 (1:15)
Die Gattung CASMERODIUS Gloger	
CECROPIS	→ YĀN SHŪ 燕属 (2:20)
Die Gattung CECROPIS Boie	
CENTROPUS	YĀJUĀN SHŪ 鸭鹃属 1:183
Die Gattung CENTROPUS Illiger	
CEPHALOPYRUS	HUŌGUĀNQUÈ SHŪ 火冠雀属 2:359
Die Gattung CEPHALOPYRUS Bonaparte	
CERORHINCA	JIĀOZUÍHÁIQUÈ SHŪ 角嘴海雀属 1:159
Die Gattung CERORHINCA Bonaparte	
CERTHIA	XUÁNMÙQUÈ SHŪ 旋木雀属 2:355
Die Gattung CERTHIA Linnaeus	
CERTHIIDAE	XUÁNMÙQUÈ KĒ 旋木雀科 2:355; 3:217
Die Familie CERTHIIDAE (Baumläufer)	
CERYLE	YÚGŌU SHŪ 鱼狗属 1:209
Die Gattung CERYLE Boie	
CETTIA	→ SHÙYÍNG SHŪ 树莺属 (2:252)
Die Gattung CETTIA Bonaparte	
CEYX	SĀNZHÍCUÌNIÀO SHŪ 三趾翠鸟属 1:212
Die Gattung CEYX Lacépède	
CHAIMARRONIS	XÍQÚ SHŪ 溪鸲属 2:139
Die Gattung CHAIMARRONIS Hodgson (s. auch RHYACORNIS Blanford)	
CHALCOPHAPS	JÍNJIŪ SHŪ 金鸠属 1:172
Die Gattung CHALCOPHAPS Gould	
CHARADRIIDAE	HÉNG KĒ 鹬科 1:123; 3:67
Die Familie CHARADRIIDAE (Regenpfeifer)	

CHARADRIIFORMES	HÉNG-XÍNG MÙ 鹬形目 . Synonym
Die Ordnung CHARADRIIFORMES (Watvögel)	→ YÙ-XÍNG MÙ 鹳形目 1:122
CHARADRIUS	→ HÉNG SHŪ 鹬属 (1:125)
Die Gattung CHARADRIUS Linnaeus	
CHELIDORYNX	→ SHÀNWĒIWĒNG SHŪ 扇尾鹟属 (2:329)
Die Gattung CHELIDORYNX Hodgson	
CHINABUSCHWACHTEL	SHĀNZHÈGŪ 山鹧鸪 1:89
Arborophila gingica (Gmelin)	
CHINANACHTIGALL → SONNEVOGEL	
CHINAROHRSAINGER	DÀ WĒIYÍNG 大苇莺 . Dieser Name bezeichnet auch den → DROSSELROHR-SÄNGER, Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus). - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): DÀ WĒI-ZHĀ 大苇莺 (2:266; 3:189)
Acrocephalus orientalis (Temminck et Schlegel)	
CHINASITTICH	DÀ FĒIXIÖNG YÍNGWŪ 大绯胸鹦鹉 1:173
Psittacula derbiana (Fraser)	
CHINESEN BüLBÜL	BÁITÓU BĒI 白头鵙 2:56; 3:122
Pycnonotus sinensis (Gmelin)	
CHINESENDOMMEL	HUÁNGBĀN WĒIYÁN 黄斑苇鳽 . - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): XIÁO SHUǐLUÒTUǑ 小水骆驼 1:19; 3:35
Ixobrychus sinensis (Gmelin)	
CHINESENGRÜNLING	JÍNCHÌ 金翅 , auch JÍNCHÌQUÈ 金翅雀 . - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): HUÁNGDÒUQUÈ 黄豆雀 (2:390; 3:224)
Chloris sinica (Linnaeus)	
CHINESENKLEIBER	HĒITÓU SHĪ 黑头鵙 2:351; 3:215
Sitta villosa Verreaux	

CHINESENSCHIKRA	CHÌFÙ YÍNG 赤腹鹰 . - Volkstüm-
Accipiter soloensis (Horsfield)	liche Bezeichnung (in S-Shensi):
	YÀOZI 鹊子
	1:46; 3:46
CHINESISCHE SPOTTDROSSEL → AUGEN-BRAUENHÄHERLING	
CHLAMYDOTIS	→ BÁO SHŪ 鹩属
Die Gattung CHLAMYDOTIS Lesson	(1:120)
CHLIDONIAS	FÚÓU SHŪ 浮鸥属
Die Gattung CHLIDONIAS Rafinesque	1:152
CHLORIS	→ JÍNCHÌ SHŪ 金翅属
Die Gattung CHLORIS Cuvier	(2:390)
CHLOROPSEIDAE	→ HÉPÍNGNIÀO KĒ 和平鸟科
Die Familie CHLOROPSEIDAE (Blattvögel)	(2:61)
CHLOROPSIS	YÈBĒI SHŪ 叶鹎属
Die Gattung CHLOROPSIS Jardine et Selby	2:62
CHYSOCOCCYX	JÍNJUĀN SHŪ 金鹃属
Die Gattung CHYSOCOCCYX Boie	(1:181)
CHYSOCOLAPTES	JÍNBÈIZHUÓMÙ SHŪ 金背啄木属
Die Gattung CHYSOCOLAPTES Blyth	1:240
CHYSOLOPHUS	JÍNJÍ SHŪ 锦鸡属
Die Gattung CHYSOLOPHUS J.E. Gray	1:107
CHYSOMMA	MÉIQUÈ SHŪ 鹌雀属
Die Gattung CHYSOMMA Blyth	2:185
CHUKARHUHN	SHÍJÍ 石鸡 . - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): GĀGĀJÍ 夏嘎鸡; GUĀGUĀJÍ 呃哈鸡; HÓNG-TUÍJÍ 红腿鸡; SHĀNJÍ 山鸡; YÁN-JÍ 岩鸡
Alectoris chukar (J.E. Gray)	(1:80; 3:53)

CICONIA	GUÀN SHŪ 鹳属
Die Gattung CICONIA Brisson	1:21
CICONIIDAE	GUÀN KĒ 鹳科
Die Familie CICONIIDAE (Störche)	1:21; 3:36
CICONIIFORMES	GUÀN-XÍNG MÙ 鹳形目
Die Ordnung CICONIIFORMES (Schreitvögel)	1:12; 3:30
CINCLIDAE	HÉWŪ KĒ 河鸟科
Die Familie CINCLIDAE (Wassermäseln)	2:110; 3:141
CINCLIDIUM	DÌQÚ SHŪ 地鸽属
Die Gattung CINCLIDIUM Blyth	(2:141)
CINCLUS	HÉWŪ SHŪ 河鸟属
Die Gattung CINCLUS Borkhausen	2:110
CIRCAETUS	DUÁNZHÍDÀO SHŪ 短趾雕属
Die Gattung CIRCAETUS Vieillot	1:62
CIRCUS	YÀO SHŪ 鹫属
Die Gattung CIRCUS Lacépède	1:60
CISSA	→ LÜQUÈ SHŪ 绿鹊属
Die Gattung CISSA Boie	(2:91)
CISTENSÄNGER (1)	ZÖNG SHÀNWÉIYÍNG 棕扇尾莺
Cisticola juncidis (Rafinesque)	2:299; 3:198
CISTENSÄNGER (2) (Sammelbezeichnung)	SHÀNWÉIYÍNG 扇尾莺
→ CISTENSÄNGER (1), → GOLDKOPF-CISTENSÄNGER	(2:299)
CISTICOLA	SHÀNWÉIYÍNG SHŪ 扇尾莺属
Die Gattung CISTICOLA Kaup	2:299
CLAMATOR	FÈNGTÓUJUĀN SHŪ 凤头鹃属
Die Gattung CLAMATOR Kaup	1:175
CLANGULA	CHÁNGWÉIYĀ SHŪ 长尾鸭属
Die Gattung CLANGULA Leach	1:38

COCCOTHRAUSTES	XÍZUÍ SHŪ 锡嘴属
Die Gattung COCCOTHRAUSTES Brisson	2:426
COCHOA	KUĀNZUÍDÖNG SHŪ 宽嘴鹤属
Die Gattung COCHOA Hodgson	2:145
COLLOCALIA	JÍNSÍYÁN SHŪ 金丝燕属
Die Gattung COLLOCALIA G.R. Gray	1:203
COLUMBA	GĒ SHŪ 鸽属
Die Gattung COLUMBA Linnaeus	1:164
COLUMBIDAE	JIŪGĒ KĒ 鸽鸽科
Die Familie COLUMBIDAE (Tauben)	1:161; 3:78
COLUMBIFORMES	GĒ-XÍNG MÙ 鸽形目
Die Ordnung COLUMBIFORMES (Tau- benvögel)	1:161; 3:78
CONOSTOMA	HÓNGZUÍYÁQUÈ SHŪ 红嘴鸦雀属
Die Gattung CONOSTOMA Hodgson	2:187
COPSYCHUS	QUÈQÚ SHŪ 雀鶲属
Die Gattung COPSYCHUS Wagler	2:133
CORACIA (Gattung) → PYRRHOCORAX	
CORACIAS	FÓFĀSÈNG SHŪ 佛法僧属
Die Gattung CORACIAS Linnaeus	1:216
CORACIIDAE	FÓFĀSÈNG KĒ 佛法僧科
Die Familie CORACIIDAE (Racken)	1:216; 3:99
CORACIIFORMES	FÓFĀSÈNG MÙ 佛法僧目
Die Ordnung CORACIIFORMES (Racken- vögel)	1:209; 3:97
CORACINA	JUĀNJUÉ SHŪ 鹊鶲属
Die Gattung CORACINA Vieillot	2:41
CORVIDAE	YĀ KĒ 鸦科
Die Familie CORVIDAE (Rabenvögel)	2:88; 3:133
CORVUS	YĀ SHŪ 鸦属
Die Gattung CORVUS Linnaeus	2:104

COTURNICOPS	HUĀYĀNGJĪ SHŪ 花秧鸡属
Die Gattung COTURNICOPS G.R. Gray	1:117
COTURNIX	CHÚN SHŪ 鸡属
Die Gattung COTURNIX Bonnaterre	1:86
CREX	CHÁNGJIÀOYĀNGJĪ SHŪ 长脚秧鸡属
Die Gattung CREX Bechstein	1:115
CRINIGER	GUĀNBĒI SHŪ 冠鹤属
Die Gattung CRINIGER Temminck	2:48
CROCETHIA	SĀNZHÍYÙ SHŪ 三趾鹤属
Die Gattung CROCETHIA Billberg (eine von manchen Autoren als Gat- tung angesehene Untergattung der Gattung CALIDRIS Merrem)	1:142
CROSSOPTILON	MĀJĪ SHŪ 马鸡属
Die Gattung CROSSOPTILON Hodgson	1:95
CRYPSIRINA	→ SHÙQUÈ SHŪ 树鹊属
→ DENDROCITTA, → TEMNURUS	(2:97)
CRYPTOCICHLA	→ DÌDÖNG SHŪ 地鶲属
Die Gattung CRYPTOCICHLA H.E. Wolters	(2:156)
CUCULIDAE	DÙJUĀN KĒ 杜鹃科
Die Familie CUCULIDAE (Kuckucke)	1:175; 3:84
CUCULIFORMES	JUĀN-XÍNG MÙ 鹃形目
Die Ordnung CUCULIFORMES (Kuckucks- vögel)	1:175; 3:84
CUCULUS	→ DÙJUĀN SHŪ 杜鹃属
Die Gattung CUCULUS Linnaeus	(1:175)
CULICICAPAA	FĀNGWĒIWĒNG SHŪ 方尾鹟属
Die Gattung CULICICAPAA Swinhoe	2:326
CUTIA (1)	JIMÉI SHŪ 姬鹟属
Die Gattung CUTIA Hodgson	2:223

CUTIA (2)	BĀNXIÉ JĪMÉI 斑胸姬鹟
Cutia nipalensis Hodgson	2:223
CYANOPICA	HUÍXÍQUÈ SHŪ 灰喜鹊属
Die Gattung CYANOPICA Bonaparte	2:94
CYANOPTILA	→ JĪWĒNG SHŪ 姬鹟属
Die Gattung CYANOPTILA Blyth	(2:307)
CYANOSYLVIA	→ GĒQÚ SHŪ 歌鹟属
Die Gattung CYANOSYLVIA C.L. Brehm	(2:123)
CYGNUS	TIĀNÉ SHŪ 天鹅属, auch HÚ SHŪ 鸿属
Die Gattung CYGNUS Bechstein	1:28
CYORNIS	→ XIĀNWĒNG SHŪ 仙鹟属
Die Gattung CYORNIS Blyth	(2:315)
CYPSIURUS	ZŌNGYŪYÀN SHŪ 棕雨燕属
Die Gattung CYPSIURUS Lesson	1:207
D	
DAJAL	QUÈQÚ 鹊鹟
Copsychus saularis (Linnaeus)	2:133
DAMADROSSEL	CHÉNGTÓU DÌDÖNG 橙头地鸫
Geokichla citrina (Latham)	2:157
DAVIDHÄHERLING	SHĀN ZÀOMÉI 山噪鹛. - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): HĒI LÀOPÓ 黑老婆
Garrulax davidi (Swinhoe)	2:206; 3:175
DAVIDLAUBSÄNGER	ZŌNGMÉI LIҮYĪNG 棕眉柳莺. - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): LIÜCHUÀN'R 柳串儿
Phylloscopus armandii (Milne-Edwards)	2:277; 3:191
DAVIDMEISE	HÓNGFÙ SHĀNQUÈ 红腹山雀
Parus davidi (Berezovski et Bianchi)	2:343; 3:212

DAVIDNACHTIGALL	JÍNXIÖNG GĒQÚ 金胸歌鹟
Larvivora pectardens (David et Oustalet)	(2:129; 3:147)
DAVIDNILTAVA	DÀWÈI XIĀNWĒNG 大卫仙鹟
Niltava davidi La Touche	2:316
DAVID-SCHNEEFINK (ERDSPERLING)	HĒIHÓU XUĚQUÈ 黑喉雪雀
Montifringilla davidiana (Verreaux)	2:383
DELICHON	MÁOJIĀOYÀN SHŪ 毛脚燕属
Die Gattung DELICHON Horsfield et Moore	2:24
DENDROCITTA	→ SHÙQUÈ SHŪ 树鶲属
Die Gattung DENDROCITTA Gould	(2:97)
DENDROCOPOS	→ ZHUÓMÙ SHŪ 啄木属
Die Gattung DENDROCOPOS Koch	(1:230)
DENDROCYGNA	SHÙYÀ SHŪ 树鸭属
Die Gattung DENDROCYGNA Swainson	1:29
DENDRONANTHUS	SHĀNJÍLÍNG SHŪ 山鹡鸰属
Die Untergattung DENDRONANTHUS Blyth der Gattung MOTACILLA Linnaeus	(2:33)
DENDRONESSA	YUĀNYĀNG SHŪ 鸳鸯属
Die Gattung DENDRONESSA Swainson (von manchen Autoren mit der Gattung AIX Boie vereinigt)	(1:36)
DIADEMYUHINA	BÁILÍNG FÈNGMÉI 白领凤鹛. - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): FÈNGTÓUMÉI 凤头鹛
Yuhina diademata Verreaux	2:234; 3:180
DIAMANTFASAN	BÁIFÙ JÍNJĪ 白腹锦鸡
Chrysolophus amherstiae (Leadbeater)	1:107
DICAEIDAE	ZHUÓHUĀNIÀO KĒ 啄花鸟科
Die Familie DICAEIDAE (Mistelfresser oder Blütenpicker)	2:360; 3:218

DICAEUM
Die Gattung Dicæum Cuvier

DICKSCHNABELKITTA
Urocissa caerulea Gould

DICKSCHNABELKRÄHE
Corvus macrorhynchos Wagler

DICKSCHNABELSÄNGER
Phragmaticola aedon (Pallas)

DICRURIDAE
Die Familie DICRURIDAE (Drongos)

DICRURUS
Die Gattung DICRURUS Vieillot

DINOPIUM
Die Gattung DINOPIUM Rafinesque

DIOMEDEA
Die Gattung DIOMEDEA Linnaeus

DIOMEDEIDAE
Die Familie DIOMEDEIDAE (Albatrosses)

DISTELFINK → STIEGLITZ

DOHLE
Corvus monedula Linnaeus, s. auch
→ ELSTERDOHLE

DOLLARVOGEL
Eurystomus orientalis Linnaeus

ZHUÓHUĀNIÀO SHÙ 喙花鸟属
2:360

TÁIWĀN ÀN LÁNQUÈ 台湾暗蓝鹊
(2:94)

DÀZUĪ WŪ YĀ 大嘴乌鸦. - Volks-tümliche Bezeichnung (in S-Shensi):
WŪ YĀ 乌鸦, LÀOGUÀ 老鸹
2:106; 3:139

LÚYÍNG 芦莺
2:270

JUĀNWĒI KĒ 卷尾科
2:75; 3:128

JUĀNWĒI SHÙ 卷尾属
2:75

JÍNBĒI-SĀNZHĪ-ZHUÓMÙ SHÙ 金背三趾啄木属
1:228

XÌNTIĀNWĒNG SHÙ 信天翁属
1:4

XÌNTIĀNWĒNG KĒ 信天翁科
1:4

HÁN YĀ 寒鸦. Dieser Name gilt auch für die → ELSTERDOHLE, Corvus dau-uricus Pallas. - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): XIĀO SHĀN-LÀOGUÀ 小山老鸹
(2:105; 3:138)

SĀNBĀONIÀO 三宝鸟. - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): TIĒLÍNJIA 铁鳞甲; YÍNGGĒ 翠鸽
1:217; 3:99

DOMMEL (Sammelbezeichnung)
→ HĒIYÁN (Dommeln der Gattung Du-petor)
→ MÁYÁN (Dommeln der Gattung Bo-taurus)
→ WĒIYÁN (Dommeln der Gattung Ixo-brychus)

DOPPELHORNVOGEL
Buceros bicornis Linnaeus

DORNGRASMÜCKE
Sylvia communis Latham

DORNLAUBSÄNGER
Phylloscopus subaffinis Ogilvie-Grant

DREIFARBENSCHNÄPPER
Ficedula tricolor (Hodgson)

DREIFARBENWEIH
Aviceda leuphotes (Dumont)

DREIZEHENMÖWE
Larus tridactylus Linnaeus

DREIZEHEN-PAPAGEIMEISE → DREI-ZEHEN-PAPAGEISCHNABEL

DREIZEHEN-PAPAGEISCHNABEL (DREI-ZEHEN-PAPAGEIMEISE)
Paradoxornis paradoxus (Verreaux)

DREIZEHENSPECHT
Picoides tridactylus (Linnaeus)

DRONGO (Sammelbezeichnung)
→ BRONZE-, FLAGGEN-, GRAU-, KÖ-NIGS-, KRÄHENSCHNABEL-, SEIDEN-, SPATELSCHWANZDRONGO

DRONGOKUCKUCK
Surniculus lugubris (Horsfield)

YÁN 鸽
(1:19)

XĪNIÀO 雉鸟
1:219

HUĪ YÍNG 灰莺
2:272

ZÖNGFÙ LIŪYÍNG 棕腹柳莺. - Volks-tümliche Bezeichnung (in S-Shensi):
LIŪCHUÀN'R 柳串儿
2:275; 3:190

HUĪLÁN WĒNG 灰蓝鹟
2:313; 3:277

FÈNGTÓU JUĀNSŪN 凤头鹃隼
1:42

SĀNZHĪOU 三趾鸥
1:151

SĀNZHĪ YĀQUÈ 三趾鸦雀
2:188; 3:169

SĀNZHĪZHUÓMÙNIÀO 三趾啄木鸟
1:239

JUĀNWĒI 卷尾; lediglich der Flaggen- und der Spatelschwanzdrongo werden als PÁNWĒI 盘尾 bezeichnet
2:80

WŪJUĀN 乌鹃
1:181

DRONGOS (Familie) → DICRURIDAE	
DROSSEL (Sammelbezeichnung)	DÖNG 鸫
→ BECHSTEIN (ROTKEHL- u. SCHWARZ- KEHL-), BRAUNKOPF-, BÜLBÜL-, DAMA-, FAHL-, GRAURÜCKEN-, KASTANIEN-, MISTEL-, MUPIN-, NAUMANN-, RHODODENDRON-, ROTKROPP-, SCHEKEN-, SCHIEFER (=SIBIRISCHE)-, SÜDSEE-, SCHWARZBRUST-, WACHHOLDER-, WEISSBRAUENDROSSEL, ferner AMSEL u. WEISSHALSAMSEL	(2:158)
→ BERGDROSSEL (Gattung ZOOTHERA), einschl. ERD (=GOLD-)DROSSEL und LANGSCHNABELDROSSEL, 4 Arten	
→ MERLEN (Gattung MONTICOLA), 4 Arten	
→ PFEIFDROSSEL (Gattung MYOPHONUS), 2 Arten	
DROSSELMEISEN (Familie) → TIMALIEN,	
→ TIMALIIDAE	
DROSSELROHRSÄNGER	DÀ WĒIYÍNG 大苇鳽 . - Dieser Name bezeichnet auch den → CHINA-ROHRSÄNGER, <i>Acrocephalus orientalis</i> (Temminck et Schlegel). - Volks-tümliche Bezeichnung (in S-Shensi): DÀ WĒIZHĀ 大苇鳽
<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus)	(2:266; 3:189)
DRYOCOPUS	HĒIZHŪMÙ SHŪ 黑啄木屬
Die Gattung DRYOCOPUS Boie	1:228
DSCHUNGELFISCHER	SĀNZHĪCUIINIĀO 三趾翠鳥
<i>Ceyx erithacus</i> (Linnaeus)	1:212
DSCHUNGELMAINA	LÍN BĀGĒ 林八哥
<i>Acridotheres grandis</i> Moore	(2:86)
DSCHUNGELESCHNÄPPER (Sammelbezeichnung)	LÍNWĒNG 林鶲
→ OLIVRÜCKEN-, WEISSKEHL-DSCHUNGELESCHNÄPPER	(2:306)

DUCULA	NÁNJIŪ SHŪ 南鳩屬
Die Gattung DUCULA Hodgson	1:163
DÜNNSCHNABELGIMPEL	ĀNSE ZHŪQUÈ 暗色朱雀
<i>Carpodacus nipalensis</i> (Hodgson)	2:404
DUNKELLAUBSÄNGER	HÈ LIŪYÍNG 褐柳鳶 . - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): LIŪCHUÀN'R 柳串儿
<i>Phylloscopus fuscatus</i> (Blyth)	2:276; 3:191
DUNKELSTURMTAUCHER	HUĪ HUÒ 灰鴟
<i>Puffinus griseus</i> (Gmelin)	1:6
DUNKLER WASSERLÄUFER	HÈ YÙ 鶴鶲, auch HÓNGJIĀO HÈ YÙ 红脚鶴鶲
<i>Tringa erythropus</i> (Pallas)	1:133
DUPETOR	HĒIYÁN SHŪ 黑鳩屬
Die Gattung DUPETOR Heine et Reichenow. (Besser als Untergattung der Gattung IXOBRYCHUS Billberg anzusehen).	1:20
EDWARDSGIMPEL	ZŌNG ZHŪQUÈ 棕朱雀
<i>Carpodacus edwardsii</i> Verreaux	2:407
EGRETTA	→ BÁILÙ SHŪ 白鹭屬
Die Gattung EGRETTA T. Forster	(1:15)
EICHELHÄHER	SŌNGYĀ 松鶲
<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus)	2:89; 3:133
EIGENTLICHE EULEN (Familie)	
→ STRIGIDAE	
EILSEESCHWALBE	DÀ FèNGTÓUYÀN'ŌU 大凤头燕鸥
<i>Thalasseus bergii</i> (Lichtenstein)	1:157
EINFARB-PAPAGEIMEISE → EINFARB-PAPAGEISCHNABEL	

E

EINFARB-PAPAGEISCHNABEL (EINFARB-PAPAGEIMEISE)	HÈ YĀQUÈ 褐鸦雀
Paradoxornis unicolor (Hodgson)	2:188
EINÖDGIMPEL	SHĀSÈ ZHŪQUÈ 沙色朱雀
Carpodacus synoicus (Temminck)	2:405
EIORA (Sammelbezeichnung) → LANGSCHNABEL-, SCHWARZFLÜGEL-EIORA	QUÈBĒI 雀鶲 (2:61)
EIORAS (Familie) → AEGITHINIDAE	
EISENTE	CHÁNGWÉIYÀ 长尾鸭属
Clangula hyemalis (Linnaeus)	1:39
EISMÖWE	DÀNHUĪ ŌU 淡灰鸥
Larus hyperboreus Gunnerus	1:149
EISSTURMVOGEL	GUĀNBÍHUÒ 管鼻鹱
Fulmarus glacialis (Linnaeus)	1:5
EISVÖGEL (Familie) → ALCEDINIDAE → EISVOGEL, → FISCHER, → LEST	
EISVOGEL (1)	CUÌNIÀO 翠鸟, auch PŪTŌNG CUÌNIÀO 普通翠鸟. - Volkstümliche Be- zeichnung (in S-Shensi): CUIQIÀO'R 翠雀儿; SHUÍQUÈ 水雀 1:211; 3:98
EISVOGEL (2) (Sammelbezeichnung) → EISVOGEL (1) → HERKULESEISVOGEL	CUÌNIÀO 翠鸟 (für die eigentlichen Eisvögel, Gattung → ALCEDO); FĒICUĪ 翡翠 (für die → LESTE, Gattung → HALCYON); YÚGŌU 鱼狗 (für die → FISCHER, Gattung → CERYLE)
ELANUS	HĒICHÍYUĀN SHŪ 黑翅鸢属
Die Gattung ELANUS Savigny	1:41
ELLIOTFASAN	BÁIJÍNG CHÁNGWÉIZHÌ 白颈长尾雉
Syrmaticus ellioti (Swinhoe)	1:107
ELLIOTHÄHERLING	YÍSHÌ ZÀOMÉI 伊氏噪鹛, auch CHÉNGCHÌ ZÀOMÉI 橙翅噪鹛 2:215; 3:178

ELSTER (1)	XÍQUÈ 喜鹊. - Volkstümliche Be- zeichnung (in S-Shensi): KÈQUÈ 客 鹤, YĀQUÈ 鸦鹊
Pica pica (Linnaeus)	2:96; 3:136
ELSTER (2) (Sammelbezeichnung) → BLAU-, BUCHTSCHWANZ-, BUSCH-, ELSTER (1), GRAUBRUST-, JAGD-, MASKENBAUMELSTER → KITTA (4 Arten)	QUÈ 鹊. Durch diesem Wort vorge- setzte Silben werden die einzel- nen Arten unterschieden. Die be- kannteste und volkstümlichste ist die auch in Europa häufigste (schwarzweiße) → ELSTER, Pica pica Linnaeus, chin. XÍQUÈ 喜鹊 (2:95)
ELSTERDOHLE	HÁN YĀ 寒鴉. Dieser Name gilt auch für die → DOHLE, Corvus mone- dula Linnaeus. - Volkstümliche Be- zeichnung (in S-Shensi): XIĀO SHĀN- LĀOGUÀ 小山老鴉 (2:105; 3:138)
Corvus dauuricus Pallas, s. auch → DOHLE	
ELSTERRAUPENSCHMÄTZER	HÈBÈI QUÈJUÉ 褐背鹊鵠 2:43
Hemipus picatus (Sykes)	
ELSTERSCHNÄPPER	XIĀO BĀN WĒNG 小斑翁 2:312
Ficedula westermanni (Sharpe)	
ELSTERSTAR	BĀN LIÁNGNIÀO 斑椋鸟 2:84)
Sturnopastor contra (Linnaeus)	
ELSTERWEIHE	QUÈ YÀO 鹊鹞 1:61
Circus melanoleucos (Pennant)	
ELSTER-ZWERGFALKE	XIĀOSŪN 小隼 1:65
Microhierax melanoleucus (Blyth)	
EMBERIZA	→ WŪ SHŪ 鹟属 (2:429)
Die Gattung EMBERIZA Linnaeus	
EMBERIZIDAE	→ QUÈ KĒ 雀科 (2:388; 3:222)
Die Familie EMBERIZIDAE (Ammern)	
ENICURUS	YĀNWĒI SHŪ 燕尾属 2:143
Die Gattung ENICURUS Temminck	

ENTE (Sammelbezeichnung)
 → BAER-, BERG-, EIS-, FLECKSCHNA-
 BEL-, GLANZ-, GLUCK-, HÖCKER-SCHNA-
 BEL-, KNÄK-, KOLBEN-, KRAGEN-,
 KRICK-, LÖFFEL-, MANDARIN-, MOOR-,
 PFEIF-, SCHECK-, SCHELL-, SCHNAT-
 TER-, SICHEL-, SPIESS-, STOCK-,
 REIHER-, TAFEL-, TRAUERENTE

ENTENARTIGE (Familie) → ANATIDAE

ENTENVÖGEL (Ordnung) → ANSERI-
 FORMES

EOPHONA
 Die Gattung EOPHONA Gould

ERDDROSSEL (GOLDDROSSEL)
 Zoothera dauma (Latham)

ERDEULE
 Tyto longimembris (Jerdon)

ERDSPERLING → DAVID-SCHNEEFINK

EREMIALECTOR
 Die Gattung EREMIALECTOR W.L.
 Slater [Anmerkung: Die Gattung
 PTEROCLES Temminck, zu der das
 SANDFLUGHUHN rechnet, ist auf
 das mediterrane SPIESSFLUGHUHN,
 Pterocles alchata (Gmelin) zu be-
 schränken. Vgl. H.E. Wolters,
 Bonner Zool. Beiträge, 25 (1974),
 S. 286-289]

EREMOPHILA
 Die Gattung EREMOPHILA Boie

YĀ 鸭, YĀZǐ 鸭子

LÀZUÍ SHŪ 虹嘴属
 2:423

HŪBĀN DÌDÖNG 虎斑地鶲 (neuerer Name, so in 3:160), auch HŪBĀN SHĀNDÖNG 虎斑山鶲 (älterer Name, so in 2:167). - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): DÙNJI 顿鸡
 2:167; 3:160

Cǎoxiāo 草鸮
 1:184

SHĀJÍ SHŪ 沙鸡属
 (1:161)

JIĀOBĀILÍNG SHŪ 角百灵属
 2:11

ERLENZEISIG → ZEISIG

ESACUS

Die Gattung ESACUS Lesson (eine von manchen Autoren als Gattung angesehene Untergattung der Gattung BURHINUS Illiger)

ESTRILDIDAE

Die Familie ESTRILDIDAE (Prachtfinken)

EUDROMIAS

Die Gattung EUDROMIAS Brehm

EUDYNAMYS

Die Gattung EUDYNAMYS Vigors et Horsfield

EULE (Sammelbezeichnung)

→ ERD-, FUCHS-, HALSBAND-, SCHLEIER-, SCHNEE-, SPERBER-, STREIFEN-OHR-, SUNIA-, ZWERGOHREULE; s. ferner → FISCHUHU (3 Arten), → KAUZ (11 Arten), → UHU (2 Arten)

EULEN (1) (Familie) → EIGENTLICHE EULEN, → STRIGIDAE

EULEN (2) (Ordnung) → STRIGIFORMES

EUMYIAS

Die Gattung EUMYIAS Cabanis

EUPODA

Die Gattung EUPODA Brandt

EUROSTOPODUS

Die Gattung EUROSTOPODUS Gould

EURYLAIMIDAE

Die Familie EURYLAIMIDAE (Breitrachen)

SHÍHÉNG SHŪ 石鶴属

1:146

→ WÉNNIÃO KĒ 文鸟科

(2:373; 3:221)

→ HÉNG SHŪ 鸽属

(1:125)

ZÀOJUĀN SHŪ 噪鹛属

1:182

XIĀO 鸱 (schriftsprachlich); MĀO-TÓUYÍNG 猫头鹰, oder YĚMĀOZǐ 夜猫子 (volkstümliche Umgangssprache)

→ WĒNG SHŪ 鸮属

(2:321)

→ HÉNG SHŪ 鸽属

(1:125)

JIĀOYÈYÍNG SHŪ 角夜鹰属

1:201

KUÒZUĬNIÃO KĒ 阔嘴鸟科

2:1

EURYNORHYNCHUS
Die Gattung EURYNORHYNCHUS Nilsson
(eine von manchen Autoren als Gattung angesehene Untergattung der Gattung CALIDRIS Merrem)

EURYSTOMUS
Die Gattung EURYSTOMUS Vieillot

SHÁOZUÍYÙ SHŪ 勺嘴鹬属
1:142

SĀNBÀONIÀO SHŪ 三宝鸟属
1:216

F

FAHLBAUCH-FRUCHTTAUBE
Ducula badia (Raffles)

FAHLBRAUNELLE
Prunella fulvescens (Severtzov)

FAHLDROSSEL
Turdus pallidus Gmelin

HUÍTÓU NÁNJIŪ 灰头南鳩
1:164

HÈ YÁNLÌU 褐岩鶲
2:118

BÁIFÙ DÖNG 白腹鶲. Dieser Name gilt auch für die → ROTKOPFDROSSEL, *Turdus chrysolaus* Temminck und die → WEISSBRAUNDROSSEL, *Turdus obscurus* Gmelin
(2:163; 3:162)

LIÁNCHÌJĪ SHŪ 镰翅鳩属
1:74

SŪN SHŪ 隼属

SŪN KĒ 隼科

SŪN-XÍNG MÙ 隼形目, auch YÍNG-XÍNG MÙ 鹰形目
1:41; 3:45

SŪN 隼
(1:65)

FALCIPENNIS
Die Gattung FALCIPENNIS Elliot

FALCO
Die Gattung FALCO Linnaeus

FALCONIDAE
Die Familie FALCONIDAE (Falken)

FALCONIFORMES
Die Ordnung FALCONIFORMES (Greifvögel)

FALKE (Sammelbezeichnung)
→ BAUM-, ELSTER-ZWERG-, GER-, MALAIENBAUM-, MERLIN, RÖTEL-, ROTFUSS-, SAKER(WÜRG)-, TURM-, WANDER-, WÜSTENFALKE

FALKEN (Familie) → FALCONIDAE

FALKENKAUZ
Ninox scutulata (Raffles)

FASAN (1) → JAGDFASAN

FASAN (2) (Sammelbezeichnung)
→ BLUT-, BURMA-, DIAMANT-, ELLIOT-, GLANZ-(3 Arten), GOLD-, JAGD-, KÖNIGS-, KOKLAS-, MIKADO-, OHR-(3 Arten), PFAU-, SCHWARZBRUST-, SILBER-, SWINHOEFASAN. → TRAGOPAN (4 Arten)

FASANENARTIGE (Familie) → PHASIANIDAE

FEENNILTAVA
Niltava macgrigoriae (Burton)

FEENSEESCHWALBE
Gygis alba (Sparrmann)

FEENVÖGEL (Familie) → IRENIDAE

FEENVOGEL → IRENE

FELDLERCHE
Alauda arvensis Linnaeus

FELDROHRSÄNGER
Acrocephalus agricola (Jerdon)

FELDROTSCHWANZ
Phoenicurus hodgsoni (Moore)

FELDSCHWIRL
Locustella naevia (Boddaert)

YÍNGXIĀO 鹰鶲
1:194; 3:93

ZHÌ 雉 (Schriftsprache). YĚJÍ 野鸡
(Volkstümliche Umgangssprache)

XIĀO XIĀNWĒNG 小仙翁
2:316

BÁIYÀN'ŌU 白燕鸥
1:158

YÚNQUÈ 云雀. - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): ĀLÁN 阿兰
2:14; 3:107

DÀOTIÁN WÉIYÍNG 稻田苇莺. Dieser Name bezeichnet auch den → STRAUCHROHRSÄNGER, *Acrocephalus concinens* (Swinhoe)
(2:268; 3:189)

HĒIHÓU HÓNGWÉIQÚ 黑喉红尾鸲
2:136; 3:150

HĒIBĀN HUÁNGYÍNG 黑斑蝗莺
2:265

FELDSPERLING	MÁQUÈ 麻雀, auch SHÙ MÁQUÈ 树麻雀	FICHTENAMMER	BÁITÓU WŪ 三头 鸦
Passer montanus (Linnaeus)		Emberiza leucocephalos S.G. Gmelin	2:430; 3:231
→ Die Ausführungen unter → MÁQUÈ (2)	2:375; 3:221	FICHTENKREUZSCHNABEL	HÓNG JIĀOZUǐQUÈ 红交嘴雀
FELSENAMMER	→ HUİMÉI YÁN WŪ 灰眉岩 鸥	Loxia curvirostra Linnaeus	2:415; 3:226
Emberiza godlewskii Taczanowski	(2:436; 3:234)	FICHTENMEISE	HĒIGUĀN SHĀNQUÈ 黑冠山雀
FELSENAUERHUHN	XÌZUǐ SÖNGJĪ 细嘴松鸡	Parus rufonuchalis Blyth	(2:338; 3:211)
Tetrao parvirostris Bonaparte	(1:73)	FICHTENSCHNÄPPER	XIUXIÖNG LÁN WĒNG 锈胸蓝 鹊
FELSENGIMPEL	HÓNGXIÖNG ZHŪQUÈ 红胸朱雀	Ficedula hodgsonii (Verreaux)	2:311
Carpodacus puniceus (Blyth)	2:403	FINK (Sammelbezeichnung)	YÀNQUÈ 燕雀. - Dieser Name, der
FELSENSCHNEEGIMPEL	GĀOSHĀN DÌQUÈ 高山地雀	→ BERGFINK	für den → BERGFINK, Fringilla montifringilla Linnaeus steht, bezeichnet den "Fink" (Gattung Fringilla) allgemein. "Unseren" BUCHFINK, Fringilla coelebs Linnaeus, gibt es in China nicht.
Leucosticte brandti (Bonaparte)	2:397	FINKEN (Familie) → FRINGILLIDAE	2:388; 3:223
FELSENSCHWALBE	YÁNYÀN 岩燕	FINKENBÜLBÜL	→ QUÈ KĒ 雀科
Ptyonoprogne rupestris (Scopoli)	2:23	Spizixos canifrons Blyth	(2:388; 3:222)
FELSENTAUBE	YUÁN GĒ 原鸽. - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): YÉ GĒZI 野鸽子	FISCHADLER	FÈNGTÓU YÍNGZUǐBĒI 凤头鹰嘴鵟
Columba livia Gmelin	1:165; 3:79	Pandion haliaetus (Linnaeus)	2:59
FEUERBRUST-BLÜTENPICKER → FEUERBRUST-MISTELFRESSER	HÓNGXIÖNG ZHUÓHUĀNIÀO 红胸啄花鸟	FISCHER (Sammelbezeichnung, Gattung → CERYLE)	È 翠
FEUERBRUST-MISTELFRESSER (FEUERBRUST-BLÜTENPICKER)	2:363; 3:218	→ GRAUFISCHER, → TRAUERFISCHER; s. auch → DSCHUNGELFISCHER (Gattung → CEYX)	1:64
Dicaeum ignipectus (Blyth)	HUǒGUĀNQUÈ 火冠雀	FISCHMÖWE	YÚ ŌU 鱼鸥
FEUERKOPFMEISE	2:359; 3:218	Larus ichthyaetus Pallas	1:149
Cephalopyrus flammiceps (Burton)	CHÌ FĚICUÌ 赤翡翠	FISCHREIHER (GRAUREIHER)	CĀNG LÙ 苍鹭. - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): HUī LÙ 灰鹭, LÀODÉNG 老等, QĪNGZHUĀNG 青荳
FEUERLIEST	1:212	Ardea cinerea Linnaeus	1:12; 3:31
Halcyon coromanda (Latham)	HUōWĒI TÀIYÁNGNIÀO 火尾太阳鸟		
FEUERSCHWANZ-NEKTARVOGEL	2:367		
Aethopyga ignicauda (Hodgson)	HUōWĒI LÙMÉI 火尾绿眉		
FEUERSCHWANZTIMALIE	2:222		
Myzornis pyrrhura Blyth	→ JIWĒNG SHǔ 姬鹟属		
FICEDULA	(2:307)		
Die Gattung FICEDULA Brisson			

FISCHUHU (Sammelbezeichnung, Gattung KETUPA)
→ HIMALAYA-, RIESEN-, WELLENBRUST-FISCHUHU

FLAGGENDRONGO
Dicrurus paradiseus (Linnaeus)
FLECKENBRUST-ZAUNKÖNIGTIMALIE
Spelaeornis formosus (Walden)

FLECKENBUSCHSÄNGER
Bradypterus thoracicus (Blyth)

FLECKENHÄHERLING
Garrulax merulinus Blyth

FLECKENHALS-BAUMTIMALIE
Stachyris striolata (Müller)

FLECKENKERNBEISSER
Mycerobas melanozanthos (Hodgson)

FLECKENSCHNÄPPER
Muscicapa griseisticta (Swinhoe)

FLECKENSCHERENSCHWANZ
Enicurus maculatus Vigors

FLECKSCHNABELENTE
Anas poecilorhyncha J.R. Forster

FLIEGENSCHNÄPPER (Unterfamilie)
→ MUSCICAPINAE

FLUCHTKUCKUCK
Hierococcyx fugax (Horsfield)

FLUCHTVOGEL (Sammelbezeichnung)
→ GOLDFLÜGEL-, GRAU-, GRÜNFLÜGEL-, OLIV-, ORPHEUSFLUCHTVOGEL

YÚXIĀO 鱼鷺
(1:190)

DÀ PÁNWĒI 大盘尾

2:80

LÍXÍNG LIÁOMÉI 丽星噪鹛

2:176

BĀNXIŌNG DUĀNCHÌYÍNG 斑胸短翅莺

2:258; 3:187

BĀNXIŌNG ZÀOMÉI 斑胸噪鹛

2:211

BĀNJÍNG SUÌMÉI 斑颈穗鹛

2:182

BĀNCHÌ NÍLÀZUÍQUÈ 斑翅拟腊嘴雀

2:427

BĀNXIŌNG WĒNG 斑胸翁

2:323

BĀNBÈI YÀNWĒI 斑背燕尾

2:145

BĀNZUÍ YĀ 斑嘴鸭。 - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi):
HUÁNZUÍJIĀN YĀ 黄嘴尖鸭

1:32; 3:42

ZÖNGFÙ DÙJUĀN 棕腹杜鹃
(1:176)

DUĀNJIÀOBĒI 短脚鹀
(2:49)

FLUGHÜHNER (1) (Familie) → PTEROClididae

FLUGHÜHNER (2) (Ordnung) → PTEROClidiformes

FLUGHUHN (Sammelbezeichnung)
→ SANDFLUGHUHN, STEPPENHUHN, TI-BETHUHN

FLUSSREGENPFEIFER
Charadrius dubius Scopoli

FLUSSEESCHWALBE
Sterna hirundo Linnaeus

FLUSSUFERLÄUFER
Actitis hypoleucos Linnaeus

FORMOSABLAUSCHWANZ
Tarsiger johnstoniae (Ogilvie-Grant)

FORMOSABÜLBÜL
Pycnonotus taivanus Styan

FORMOSABUSCHWACHTEL
Arborophila crudigularis (Swinhoe)

FORMOSAGOLDHÄHNCHEN
Regulus goodfellowi Ogilvie-Grant

FORMOSA-GRÜNTAUBE
Treron formosae Swinhoe

FORMOSAHÄHERLING
Liocichla steerii Swinhoe

FORMOSAMEISE
Parus holsti Seeböhm

SHĀJĪ 沙鸡
(1:159)

JÍNKUÀNG HÉNG 金眶鸻, auch HĒI-LÍNG HÉNG 黑领鸻
1:126; 3:69

YĀN'ŌU 燕鸥, auch PŪTŌNG YĀN'ŌU
普通燕鸥
1:154; 3:77

JÍ YÙ 琥珀。 - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): PŪTŌNG YÙ 普通鹬
(1:135; 3:71)

LÌBÈI LÍNQÚ 衢背林鸽
2:130

TÁIWĀN BĒI 台湾鵠
2:55

TÁIWĀN SHĀNZHÈGŪ 台湾山鹧鸪
1:88

HUÓGUĀN DÀIJÚ 火冠戴菊
2:291

HÓNGDÍNG LÜJIŪ 红顶绿鸠
(1:162)

HUÁNGXIŌNG SŌUMÉI 黄胸薮鹛
2:220

TÁIWĀN HUÁNG SHĀNQUÈ 台湾黄山雀
2:334

FORMOSAPFEIFDROSSEL Myophonus insularis (Gould)	TÁIWĀN Zǐ XIÀODōNG 台湾紫啸鸫 2:156
FORMOSASIBIA Actinodura morrisoniana Ogilvie- Grant	LÍTÓU BāNCHIMÉI 栗头斑翅鹛 2:229
FRANCOLINUS Die Gattung FRANCOLINUS Stephens	ZHÈGū SHǔ 鹩鶡属 1:82
FRANKOLIN (Sammelbezeichnung) → PERLHUHNFRANKOLIN	ZHÈGū 鹩鶡 . - Dies ist zugleich der spezifische Name für den → PERLHUHNFRANKOLIN, <i>Francolinus</i> <i>pintadeanus</i> (Scopoli) (1:82)
FREGATA Die Gattung FREGATA Lacépède	JŪNJIÀNNIÀO SHǔ 军舰鸟属 1:11
FREGATIDAE Die Familie FREGATIDAE (Fregatt- vögel)	JŪNJIÀNNIÀO Kē 军舰鸟科 1:11
FREGATTVÖGEL (Familie) → FREGATIDAE	
FREGATTVOGEL (Sammelbezeichnung) → BINDEN-, KLEINER FREGATTVOGEL	JŪNJIÀNNIÀO 军舰鸟 . - Dieser Na- me ist zugleich die spezifische Bezeichnung für den → BINDENFRE- GATTVOGEL, <i>Fregata minor</i> (Gmelin) (1:11)
FRINGILLA Die Gattung FRINGILLA Linnaeus	YĀNQUÈ SHǔ 燕雀属 2:388
FRINGILLIDAE Die Familie FRINGILLIDAE (Finken)	→ QUÈ Kē 雀科 (2:388; 3:222)
FRUCHTTAUBE (Sammelbezeichnung) → BRONZE-, FAHLBAUCH-, SCHWARZ- KINNFRUCHTTAUBE	GUǒJIŪ 黑鳩 (Gattung <i>PTILINOPUS</i>) und NÁNJIŪ 南鳩 (Gattung <i>DUCULA</i>) (1:163)
FRÜHLINGSPAPAGEICHEN Loriculus vernalis (Sparrmann)	DUĀNWĒIYÍNGWú 短尾鹦鹉 1:175

FUCHSEULE Otus spilocephalus (Blyth)	HUÁNZUǐ JIÀOXIĀO 黄嘴角鸮 1:184
FULICA Die Gattung FULICA Linnaeus	GÙDǐNG SHǔ 骨顶属 1:119
FULMARUS Die Gattung FULMARUS Stephens	GUĀNBÍHUò SHǔ 管鼻鹱属 1:5
	G
GACKELKUCKUCK <i>Cuculus poliocephalus</i> Latham	XIÀO DùJUĀN 小杜鹃 1:180; 3:87
GÄNSESÄGER <i>Mergus merganser</i> Linnaeus	QIŪSHĀYĀ 林沙鸭 , auch PÜTÖNG QIŪSHĀYĀ 普通林沙鸭 1:41; 3:44
GALERIDA Die Gattung GALERIDA Boie	FÈNGTÓUBÀILÍNG SHǔ 凤头百灵属 2:13
GALLICREX Die Gattung GALLICREX Blyth	DÖNGJĪ SHǔ 董鸡属 1:118
GALLIFORMES Die Ordnung GALLIFORMES (Hühner- vögel)	JÍ-XÍNG Mù 鸡形目 1:73; 3:53
GALLINAGO Die Gattung GALLINAGO Brisson	SHĀZHUI SHǔ 沙锥属 , auch TIÁNYÙ SHǔ 田鹬属 (1:137)
GALLINULA Die Gattung GALLINULA Brisson	HĒISHUÍJĪ SHǔ 黑水鸡属 1:118
GALLUS Die Gattung GALLUS Brisson	YUÁNJĪ SHǔ 原鸡属 1:99
GAMPSORHYNCHUS Die Gattung GAMPSORHYNCHUS Blyth	BÁITÓUJUÉMÉI SHǔ 白头购物中心属 2:226

GANGESBRILLENVOGEL Zosterops palpebrosus (Temminck)	HUÍFÙ XIÙYANNIÃO 灰腹绣眼鸟 2:373
GANS (1) (Sammelbezeichnung, im Sinne von WILDGANS) → BLÄSS-, GRAU-, NIL-, RINGEL-, SAAT-, SCHWANEN-, SCHNEE-, STREIFEN-, ZWERGBLÄSSGANS. → BRAND-, GLANZ-, JAVAPFEIF-, ROST-GANS gehören nach chinesischem Sprachgebrauch zu den Enten (YĀ 鸭) → WEISSBAUCH-ZWERGGANS gehört nach chinesischem Sprachgebrauch zu den Enten (PÚ 鹑, MIÁNFÚ 棉凫)	YÀN 雁 (1:25)
GANS (2) (Sammelbezeichnung, im Sinne von HAUSGANS)	É 我鴨
GARRULAX Die Gattung GARRULAX Lesson	ZÀOMÉI SHÙ 噪鹛属 2:200
GARRULUS Die Gattung GARRULUS Brisson	SÖNGYĀ SHÙ 松鶲属 2:89
GAVIA Die Gattung GAVIA J.R. Forster	QIÁNNIÃO SHÙ 潜鸟属 1:1
GAVIIDAE Die Familie GAVIIDAE (Seetaucher)	QIÁNNIÃO KĒ 潜鸟科 1:1
GAVIIFORMES Die Ordnung GAVIIFORMES (Seetaucher)	QIÁNNIÃO MÙ 潜鸟目 1:1
GEBIRGSTELZE Motacilla cinerea Tunstall	HUÍ JÍLÍNG 灰鹡鸰 2:36; 3:116
GECINULUS Die Gattung GECINULUS Blyth	ZHÚZHUÓMÙ SHÙ 竹啄木属 1:228
GEIER (Sammelbezeichnung) → BART(LÄMMER-)-, BENGALEN-, HIMALAYA-, KAHLKOPF-, MÖNCHSGEIER (KUTTENGEIER)	JIŪ 鹰 (1:59)

GELBAUGENTAUBE Columba eversmanni Bonaparte	ZHÔNGYÀ GĒ 中亚鸽 1:166
GELBBAUCH-BLÜTENPICKER → GELB-BAUCH-MISTELFRESSER	
GELBBAUCH-FÄCHERSCHWANZ Chelidonyx hypoxantha Blyth	HUÁNGFÙ SHÀNWĒIWĒNG 黄腹扇尾鹟 (2:330)
GELBBAUCHHÄHERLING Garrulax galbanus Godwin-Austen	HUÁNGFÙ ZÀOMÉI 黄腹噪鹛 2:205
GELBBAUCH-MISTELFRESSER (GELB-BAUCH-BLÜTENPICKER) Dicaeum melanoxanthum (Blyth)	HUÁNGFÙ ZHUÓHUĀNIÃO 黄腹啄花鸟 2:361
GELBBAUCHPRINIE Prinia flaviventris (Delessert)	HUÍTÓU JIĀOYÍNG 灰头鹀莺 2:303
GELBBRAUEN-BAMBUSHUHN Bambusicola thoracica (Temminck)	ZHÚJĪ 竹鸡 1:89; 3:54
GELBBRAUEN-LAUBSÄNGER Phylloscopus inornatus (Blyth)	HUÁNGMÉI LIҮYÍNG 黄眉柳莺 . - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): LIÜCHUÀN'R 柳串儿, SHÙ-CHUÀN'R 树串儿 2:280; 3:192
GELBBRUST-BAUMTIMALIE Mixornis gularis (Horsfield)	WÉNXIÖNGMÉI 纹胸鹛 (2:183)
GELBBRUST-LAUBSÄNGER Phylloscopus cantator (Tickell)	HUÁNGXIÖNG LIҮYÍNG 黄胸柳莺 2:289
GELBHAUBENSPECHT Picus chlorolophus Vieillot	HUÁNGGUĀN LÜZHUÓMÙNIÃO 黄冠绿啄木鸟 1:227
GELBKOPF-BLATTVOGEL Chloropsis cochinchinensis (Gmelin)	LÁNCÌ YÈBĒI 蓝翅叶鹎 2:62
GELBNACKENSPECHT Picus flavinucha Gould	DÀ HUÁNGGUĀN LÜZHUÓMÙNIÃO 大黄冠绿啄木鸟 1:227

GELBNACKENTIMALIE	HUÁNGJÍNG FÈNGMÉI 黄颈凤鹛	GERFALKE	MÁO SŪN 猫隼
<i>Yuhina flavicollis</i> Hodgson	2:232	<i>Falco rusticolus</i> Linnaeus	1:66
GELBRÜCKEN-NEKTARVOGEL → SCHAR-LACHNEKTARVOGEL		GIMPEL (1)	HÓNGFÙ HUÍQUÈ 红腹灰雀
		<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus)	2:423
GELBSCHENKEL-KERNBEISSER	HĒICHÌ NÌLAZUÍQUÈ 黑翅拟蜡嘴雀	GIMPEL (2) (Sammelbezeichnung)	Im Chinesischen gibt es keine einheitliche, umfassende Sammelbezeichnung, sondern die Gattungsnamen dienen jeweils als Sammelbezeichnung für die Angehörigen der betr. Gattung: ZHĒQUÈ 朱雀 (Gattung → CARPODACUS); HUÍQUÈ 灰雀 (Gattung → PYRRHULA). Für die übrigen vgl. die chinesischen Namen zu → LEUCOSTICTE (2:396), → RHODOPECHYS (2:399), → KOZLOWIA (2:414), → PINICOLA (2:414), → URGUS (2:417), → PROPYRRHULA (2:418), → HAEMATOSPIZA (2:418), → PYRRHOPECTES (2:419)
<i>Mycerobas affinis</i> (Blyth)	2:428	a) Gattung CARPODACUS: → ALPEN-, AURORA-, BERG-, BINDEN-, BLANFORD-, BURGUNDER-, DÜNNSCHNABEL-, EDWARDS-, EINÖD-, FELSEN-, KARMIN-, MEISEN-, ROSEN-, ROSENBAUCH-, ROTMANTEL-, SCHMUCK-, THURAGIMPEL	
GELBSCHNABEL-EISTAUCHER (TUNDRA-TAUCHER)	BÁIZUÍ QIÁNNIÃO 白嘴潜鸟	b) Gattung PYRRHULA: → GIMPEL (1), MASKEN-, ROTKOPF-, SCHUPPENKOPFGIMPEL	
<i>Gavia adamsii</i> (G.R. Gray)	1:2	c) → SCHNEEGIMPEL (4 Arten)	
GELBSCHNABELKITTA	HUÁNGZUI LÁNQUÈ 黄嘴蓝鹊	d) Die Gimpel der übrigen Gattungen: → HAKEN-, MOHREN-, MONGOLEN-, RHODODENDRON-, ROBOROWSKI-, ROTFLÜGEL-, SCHARLACH-, WEISSFLÜGEL-GIMPEL	
<i>Urocissa flavirostris</i> (Blyth)	(2:92)	GIRLITZ (Sammelbezeichnung) → HIMALAYA-, ROTSTIRNGIRLITZ.	SÍQUÈ SHŪ 丝雀属
GELBSCHWANZ-GLANZFASAN	ZÖNGWEI HÓNGZHÌ 棕尾虹雉	- Der Himalayagirlitz wird von den Chinesen zu den Zeisigen (→ HUÁNGQUÈ 黄雀) gerechnet	(2:389)
<i>Lophophorus impejanus</i> (Latham)	1:94	GLANZENTE (GLANZGANS) <i>Sarkidiornis melanotos</i> (Pennant)	LIÚYÀ 猫鴞
GELBSTEISS-BLÜTENPICKER → GELBSTEISS-MISTELFRESSER		GLANZFASAN (Sammelbezeichnung) → GELBSCHWANZ-, GRÜNSCHWANZ-, WEISSCHWANZ-GLANZFASAN	HÓNGZHÌ 虹雉
GELBSTEISSBÜLBÜL	HUÁNGTÚN BĒI 黄臀鹎 . - Volks-tümliche Bezeichnung (in S-Shensi): MÁOMĀOJĪ 毛毛鸡	GLANZGANS → GLANZENTE	(1:94)
<i>Pycnonotus xanthorrhous</i> Anderson	2:55; 3:121	GLANZKÄFERTAUBE <i>Chalcophaps indica</i> (Linnaeus)	JÍNJIŪ 金鸠
GELBSTEISS-MISTELFRESSER (GELBSTEISS-BLÜTENPICKER)	HUÁNGGĀNG ZHUÓHUĀNIÃO 黄肛啄花鸟		1:172
<i>Dicaeum chrysorrheum</i> Temminck et Laugier	2:360		
GELBSTIRN-PAPAGEIMEISE → GELBSTIRN-PAPAGEISCHNABEL	HUÁNG'É YÁQUÈ 黄额鸦雀		
	2:193; 3:172		
GELBSTIRN-PAPAGEISCHNABEL (GELBSTIRN-PAPAGEIMEISE)	ZÀOŌU SHŪ 噪鸥属		
<i>Paradoxornis fulvifrons</i> (Hodgson)			
GELOCHELIDON	→ DÌDŌNG SHŪ 地鶲属		
Die Gattung GELOCHELIDON C.L. Brehm	(2:156)		
GEOKICHLA			
Die Gattung GEOKICHLA S. Müller			

GERFALKE	MÁO SŪN 猫隼
<i>Falco rusticolus</i> Linnaeus	1:66
GIMPEL (1)	HÓNGFÙ HUÍQUÈ 红腹灰雀
<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus)	2:423
GIMPEL (2) (Sammelbezeichnung)	Im Chinesischen gibt es keine einheitliche, umfassende Sammelbezeichnung, sondern die Gattungsnamen dienen jeweils als Sammelbezeichnung für die Angehörigen der betr. Gattung: ZHĒQUÈ 朱雀 (Gattung → CARPODACUS); HUÍQUÈ 灰雀 (Gattung → PYRRHULA). Für die übrigen vgl. die chinesischen Namen zu → LEUCOSTICTE (2:396), → RHODOPECHYS (2:399), → KOZLOWIA (2:414), → PINICOLA (2:414), → URGUS (2:417), → PROPYRRHULA (2:418), → HAEMATOSPIZA (2:418), → PYRRHOPECTES (2:419)
a) Gattung CARPODACUS: → ALPEN-, AURORA-, BERG-, BINDEN-, BLANFORD-, BURGUNDER-, DÜNNSCHNABEL-, EDWARDS-, EINÖD-, FELSEN-, KARMIN-, MEISEN-, ROSEN-, ROSENBAUCH-, ROTMANTEL-, SCHMUCK-, THURAGIMPEL	
b) Gattung PYRRHULA: → GIMPEL (1), MASKEN-, ROTKOPF-, SCHUPPENKOPFGIMPEL	
c) → SCHNEEGIMPEL (4 Arten)	
d) Die Gimpel der übrigen Gattungen: → HAKEN-, MOHREN-, MONGOLEN-, RHODODENDRON-, ROBOROWSKI-, ROTFLÜGEL-, SCHARLACH-, WEISSFLÜGEL-GIMPEL	
GIRLITZ (Sammelbezeichnung) → HIMALAYA-, ROTSTIRNGIRLITZ.	SÍQUÈ SHŪ 丝雀属
- Der Himalayagirlitz wird von den Chinesen zu den Zeisigen (→ HUÁNGQUÈ 黄雀) gerechnet	(2:389)
GLANZENTE (GLANZGANS) <i>Sarkidiornis melanotos</i> (Pennant)	LIÚYÀ 猫鴞
GLANZFASAN (Sammelbezeichnung) → GELBSCHWANZ-, GRÜNSCHWANZ-, WEISSCHWANZ-GLANZFASAN	HÓNGZHÌ 虹雉
GLANZGANS → GLANZENTE	(1:94)
GLANZKÄFERTAUBE <i>Chalcophaps indica</i> (Linnaeus)	JÍNJIŪ 金鸠
	1:172

GLANZKÄTHE	JIĀ YĀ 家鴨
Corvus splendens Vieillot	2:104
GLAREOLA	YÀNHÉNG SHŪ 燕鵙屬
Die Gattung GLAREOLA Brisson	1:146
GLAREOLIDAE	YÀNHÉNG KĒ 燕鵙科
Die Familie GLAREOLIDAE (Brachschwalbenartige)	1:146; 3:75
GLAUCIDIUM	XIŪLIÚ SHŪ 鵠鵙屬
Die Gattung GLAUCIDIUM Boie	1:191
GLAUCIONETTA	QUÈYĀ SHŪ 鵠鵙屬
Die Gattung GLAUCIONETTA Stejneger (von manchen Autoren mit der Gattung BUCEPHALA Baird vereinigt)	(1:39)
GLEITAAAR	HĒICHÌYUĀN 黑翅鳽
Elanus caeruleus (Desfontaines)	1:41
GLUCKENTE	HUĀLIĀN YĀ 花脸鴨
Anas formosa Georgi	1:32; 3:41
GODLEWSKIPIPER	PÍNGYUÁN LIŪ 平原鶲。 - Dieser Name gilt auch für den → BRACHPIPER, Anthus campestris (Linnaeus)
Anthus godlewskii (Taczanowski)	(2:26)
GOLD-ALCIPPE	JĪNXIōNG QUÈMÉI 金胸雀眉
Alcippe chrysotis (Blyth)	2:237; 3:181
GOLDAMMER	HUÁNG WŪ 黃鶲
Emberiza citrinella Linnaeus	2:434
GOLDAUGENTIMALIE	Jīnyān MÉIQUÈ 金眼眉雀
Chrysomma sinense (Gmelin)	2:185
GOLDBINDEN-LAUBSÄNGER	CHÉNGBĀNCHÌ LIÜYÍNG 橙斑翅柳莺
Phylloscopus pulcher Blyth	. - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): LIÜCHUÀN'R 柳串儿

2:279; 3:192

GOŁDBRUSTBÜLBÜL	HĒIGUĀN HUÁNG BĒI 黑冠黃鶲
Pycnonotus melanicterus (Gmelin)	(2:53)
GOŁDDROSSEL → ERDDROSSEL	
GOLDFASAN	HÓNGFÙ JÍNJÍ 红腹锦鸡 , auch JÍNJÍ 锦鸡 , oder JÍNJÍ 金鸡 .
Chrysolophus pictus (Linnaeus)	- Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): JIÀJÍ 架鸡; MÁOMĀOJÍ 毛鸡
	1:108; 3:60
GOLDFLÜGEL-FLUCHTVOGEL	LÌBĒI DUĀNJIĀOBĒI 栗背短脚鷦
Hypsipetes flava (Blyth)	(2:51)
GOLDHÄHNCHEN (Sammelbezeichnung) → FORMOSAGOLDHÄHNCHEN, → WINTER-GOLDHÄHNCHEN	DÀIJÚ 戴菊 . - Diese Bezeichnung ist zugleich Name der Gattung → REGULUS Cuvier sowie der Name für das → WINTERGOLDHÄHNCHEN, Regulus regulus (Linnaeus)
	(2:289; 3:196)
GOLDHÄHNCHEN-LAUBSÄNGER	HUÁNGYĀO LIÜYÍNG 黄腰柳莺 . - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): LIÜCHUÀN'R 柳串儿
Phylloscopus proregulus (Pallas)	2:281; 3:193
GOLDKEHL-BARTVOGEL	Jīnhóu Nǐzhuómù 金喉拟啄木
Megalaima franklinii (Blyth)	1:220
GOLDKOPF-BAUMTIMALIE	JÍNTÓU SUÌMÉI 金头穗鹛
Stachyris chrysaea Blyth	2:181
GOLDKOPF-CISTENSÄNGER	HUÁNGTÓU SHÀNWÉIYÍNG 黄头扇尾莺
Cisticola exilis (Vigors et Horsfield)	2:300
GOLDMANTELSPECHT	Jīnbèi-sānzhǐ-zhuómùniǎo 金背三趾啄木鸟
Dinopium javanense (Ljung)	1:228
GOLDREGENPFEIFER → KLEINER GOLDREGENPFEIFER	

GOLDSCHEITELTESTA Tlesia olivea (Horsfield)	JÍNGUĀN DÌYÍNG 金冠地莺 2:251	GRASMÜCKE (Sammelbezeichnung) → BUSCH-, DORN-, KLAPPER-, SPER- BER-, WÜSTENGRASMÜCKE	YÍNG 鸲 (2:271)
GOLDSCHNÄPPER Ficedula narcissina (Temminck)	HĒIBÈI HUÁNGMÉI WĒNG 黑背黄眉鹟 2:308	GRASMÜCKENARTIGE → SYLVIIDAE	
GOLDSCHNEPFE Rostratula benghalensis (Linnaeus)	Cǎiyù 彩鹬 1:123; 3:67	GRAUAMMER <i>Emberiza calandra</i> Linnaeus	SHŪ WŪ 泰鶲 2:429
GOLDSCHNEPFEN (Familie) → ROSTRATULIDAE		GRAUAUGENALCIPPE <i>Alcippe morrisonia</i> Swinhoe	BÁIKUÀNG QUÈMÉI 白眶雀鹛 2:244; 3:182
GOLDSCHOPFMEISE (SULTANSMEISE) Melanochlora sultanea (Hodgson)	MIĀNQUÈ 美雀 2:345	GRAUBAUCHTESTA <i>Tesia cyaniventer</i> Hodgson	HUÍFÙ DÌYÍNG 灰腹地莺 2:250
GOLDSCHWANZ Tarsiger chrysaeus Hodgson	JÍNSÈ LÍN QÚ 金色林鵙 (2:130; 3:148)	GRAUBRAUEN-BAMBUSHUHN <i>Bambusicola fytchii</i> Anderson	MIĀNDIÀN ZHÚJÍ 缅甸竹鸡 1:89
GOLDSCHWINGENHÄHERLING Garrulax subunicolor (Blyth)	CHÚNSÈ ZÀOMÉI 纯色噪鹛 2:214	GRAUBRUSTELSTER <i>Dendrocitta formosae</i> Swinhoe	HUÍ SHÙQUÈ 枫树鵙 (2:97)
GOLDSTIRN-BLATTVOGEL Chloropsis aurifrons (Temminck)	JÍNÉ YÈBĒI 金額叶鹎 2:62	GRAUBRUSTPRINIE <i>Prinia hodgsonii</i> Blyth	HUÍXIÖNG JIÀOYÍNG 灰胸鵙莺 2:301
GORSACHIUS Die Gattung GORSACHIUS Bonaparte	HŪBĀNYÁN SHŪ 虎斑鳽属 1:18	GRAUBRISTRALLE <i>Rallus striatus</i> Linnaeus	LÁNXIÖNG YĀNGJÍ 蓝胸秧鸡 1:114
GOULDNEKTARVOGEL Aethopyga gouldiae (Vigors)	LÁNHÓU TÀIYÁNGNIÀO 蓝喉太阳鸟 2:368; 3:219	GRAUBÜRZEL-WASSERLÄUFER <i>Heteroscelus brevipes</i> (Vieillot)	HUÍ YÙ 灰鵠. Diesen Namen trägt auch der → WANDERWASSERLÄUFER, <i>Heteroscelus incanus</i> (Gmelin) (1:135; 3:72)
GRACULA Die Gattung GRACULA Linnaeus	LIÁOGĒ SHŪ 鸩哥属 2:87	GRAUDRONGO <i>Dicrurus leucophaeus</i> Vieillot	HUÍ JUĀNWĒI 灰卷尾. - Volkstüm- liche Bezeichnung (in S-Shensi): HUÍ TIĚLIÀNJIĀ 灰铁炼甲 2:76; 3:129
GRACUPICA Die Gattung GRACUPICA Lesson	→ LIÁNGNIÀO SHŪ 棕鸟属 (2:80)		KÖNGQUÈZHÌ 孔雀雉 1:108
GRAMINICOLA Die Gattung GRAMINICOLA Jerdon	CÁOYÍNG SHŪ 草莺属 2:301	GRAUER PFAUFASAN <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (Lin- naeus)	BĀN YÚGŌU 斑鱼狗 1:210
GRANDALA (1) Grandala coelicolor Hodgson	LÁN DÀCHÌQÚ 蓝大翅鸲 2:142	GRAUFISCHER <i>Ceryle rudis</i> (Linnaeus)	HUÍXIÉ ZÀOMÉI 灰胁噪鹛 2:210
GRANDALA (2) Die Gattung GRANDALA Hodgson	DÀCHÌQÚ SHŪ 大翅鸲属 2:142	GRAUFLANKENHÄHERLING <i>Garrulax caerulatus</i> (Hodgson)	

GRAUFLUCHTVOGEL	HĒI DUĀNJIĀOBĒI 黑短脚鶲
<i>Hypsipetes leucocephalus</i> (Gmelin)	(2:51)
GRAUGANS	HUĪ YÀN 灰雁
<i>Anser anser</i> (Linnaeus)	1:28
GRAUHÄHERLING	HUĪCHÌ ZÀOMÉI 灰翅噪鹛
<i>Garrulax cineraceus</i> (Godwin-Austen)	2:207; 3:175
GRAUKEHL-LAUBSÄNGER	HUĪHÓU LIŪYÍNG 灰喉柳莺
<i>Phylloscopus maculipennis</i> (Blyth)	2:282
GRAUKEHL-SPINNENJÄGER	XIǎO BǔZHŪNIÀO 小捕蛛鸟
<i>Arachnothera longirostris</i> (Latham)	2:370
GRAUKINN-MENNIGVOGEL	HUĪHÓU SHĀNJIĀONIÀO 灰喉山椒鸟
<i>Pericrocotus solaris</i> Blyth	2:45
GRAUKITTA	HUĪ LÁNQUÈ 灰蓝鹀
<i>Urocissa whiteheadi</i> Ogilvie-Grant	(2:92)
GRAUKOPFALCIPPE	HUĪKUÀNG QUÈMÉI 灰眶雀鹛
<i>Alcippe poioicephala</i> (Jerdon)	2:244
GRAUKOPFAMMER (BRAUNOHRAMMER)	CHÌXIōNG WŪ 赤胸鹀
<i>Emberiza fucata</i> Pallas	2:440; 3:236
GRAUKOPFKIEBITZ	HUĪTÓUMAIJĪ 灰头麦鸡
<i>Microsarcops cinereus</i> (Blyth)	1:124; 3:68
GRAUKOPF-LAUBSÄNGER	HUĪTÓU WĒNGYÍNG 灰头鹟莺
<i>Seicercus xanthoschistos</i> (G.R. Gray)	2:293
GRAUKOPF-MÜCKENSCHNÄPPER	FĀNGWĒIWĒNG 方尾鹟
<i>Culicicapa ceylonensis</i> (Swainson)	2:326; 3:206
GRAUKOPF-PAPAGEIMEISE → GRAUKOPF-PAPAGEISCHNABEL	HUĪTÓU YĀQUÈ 灰头鸦雀
<i>Paradoxornis gularis</i> G.R. Gray	2:196

GRAUKOPF-SCHNEEGIMPEL	BĒI DÌQUÈ 北地雀
<i>Leucosticte arctoa</i> (Pallas)	2:399
GRAUKOPF-SCHWANZMEISE	YÍNLIĀN CHÁNGWĒISHĀNQUÈ 银脸长尾山雀 auch YÍNLIĀN SHĀNQUÈ 银脸山雀
<i>Aegithalos fuliginosus</i> (Verreaux)	2:349; 3:214
GRAUKOPFSTAR	HUĪTÓU LIÁNGNIÀO 灰头椋鸟
<i>Temenuchus malabaricus</i> (Gmelin)	(2:80)
GRAUMENNIGVOGEL	HUĪ SHĀNJIĀONIÀO 灰山椒鸟
<i>Pericrocotus divaricatus</i> (Raffles)	(2:44)
GRAUOHR-PAPAGEIMEISE → GRAUOHR-PAPAGEISCHNABEL	
GRAUOHR-PAPAGEISCHNABEL (GRAUOHR-PAPAGEIMEISE)	CHÉNGBÈI YĀQUÈ 橙背鸦雀
<i>Paradoxornis nipalensis</i> (Hodgson)	3:172
GRAUPELIKAN	BĀNZUĬ TÍHÚ 斑嘴鹈鹕
<i>Pelecanus philippensis</i> Gmelin	(1:8)
GRAUREIHER → FISCHREIHER	
GRAURÜCKENDROSSEL	HUĪBÈI DÔNG 灰背鴟
<i>Turdus hortulorum</i> Sclater	2:158
GRAURÜCKEN-SCHERENSCHWANZ	HUĪBÈI YÀNWEI 灰背燕尾
<i>Enicurus schistaceus</i> (Hodgson)	2:144
GRAUSCHEITESPECHT	XÍNGTÓU ZHUÓMUNIÀO 星头啄木鸟
<i>Yungipicus canicapillus</i> (Blyth)	(1:236; 3:105)
GRAUSCHMÄTZER	HUĪ LÍNJÍ 灰林鶲
<i>Saxicola ferrea</i> G. R. Gray	2:148; 3:158
GRAUSCHNÄPPER	BĀN WĒNG 斑翁
<i>Muscicapa striata</i> (Pallas)	2:321
GRAUSCHULTER-ROHRAMMER	WĒI WŪ 苇鹀
<i>Emberiza pallasi</i> (Cabanis)	2:445; 3:237
GRAUSCHWALBENSTAR	HUĪ YÀNJUÉ 灰燕鶲
<i>Artamus fuscus</i> Vieillot	2:87

GRAUSPECHT	LÜZHUÓMÙNIÀO 绿啄木鸟 . - Volks-tümliche Bezeichnung (in S-Shensi):	GRÜNKOPFLEIST	BÁILING FĚICUÌ 白领翡翠
Picus canus Gmelin	XIĀNG BĒNDĀMÙ 香峰打木 1:225; 3:102	Halcyon chloris (Boddaert)	1:214
GRAUSTAR	HUĪ LIÁNGNTÀO 灰椋鸟 . - Volks-tümliche Bezeichnung (in S-Shensi): GĀOLIÁNGTÓU 高梁头 (2:83; 3:132)	GRÜNLAUBSÄNGER	ÀNLÜ LIÜYÍNG 暗绿柳莺 . - Volks-tümliche Bezeichnung (in S-Shensi): LIÜCHUÀN'R 柳串儿 2:284; 3:194
GRAUTIMALIE	HUĪ QÍMÉI 灰奇鹛 2:248	GRÜNLING (Sammelbezeichnung) → CHINESEN-, HIMALAYA-, SCHWARZ-KOPFGRÜNLING	JÍNCHÌ 金翅 . Dieser Name bezeichnet im engeren Sinne den → CHINESEN-GRÜNLING, Chloris sinica (Linnaeus) (2:390; 3:224)
Heterophasia gracilis (Horsfield)	HUĪLÌĀN WĒNGYÍNG 灰脸鹟莺 2:294	GRÜNOHR-BARTVOGEL	HUÁNGWÉN NÍZHUÓMÙ 黄纹拟啄木 1:220
GRAUWANGEN-LAUBSÄNGER		Megalaima faiosticta (Temminck)	BÁIFÙ FÈNGMÉI 白腹凤鹛 2:236
Seicercus poliogenys (Blyth)		GRÜNRÜCKENTIMALIE	QÍNGJIÀO YÙ 青脚鹬 1:134
GRAUWÜRGER → RAUBWÜRGER		Yuhina zantholeuca (Blyth)	LÜ KUĀNZUÍDÖNG 绿宽嘴鶲 2:146
GREIFE (Familie) → ACCIPITRIDAE		GRÜNSCHENKEL	LÜWÉI HÓNGZHÌ 绿尾虹雉 1:95
GREIFVOGEL (Ordnung) → FALCONIFORMES		Tringa nebularia (Gunnerus)	LÜHÓU TÀIYÁNGNIÀO 绿喉太阳鸟 2:368
GREIFVOGEL (Sammelbezeichnung)	YÍNG 鹰	GRÜNSCHNÄPPERDROSSEL	HÈ KĒ 鹤科 1:110; 3:61
GROSSER BRACHVOGEL	BÁIYÀO SHÁOYÙ 白腰杓鹬 1:132	Cochoa viridis Hodgson	HÈ-XÍNG MÙ 鹤形目 1:110; 3:61
Numenius arquata (Linnaeus)	XÍZUÍ BÍNYÙ 细嘴滨鹬 1:140	GRÜNSCHWANZ-GLANZFASAN	HÈ SHÙ 鹤属 1:110
GROSSER KNUTT	DÀ BÀO 大鵟, auch DÌPŪ 地鵟 .	Lophophorus lhuysii St. Hilaire	BÁIYÀN'ŌU SHÙ 白鹇属 1:158
Calidris tenuirostris (Horsfield)	Der letzte Name ist zugleich neben dem Namen YĚYÀN 野雁 einer der beiden volkstümlichen Bezeichnungen für die → GROSSTRAPPE in S-Shensi. 1:121; 3:66	GRÜNSCHWANZ-NEKTARVOGEL	
GROSSTRAPPE	LÜCHÌ DUĀNJIÀOBĒI 绿翅短脚鹬 (2:50)	Aethopyga nipalensis (Hodgson)	
Otis tarda Linnaeus		GRUIDAE	
GRÜNFLÜGEL-FLUCHTVOGEL		Die Familie GRUIDAE (Kraniche)	
Hypsipetes maccallandii Horsfield		GRUIFORMES	
GRÜNKOPF-LAUBSÄNGER	LÜTÓU WĒNGYÍNG 绿头鹟莺 2:293	Die Ordnung GRUIFORMES (Kranichvögel)	
Seicercus affinis (Horsfield et Moore)		GRUS	
		Die Gattung GRUS Pallas	
		GYGIS	
		Die Gattung GYGIS Wagler	

GYPAETUS
Die Gattung GYPAETUS Storr

GYPS
Die Gattung GYPS Savigny

HÚWÙJIÙ SHŪ 胡兀鹫属
1:60

WÙJIÙ SHŪ 兀鹫属
1:59

H

HABICHT
Accipiter gentilis (Linnaeus)

HABICHTSADLER
Hieraaetus fasciatus (Vieillot)

HABICHTSKAUZ
Strix uralensis Pallas

HÄHER (Sammelbezeichnung)
→ EICHEL-, HÖHLEN-, MONGOLEN-,
SZETSCHWAN-, TANNEN-, UNGLÜCKS-,
WEISSCHWANZHÄHER

HÄHERLING (Sammelbezeichnung)
a) Zur Gattung GARRULAX gehörende
Vögel:

→ AUGENBRAUEN-, BLAUFÜGEL-, BOR-
STEN-, BRUSTBAND-, DAVID-, ELLIOT-,
FLECKEN-, GELEBAUCH-, GOLDSCHWIN-
GEN-, GRAU-, GRAUFLANKEN-, KANSU-,
LÄRM-, LÄTZCHEN-, MASKEN-, MORRI-
SON-, PRACHT-, PRINZEN-, RIESEN-,
ROTKOPF-, ROTSWANZ-, SCHWARZ-
SCHEITEL-, WALD-, WEISSHAUBEN-,
WEISSKEHL-, WEISSOHR-, WEISSWAN-
GEN-, WELLENHÄHERLING

b) Die 3 zur Gattung LIOCICHLA
(SÖUMÉI) gehörenden Häherlinge,
FORMOSA-, KARMINFLÜGEL- und OMEI-
HÄHERLING, tragen die Sammelbe-
zeichnung SÖUMÉI 苏鹃 2:219

CĀNG YÍNG 苍鹰
1:44

BÁIFÙ SHĀN DIĀO 白腹山雕
1:55

BĚI LÍNXIĀO 北林鸮
1:197

DÌYĀ 地鶲 (Gattung PODOCES und
PSEUDOPODECES); SŌNGYĀ 松鶲 (Gatt-
ung GARRULUS); XīNGYĀ 星鶲 (Gatt-
ung NUCIFRAGA); ZÀOYĀ 噪鶲 (Gatt-
ung PERSISOREUS)

ZÀOMÉI 噪鹛
2:200

HUWUJIU SHU 胡兀鹫属
1:60

WUJIU SHU 兀鹫属
1:59

HAEMATOPODIDAE

Die Familie HAEMATOPODIDAE (Au-
sternfischer)

HAEMATOPUS

Die Gattung HAEMATOPUS Linnaeus

HAEMATOSPIZA

Die Gattung HAEMATOSPIZA Blyth

HÄNFLING (1) (= BLUTHÄNFLING)
Linaria cannabina (Linnaeus)

HÄNFLING (2) (Sammelbezeichnung)
→ BERG-, BLUTHÄNFLING

HAINANBUSCHWACHTEL

Arborophila ardens (Styan)

HAINANNEKTARVOGEL

Aethopyga christinae Swinhoe

HAINANREIHER

Oroanassa magnifica (Ogilvie-
Grant)

HAINANSCHNÄPPER

Cyornis hainanus (Ogilvie-Grant)

HAKENGIMPEL

Pinicola enucleator (Linnaeus)

HALCYON

Die Gattung HALCYON Swainson

HALDENHUHN

Lerwa lerwa (Hodgson)

HALIAEETUS

Die Gattung HALIAEETUS Savigny

LÌYÙ KĒ 蚁鵙科

1:123

LÌYÙ SHŪ 蚁鵙属
1:123

XUĚQUÈ SHŪ 血雀属
2:419

CHÌXIONG ZHŪDÌNGQUÈ 赤胸朱顶雀
(2:396)

ZHŪDÌNGQUÈ 朱顶雀. - Unter die-
se Sammelbezeichnung fallen nach
chinesischem Sprachgebrauch auch
die Birkenzeisige; → BIRKENZEISIG
(2), → POLARBIRKENZEISIG
(2:394/396)

HĀINÁN SHĀNZHÈGŪ 海南山鹧鸪
1:89

CHĀWĒI TÀIYÁNGNIÀO 叉尾太阳鸟
2:369

BĀNFÙ YÈLÙ 斑腹夜鹭
(1:18)

HĀINÁN LÁN WĒNG 海南蓝翁
(2:319)

SŌNGQUÈ 松雀
2:415

FÉICUÌ SHŪ 翡翠属
1:212

XUĚCHÚN 雪鹀
1:76

HĀIDIĀO SHŪ 海雕属
1:57

HALIASTUR	LÍYUĀN SHŪ 雉鸢属
Die Gattung HALIASTUR Selby	1:44
HALSBANDBÜLBÜL	LÜ YÍNGZUÍBÉI 绿嘴嘴鶲 . - Volks-tümliche Bezeichnung (in S-Shensi):
Spizixos semitorques Swinhoe	QÍNGGUĀNQUÈ 青冠雀 ; WĀNDÒUQUÈ 腕趾雀 2:60; 3:122
HALSBANDEULE	LÍNG JIÁOXIĀO 领角鸮
Otus bakkamoena Pennant	1:186; 3:89
HALSBANDKRÄHE	BÁIJÍNG YĀ 白颈鸦 . - Volkstüm-lische Bezeichnung (in S-Shensi):
Corvus torquatus Lesson	BÁIBÓ WŪ YĀ 白脖乌鸦 2:108; 3:141
HALSBANDMAINA	BÁILÍNG BĀGĒ 白领八哥
Acridotheres albocinctus Godwin-Austen et Walden	2:86
HALSBAND-SCHERENSCHNABEL	JIĀNZUÍŌU 剪嘴鸥
Rhynchos albicollis Swainson	1:158
HALSBANDSITTICH (KLEINER ALEXANDER-SITTICH)	HÓNGLÍNG LÜ YÍNGWŪ 红领绿鹊武
Psittacula krameri (Scopoli)	1:173
HARPACTES	YÀOJUĀN SHŪ 咬鹃属
Die Gattung HARPACTES Swainson	1:208
HASELUHN	ZHĒNJĪ 缠鸡
Tetrastes bonasia (Linnaeus)	1:75
HAUBENAMMER	FÈNGTÓU WŪ 凤头鹀
Emberiza lathami J.E. Gray	(2:447)
HAUBENLERCHE	FÈNGTÓUBĀILÍNG 凤头百灵 . - Volks-tümliche Bezeichnung (in S-Shensi):
Galerida cristata (Linnaeus)	FÈNGTÓU ĀLÁN 凤头阿兰 2:13; 3:106
HAUBENMAINA	BĀGĒ 八哥
Acridotheres cristatellus (Linnaeus)	2:85; 3:132

HAUBENSEGLER	FÈNGTÓUYŪYÀN 凤头雨燕
Hemiprocne longipennis (Rafinesque)	1:207
HAUBENTAUCHER	FÈNGTÓUPÌTÍ 凤头䴙䴘
Podiceps cristatus (Linnaeus)	(1:4)
HAUSROTSCHWANZ	ZHĒ HÓNGWĒIQŪ 红尾鵙
Phoenicurus ochruros (Gmelin)	2:135; 3:150
HAUSSEGLER	XIÀO BÁIYĀO YŪYÀN 小白腰雨燕
Apus affinis (J.E. Gray)	1:207
HAUSSPERLING (SPATZ)	JIÀ MÁQUÈ 荚麻雀
Passer domesticus (Linnaeus)	2:373
HECKENKUCKUCK	HÈCHÌ YĀJUĀN 褐翅鸦鹃
Centropus sinensis (Stephens)	1:183
HEMIPROCNE	FÈNGTÓUYŪYÀN SHŪ 凤头雨燕属
Die Gattung HEMIPROCNE Nitzsch	1:207
HEMIPROCNIDAE	FÈNGTÓUYŪYÀN KĒ 凤头雨燕科
Die Familie HEMIPROCNIDAE (Baumsegler)	1:207
HEMIPUS	QUÈJUÉ SHŪ 鹊鶡属
Die Gattung HEMIPUS Hodgson	2:43
HERKULESEISVOGEL	BĀNTÓU DÀ CUÌNIÀO 斑头大翠鸟
Alcedo hercules Laubmann	1:211
HETEROPHASIA	QÍMÉI SHŪ 奇鹛属
Die Gattung HETEROPHASIA Blyth	2:247
HETEROSCELUS	→ YÙ SHŪ 韵属
Die Gattung HETEROSCELUS Baird	(1:133)
HIERAAETUS	→ DIĀO SHŪ 鸣属
Die Gattung HIERAAETUS Kaup	(1:53)
HIEROCOCCYX	→ DÙJUĀN SHŪ 杜鹃属
Die Gattung HIEROCOCCYX S. Müller	(1:175)
HIMALAYABAUMLÄUFER	GĀOSHĀN XUĀNMÙQUÈ 高山旋木雀
Certhia himalayana Vigors	2:357; 3:217

HIMALAYABRAUNELLE
Prunella himalayana (Blyth)

HIMALAYAFISCHUHU
Ketupa flavipes (Hodgson)

HIMALAYAGEIER
Gyps himalayensis Hume

HIMALAYAGIRLITZ
Serinus thibetanus (Hume)

HIMALAYAGRÜNLING
Chloris spinoides (Vigors)

HIMALAYAKÖNIGSHUHN
Tetraogallus himalayensis G.R.
Gray

HIMALAYALUBSÄNGER
Phylloscopus affinis (Tickell)

HIMALAYASALANGANE
Collocalia brevirostris (Hors-
field)

HIMALAYASITTICH
Psittacula himalayana (Lesson)

HIMALAYATAUBE
Columba pulchricollis Blyth

HIMANTOPUS
Die Gattung *HIMANTOPUS* Brisson

HINDURACKE
Coracias benghalensis (Linnaeus)

HINDURALLE
Rallina eurizonoides (Lafresnaye)

GĀOYUÁN YÁNLÍU 高原岩鶲
2:116

MÁOJIÀO YÚXIĀO 毛脚魚鶲 . - Volks-
tümliche Bezeichnung (in S-Shensi):
HĒNHÚ 虎頭
1:190; 3:90

WŪJIÙ 兀鵰
1:59

ZĀNG HUÁNGQUÈ 藏黃雀
(2:393)

GĀOSHĀN JĪNCHÌ 高山金翅, auch
GĀOSHĀN JĪNCHÌQUÈ 高山金翅雀
(2:391)

GĀOSHĀN XUĚJĪ 高山雪鶲
1:78

HUÁNGFÙ LIҮYÍNG 黃腹柳鶲 . -
Volkstümliche Bezeichnung (in S-
Shensi): LIҮCHUÀN'R 柳串兒
2:274; 3:190

LÜBÈI JĪNSIYÀN 绿背金丝燕
(1:203-204)

HUĪTÓU YÍNGWÚ 灰头鵟鵠
1:174

HUĪ LÍN GĒ 灰林鵠
1:167

CHÁNGJIÀOYÙ SHÙ 長腳鶲屬
1:144

FÓFĀSĒNG 佛法僧
1:216

BAIHÓU BĀNYĀNGJĪ 白喉斑秧鶲
1:114

HINDUSPINT
Merops viridis Linnaeus

HINDUWEIH
Aviceda jerdoni (Blyth)

HIPPOLAIS
Die Gattung *HIPPOLAIS* Conrad

HIRSEROHRSÄNGER
Acrocephalus sorgophilus (Swinhoe)

HIRTENMAINÄ (HIRTENSTAR)
Acridotheres tristis (Linnaeus)

HIRTENSTAR → HIRTENMAINÄ

HIRUNDAPUS
Die Gattung *HIRUNDAPUS* Hodgson

HIRUNDINIDAE
Die Familie *HIRUNDINIDAE* (Schwal-
ben)

HIRUNDO
Die Gattung *HIRUNDO* Linnaeus

HISTRIONICUS
Die Gattung *HISTRIONICUS* Lesson

HODGSONIUS
Die Gattung *HODGSONIUS* Bonaparte

HODGSONSCHMÄTZER
Saxicola insignis G.R. Gray

HÖCKERSCHNABELENTE
Melanitta deglandi (Bonaparte)

HÖCKERSCHWAN
Cygnus olor (Gmelin)

HÖHLENHÄHER
Pseudopodoces humilis (Hume)

HOHLTAUBE
Columba oenas Linnaeus

LÌTÓU FĒNGHŪ 林头蜂虎
1:215

JUĀNSŪN 鵠隼
1:42

XUĒLÍYÍNG SHŪ 軸翼鳩屬
2:270

XÌWÉN WĒIYÍNG 细纹苇鳩
2:269

JIĀ BĀGĒ 家八哥
2:85

ZHĒNWÉIYÚYÀN SHŪ 针尾雨燕屬
1:204

YĀN KĒ 燕科
2:18; 3:108

→ YĀN SHŪ 燕屬
(2:20)

CHŌUYĀ SHŪ 丑鴞屬
1:38

DUĀNCHÌQÙ SHŪ 短翅鶲屬
2:141

BÁIHÓU SHÍJÍ 白喉石鵠
2:146

BĀNLIĀN HĀIFĀNYĀ 斑脸海番鴨
1:38

YÓUBÍ TIĀNÉ 疣鼻天鹅
1:29

HÈBÈI DÌYĀ 褐背地鵠
(2:100)

ŌU GĒ 欧鸽
1:166

HOPFKUCKUCK	ZHÔNG DÙJUĀN 中杜鹃
Cuculus saturatus Blyth	1:179; 3:86
HOPLOPTERUS	JÌCHÌMÀIJÍ SHÙ 距翅麦鸡属
Die Gattung HOPLOPTERUS Bonaparte	1:124
HÜGELHUHN	HUÁNJÍNG SHÂNZHÈGŪ 环颈山鹧鸪
Arborophila torqueola (Valenciennes)	1:87
HÜHNERVÖGEL (Ordnung) → GALLIFORMES	GALLIFORMES
HUFEISEN-REGENPFEIFER	HÓNGXIÖNG HÉNG 红胸鵠. Dieser Name steht auch für den → WERMUTREGENPFEIFER, Eupoda asiatica (Pallas)
Eupoda veredus (Gould)	(1:130)
HUHN (Sammelbezeichnung)	JÍ 鸡
HYDROBATIDAE	HÀIYÀN KĒ 海燕科
Die Familie HYDROBATIDAE (Sturmschwalben)	1:7
HYDROPHASIANUS	SHUÍZHÌ SHÙ 水雉属
Die Gattung HYDROPHASIANUS Wagler	1:122
HYDROPROGNE	JÙDŌU SHÙ 巨鸥属
Die Gattung HYDROPROGNE Kaup	1:153
HYPGRAMMA	→ HUÀNMÌNIÀO SHÙ 花蜜鸟属
Die Gattung HYPGRAMMA Reichenbach	(2:364)
HYPOTHYMIS	HĒIZHĒNWÁNGWĒNG SHÙ 黑枕王鹟属
Die Gattung HYPOTHYMIS Boie	2:327
HYPsipetes	DUĀNJIĀOBĒI SHÙ 短脚鹛属
Die Gattung HYPsipetes Vigors	(2:49)

IBIDORHYNCHA	HUÁNZUIYÙ SHÙ 鹩嘴鹬属
Die Gattung IBIDORHYNCHA Vigors	1:144
IBIS (1)	CÁIGUÀN SHÙ 彩鹬属
Die Gattung IBIS Lacépède	1:21
IBIS (2) (Sammelbezeichnung)	HUÁN 鹤. - Dieser Ausdruck gilt auch für die Sichler, → BRAUNSICHLER, Plegadis falcinellus (Linnaeus), CÁIHUÁN 彩鹤 (1:23)
→ NIPPON-, SCHWARZHALS-, WARZEN-IBIS	HUÁNZUIYÙ 鹩嘴鹬. - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): XÍGÓULÓU 溪口佬 (1:144)
→ BRUSTBAND-NIMMERSATT, Ibis leucocephalus (Pennant)	IBISSCHNABEL
Ibidorhyncha struthersii Vigors	Ibidorhyncha struthersii Vigors
IBISSE (Familie) → THRESKIORNITHIDAE	YÚDIÀO SHÙ 渔鸥属
ICHTHYOPHAGA	1:58
Die Gattung ICHTHYOPHAGA Lesson	LÍNDIÀO SHÙ 林鵠属
ICTINAETUS	1:56
Die Gattung ICTINAETUS Blyth	HÉPÍNGNIÀO SHÙ 和平鸟属
IRENA	2:63
Die Gattung IRENA Horsfield	HÉPÍNGNIÀO 和平鸟
IRENE (Feenvogel)	2:63
Irena puella (Latham)	→ HÉPÍNGNIÀO KĒ 和平鸟科 (2:61)
IRENIDAE	DÀ SHÁOYÙ 大杓鹬
Die Familie IRENIDAE (Feenvögel)	1:132
ISABELLBACHVOGEL	SHÀ JÍ 沙鵖
Numenius madagascariensis (Linnaeus)	2:149
ISABELLSTEINSCHMÄTZER	
Oenanthe isabellina (Temminck)	

ITHAGINIS
Die Gattung ITHAGINIS Wagler

IXOBRYCHUS
Die Gattung IXOBRYCHUS Billberg

JACANIDAE
Die Familie JACANIDAE (Blatt-hühnchen)

JAGDELSTER
Cissa chinensis (Boddaert)

JAGDFASAN (FASAN)
Phasianus colchicus Linnaeus

JAKOBINERKUCKUCK
Clamator jacobinus (Boddaert)

JANKOWSKIAMMER
Emberiza jankowskii Taczanovski

JAPANBRILLENVOGEL
Zosterops japonicus Temminck et Schlegel

JAPANBUSCHSÄNGER (UGUISU)
Cettia diphone (Kittlitz)

JAPANISCHES MÖWCHEN → SPITZSCHWANZ-BRONZEMÄNNCHEN

JAPANKORMORAN
Phalacrocorax capillatus (Temminck et Schlegel)

XUÈZHÌ SHǔ 血雉属
1:90

WĚIYÁN SHǔ 荇鶲属
1:19

ZHÍHÉNG KĒ 雉形鸟科
1:122

LÁN LÜQUÈ 蓝绿鹊
(2:91)

HUÁNJÍNG ZHì 环颈雉, oder ein-fach ZHì 雉. - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): SHĀNJÍ 山鸡; YÉJÍ 野鸡; ZHÌJÍ 雉鸡
1:102; 3:58

BĀNCΗI FĒNGTÓUJUĀN 斑翅凤头鹃
1:175

LÌBĀNFÙ WŪ 粟斑腹鹀
2:439

ÀNLÚ XIÙYÁNNIĀO 暗绿绣眼鸟.
- Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): BÁIYÁN'R 白眼儿
2:371; 3:219

DUĀNCΗI SHÙYÍNG 短翅树莺
2:253; 3:185

BĀNTÓU LÚCÍ 斑头鳽
(1:10)

JAPANMÖWE
Larus crassirostris Vieillot

JAPANSCHNÄPPER
Cyanoptila cyanomelana (Temminck)

JAPANWACHTEL
Coturnix japonica Temminck et Schlegel

JAVAPFEIFGANS
Dendrocygna javanica (Horsfield)

JERDONSMÄTZER
Saxicola jerdoni (Blyth)

JOTAKANACHTSCHWALBE
Caprimulgus indicus Latham

JUNGFERNKRANICH
Anthropoides virgo (Linnaeus)

JYNX
Die Gattung JYNX Linnaeus

KAHLKOPFGEIER
Sarcogyps calvus (Scopoli)

KAISERADLER
Aquila heliaca Savigny

KALLIOPE → RUBINKEHLCHEN

KAMPFLÄUFER
Philomachus pugnax (Linnaeus)

HĒIWĒI ŌU 黑尾鸥
1:147

BÁIFÙ LÁN WĒNG 白腹蓝鹟
(2:314; 3:202)

ĀNCHŪN (US ĀNCHŪN) 鹤鹑, oder ein-fach CHŪN 鹌. - Die beiden chinesischen Namen gelten auch für die → WACHTEL, Coturnix coturnix (Linnaeus)
1:86; 3:54

SHÙYĀ 树鸭
1:30

HĒIBÁI LÍNJÍ 黑白林鵠
2:148

YÈYÍNG 夜鹰. - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): TIĒSHŪPÍ 贴树皮
1:201; 3:95

SUŌYŪHÈ 翩羽鹤
1:112

YǐLIÈ SHǔ 蚁䴕属
1:221

K

DÀWŪJIÙ 大兀鹫
1:59

BÁIJIĀN DIĀO 白肩雕
1:54; 3:50

LIÚSŪYÙ 流苏鹬
1:143

J

KANSUHÄHERLING
Garrulax sukatschewi (Berezowski et Bianchi)

KAPPENAMMER
Emberiza melanocephala Scopoli

KAPPENLIEST
Halcyon pileata (Boddaert)

KAPPENMÖWE
Larus saundersi (Swinhoe)

KAPPENPITTA
Pitta sordida (P.L.S. Müller)

KARMINFLÜGELHÄHERLING
Liocichla phoenicea Gould

KARMINGIMPEL
Carpodacus erythrinus (Pallas)

KASCHMIRBUSCHSÄNGER
Bradypterus major (Brooks)

KASTANIENALCIPPE
Alcippe castaneiceps (Hodgson)

KASTANIENDROSSEL
Turdus rubrocanus G.R. Gray

KAUZ (Sammelbezeichnung), im Chinesischen mit → EULE identisch
→ BART-, BRAHMA-, FALKEN-, HABICHTS-, MALAIEN-, RAUHFUSS-, SPERLINGS-, STEIN-, TRILLER-, WACHTEL-, WALDKAUZ

KEHLSTREIFENYUHINA
Yuhina gularis Hodgson

HĒIÉ SHĀN ZÀOMÉI 黑额山噪鹛
2:207

HĒITÓU WŪ 黑头鶲
2:431

LÁN FÉICUÌ 蓝翡翠 . - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi):
LÁN YÚGŌU 蓝鱼狗
1:213; 3:99

HĒIZUÌ ÒU 黑嘴鸥
1:151

LUXIÖNG BÄSEDÖNG 绿胸八色鸫
2:4

HÓNGCHÌ SŌUMÉI 红翅薮鹛
2:219

ZHŪQUÈ 朱雀 . - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): Für das Männchen HÓNGMÁLIÀO 红麻料, für das Weibchen QÍNGMÁLIÀO 青麻料
2:412; 3:225

JÙZUÍ DUĀNCHIYÍNG 巨嘴短翅莺
2:260

LÌTÓU QUÈMÉI 栗头雀鹛
2:238

HUÍTÓU DÖNG 灰头鶲
2:161; 3:162

WÉNHÓU FÈNGMÉI 纹喉凤鹛
2:233

KEILSCHWANZ-GRÜNTAUBE
Treron sphenurus (Vigors)

KEILSCHWANZHUHN (Sammelbezeichnung)
→ SIKANG-, SZETSCHWAN-KEILSCHWANZ-HUHN

KEILSCHWANZ-STURMTAUCHER
Puffinus pacificus (Gmelin)

KEILSCHWANZWÜRGER
Lanius sphenocercus Cabanis

KERNBEISSER (1)
Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus)

KERNBEISSER (2) (Sammelbezeichnung)
→ FLECKEN-, GELBSCHENKEL-, KERNBEISSER (1), MASKEN-, SCHWARZSCHWANZ-, WACHHOLDERKERNBEISSER

KETUPA
Die Gattung KETUPA Lesson

KIEBITZ
Vanellus vanellus (Linnaeus)

KIEBITZREGENPFEIFER
Pluvialis squatarola (Linnaeus)

KIEFERNTESSA
Butastur indicus (Gmelin)

KITTA (Sammelbezeichnung)
→ DICKSCHNABEL-, GELBSCHNABEL-, GRAU-, ROTSCHEINABELKITTA

XIĒWĒI LÙJIŪ 楔尾绿鸠
(1:161)

ZHÌCHÚN 雉鹑
(1:79)

YIWĒI HUÒ 鬼尾鸕
1:5

XIĒWĒI BÓLÁO 楔尾伯劳, auch CHÁNGWĒI HUĪ BÓLÁO 长尾灰伯劳
2:70; 3:126

XIZUIQUE 锡嘴雀; auch XIZUI 锡嘴 (besonders in der Umgangssprache)
2:426; 3:230

LÀZUÍ 锯嘴 (Vögel der Gattung EOPHONA); XIZUI 锡嘴 (Vögel der Gattung COCCOTHRAUSTES); NİLÀZUÍ 拟步青嘴 (Vögel der Gattung MYCEROBAS)
2:423; 2:426

YUXIAO SHU 鱼鸮属
1:190

FENGTOUMAIJI 凤头麦鸡
1:123; 3:68

HUIBANHENG 灰斑鸻
(1:125)

HUILIAN KUANGYING 灰脸鵟鹰
1:51; 3:49

LÁNQUÈ 蓝鹊
(2:92)

KIZUKISPECHT	XIÀO XÌNGTÓU ZHUÓMÙNIÀO 小星头 啄木鸟
Dendrocopos kizuki (Temminck)	1:238
KLAPPERGRASMÜCKE	DÖNGBÉI BÁIHÓU YÍNG 东北白喉莺
Sylvia curruca (Linnaeus)	2:272
KLEIBER (1)	PÚTÖNG SHÍ 普通鶲。 - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): CHUĀNSHÙPÍ 穿树皮
Sitta europaea Linnaeus	2:352; 3:215
KLEIBER (2) (Sammelbezeichnung) → BRILLEN-, CHINESEN-, KLEIBER (1)	SHÍ 鹂 (2:350)
RIESEN-, WEISSCHWANZ-, WEISSWAN- GEN-, YÜNNAN-, ZIMTKLEIBER	
KLEIBER (3) (Familie) → SITTIDAE	
KLEINE FELDLERCHE	XIÀO YÚNQUÈ 小云雀。 - Volkstüm- liche Bezeichnung (in S-Shensi):
Alauda gulgula Franklin	ĀLÁN 阿兰 2:16; 3:107
KLEINER ALEXANDERSITTICH → HALS- BANDSITTICH	
KLEINER FREGATTVOGEL	BÁIBÂN JŪNJIÀNNIÀO 白斑军舰鸟
Fregata ariel (G.R. Gray)	1:12
KLEINER GOLDREGENPFEIFER → WAN- DERREGENPFEIFER	
KLEINES SUMPFHUHN	JÍ TIÁNJÍ 姬田鸡
Porzana parva (Scopoli)	1:115
KLEINSPECHT	XIÀO BĀN ZHUÓMÙNIÀO 小斑啄木鸟
Dendrocopos minor (Linnaeus)	1:236
KLIPPENTAUBE	YÁN GĒ 岩鸽
Columba rupestris Pallas	1:165
KNÄKENTE	BÁIMÉI YĀ 白眉鸭
Anas querquedula Linnaeus	1:33; 3:43

KNUTT	HÓNGFÙ BÍNYÙ 红腹滨鹬
Calidris canutus (Linnaeus)	1:140
KOBALTNILTAVA	DÀ XIĀNWĒNG 大仙翁
Niltava grandis (Blyth)	2:315
KOËL	ZÀOJUĀN 噪鹃。 - Volkstümliche Be- zeichnung (in S-Shensi): GŌUWÁ QUÈ 狗娃雀 ; HÓNGWĀ QUÈ 红娃雀
Eudynamys scolopacea (Linnaeus)	1:182; 3:87
KÖNIGSDRONGO	HĒI JUĀNWĒI 黑卷尾。 - Volkstüm- liche Bezeichnung (in S-Shensi): TIĚLIÀNJÍA 铁炼甲 ; TIĚ YÀNZǐ 铁 燕子 2:75; 3:128
Dicrurus macrocercus Vieillot	
KÖNIGSFASAN	CHÁNGWĒIZHÌ 长尾雉, oder BÁI- GUĀN CHÁNGWĒIZHÌ 白冠长尾雉。 - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): HUĀJÍ 花鸡 ; HUÀJÍ 画鸡
Syrmaticus reevesii (J.E. Gray)	1:107; 3:59
KÖNIGSHUHN (Sammelbezeichnung) → HIMALAYA-KÖNIGSHUHN, → TIBET- KÖNIGSHUHN	XUËJÍ 雪鸡。 - Dies ist zugleich der spezifische Name für das → TIBET-KÖNIGSHUHN, Tetraogallus tibetanus Gould (1:77)
Parus spilonotus Bonaparte	HUÁNGJÍA SHĀNQUÈ 黄颊山雀
KOHLMEISE	(2:334)
Parus major Linnaeus	BÁILIĀN SHĀNQUÈ 白脸山雀, auch DÀ SHĀNQUÈ 大山雀。 - Volkstüm- liche Bezeichnung (in S-Shensi): ZÍBÓ 呼伯 2:331; 3:207
KOKIL	LÜZUǐ DÌJUĀN 绿嘴地鹃
Rhopodytes tristis (Lesson)	(1:182)
KOKLASFASAN	SHÁOJÍ 叫鸡。 - Volkstümliche Be- zeichnung (in S-Shensi): GUĀLĀJÍ 呱啦鸡, SÔNGJÍ 松鸡
Pucrasia macrolopha (Lesson)	1:100; 3:57

KOLBENENTE	CHÌZUĪ-QIÁNYĀ 赤嘴潜鸭
Netta rufina (Pallas)	1:34
KOLKRABE	DÙ YĀ 渡鴟
Corvus corax Linnaeus	2:109
KOREAGOLDSCHNÄPPER	BÁIMÉI WĒNG 白眉翁
Ficedula zanthopygia (Hay)	2:307; 3:199
KORMORAN (1)	LÚCÍ 鸬鷺, auch PŪTŌNG LÚCÍ 普通鶲鷺. - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): SHUĬ LÀOYĀ 水老鷺, YÚ YÍNG 魚鷺
Phalacrocorax carbo (Linnaeus)	1:10; 3:30
KORMORAN (2) (Sammelbezeichnung) → JAPANKORMORAN und KORMORAN (1) sowie MEERSCHARBE, MOHRENSCHARBE und ROTGESICHTSCHARBE	LÚCÍ 鸬鷺 (1:9)
KORMORANE (Familie) → PHALACROCORACIDAE	BÁIWĒI YÀO 白尾鷺. - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): HUĬYÍNG 灰鷺
KORNWEIHE	1:61; 3:50
Circus cyaneus (Linnaeus)	HÓNGCHÌ FÈNGTÓUJUĀN 红翅凤头鹃
KOROMANDELKUCKUCK	1:175; 3:84
Clamator coromandus (Linnaeus)	WŪ JIÀOXIĀO 乌角鸮
KOROMANDELUHU	1:189
Bubo coromandus (Latham)	ZÀNG WŪ 藏鷹
KOSLOWAMMER	2:443
Emberiza koslowi Bianchi	KĒSHÌ CÀOMÉI 柯氏草鶲
KOSLOWBABAX	2:200
Babax koslowi (Bianchi)	ZÀNGQUÈ SHŪ 藏雀属
KOZLOWIA	2:414
Die Gattung KOZLOWIA Bianchi (heute gewöhnlich als Untergattung der Gattung CARPODACUS Kaup angesehen)	

KRABBENTRIEL	SHÍHÉNG 石鶴
Burhinus recurvirostris (Cuvier)	(1:146)
KRÄHENMEISE	HÓNGZUĪYĀQUÈ 红嘴鸦雀
Conostoma aemodium Hodgson	2:187; 3:169
KRÄHENSCHNABELDRONGO	YĀZUĪ JUĀNWĒI 鸦嘴卷尾
Dicrurus annectans (Hodgson)	2:77
KRAGENENTE	CHÓUYĀ 丑鴞
Histrionicus histrionicus (Linnaeus)	1:38
KRAGENTRAPPE	BÔBĀN BĀO 波斑鸨
Chlamydotis undulata (Jacquin)	(1:122)
KRANICH (1)	HUĬ HÈ 灰鹤
Grus grus (Linnaeus)	1:110; 3:61
KRANICH (2) (Sammelbezeichnung) → JUNGFERN-, KRANICH (1), MANDSCHU-REN-, MÖNCHS-, NONNEN-, SARUS-, SCHWARZHALS-, WEISSNACKENKRANICH	HÈ 鹤 (1:110)
KRANICHE (Familie) → GRUIDAE	
KRANICHVÖGEL (Ordnung) → GRUIFORMES	
KRAUSKOPFPELIKAN	JUĀNYŪ TÍHÚ 卷羽鹈鹕
Pelecanus crispus Bruch	(1:9)
KREISCHBEKASSINE	ÀONÁN SHĀZHUI 澳南沙锥
Gallinago hardwickii (J.E. Gray)	(1:138)
KREUZSCHNABEL (Sammelbezeichnung) → BINDEN-, FICHTENKREUZSCHNABEL	JIĀOZUĪ 交嘴
	(2:415)
KRICKENTE	LÜCHÌ YĀ 绿翅鸭. - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): BĀYĀ 巴鸭, XIĀO SHUĬYĀ 小水鸭
Anas crecca Linnaeus	1:31; 3:40
KRONENLAUBSÄNGER	MIĀN LIŪYÍNG 楔柳莺. - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): LIŪCHUÀN'R 柳串儿
Phylloscopus coronatus (Temminck et Schlegel)	2:286; 3:195

KUCKUCK (1)
Cuculus canorus Linnaeus

DÙJUĀN 杜鹃 . - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): BĀOGŪ QUÈ 包谷雀 ; BÙGŪ 布谷 ; KĒGŪ 喀咗
1:178; 3:85

KUCKUCK (2) (Sammelbezeichnung)
→ AMETHYST-, BENGALEN-, BRAUNBAUCH-, (1:175)

DRONGO-, FLUCHT-, GACKEL-, HECKEN-,
HOPF-, JAKOBINER-, KOËL, KOKIL,
KOROMANDEL-, KUCKUCK (1), KURZFLÜ-,
GEL-, SPERBER-, PRACHTKUCKUCK

KUCKUCKE (Familie) → CUCULIDAE

KUCKUCKSVÖGEL (Ordnung) → CUCULIFORMES

KUHREIHER
Bubulcus ibis (Linnaeus)

NIÚBÈILÙ 牛背鹭 . - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): HUÁNG-TÓU LÙ 黄头鹭
1:15; 3:34

KUPFERSCHMIED (ROTSCHEITEL-BART-VOGEL)

Megalaima haemacephala (P.L.S. Müller)

KUPPERTAUBE
Columba punicea Blyth

Zǐ LÍN GĒ 紫林鸽
1:167

KURZFLÜGEL (Sammelbezeichnung)
→ BERG-, BRAUNRÜCKEN-, ZWERGKURZ-FLÜGEL

KURZFLÜGELKUCKUCK
Hierococcyx micropterus (Gould)

SÍSHĒNG DÙJUĀN 四声杜鹃 . - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): GUĀN-GÒNG HÀOKŪ 关公好哭 ; WĀN-DÒU BÀGĒ 豌豆八哥
(1:177; 3:85)

KURZFUSS-WASSERLÄUFER
Tringa guttifer (Nordmann)

XIÀO QÍNGJIÀO YÙ 小青脚鹬
1:135

KURZSCHNABEL-MENNIGVOGEL
Pericrocotus brevirostris (Vigors)

KURZSCHWANZALBATROS
Diomedea albatrus Pallas

KURZSCHWANZ-BUSCHSÄNGER
Urosphena squameiceps (Swinhoe)

KURZSCHWANZ-PAPAGEIMEISE → KURZ-SCHWANZ-PAPAGEISCHNABEL

KURZSCHWANZ-PAPAGEISCHNABEL (KURZ-SCHWANZ-PAPAGEIMEISE)
Paradoxornis davidianus (Slater)

KURZZEHENLERCHE
Calandrella brachydactyla (Leisler)

KUTTENGEIER → MÖNCHSGEIER

LACHMÖWE
Larus ridibundus Linnaeus

LACHSEESCHWALBE
Gelochelidon nilotica (Gmelin)

LÄMMERGEIER → BARTGEIER

LÄRMHÄHERLING
Garrulax maesi (Oustalet)

LÄTZCHENHÄHERLING
Garrulax moniliger (Hodgson)

LAGOPUS
Die Gattung *LAGOPUS* Brisson

LANGSCHNABELDROSSEL
Zoothera marginata Blyth

DUĀNZUÌ SHĀNJIĀONIÀO 短嘴山椒鸟
2:46

DUĀNWĒI XÌNTIĀNWĒNG 短尾信天翁
1:4

LÍNTÓU SHÙYÍNG 鳞头树莺
(2:252)

GUÀDŪN YĀQUÈ 掛墩鸦雀
2:195

XIÀO SHĀBĀILÍNG 小沙百灵
(2:7; 3:106)

L

HÓNGZUÌ ŌU 红嘴鸥
1:150; 3:75

ZÀOŌU 噪鸥 , auch ŌUZUÌ YÀN'ŌU
鸥嘴燕鸥
1:153

HÈXIĀNG ZÀOMÉI 褐胸噪鹛
2:204

XIÀO HĒILÍNG ZÀOMÉI 小黑领噪鹛
2:202

LÉINIĀO SHŪ 雷鸟属
1:74

CHÁNGZUÌ SHĀNDÖNG 长嘴山杓
2:168

LANGSCHNABEL-EIORA
Aegithina lafresnayei (Hartlaub)

LANGSCHNABEL-REGENPFEIFER
Charadrius placidus J.E. et G.R.
Gray

LANGSCHNABELSÄBLER
Pomatorhinus hypoleucus (Blyth)

LANGSCHWANZ-BERGDROSSEL
Zoothera dixoni (Seeböhm)

LANGSCHWANZ-BREITMAUL
Psarisomus dalhousiae (Jameson)

LANGSCHWANZ-MENNIGVOGEL
Pericrocotus ethologus Bangs et
Phillips

LANGSCHWANZ-NACHTSCHWALBE
Caprimulgus macrurus Horsfield

LANGSCHWANZ-SCHNEIDERVOGEL
Orthotomus sutorius (Pennant)

LANGSCHWANZSITTICH
Psittacula longicauda (Boddaert)

LANGSCHWANZ-ZAUNKÖNIGTIMALIE
Spelaeornis chocolatinus (Godwin-
Austen et Walden)

LANGZEHEN-STRANDLÄUFER
Calidris subminuta (Middendorff)

LANIIDAE
Die Familie LANIIDAE (Würger)

LANIUS
Die Gattung LANIUS Linnaeus

LAPPENTAUCHER (1) (Sammelbezeich-
nung)
→ HAUBEN-, OHREN-, ROTHALS-,

DÀLÜ QUÈBĒI 大绿雀鵙
2:61

JIĀN HÉNG 剑鹤, auch CHÁNGZUÍ HÉNG
长嘴鹤
(1:126; 3:69)

CHÁNGZUÍ GŌUZUÍMÉI 长嘴钩嘴鹛
2:174

CHÁNGWÉI SHĀNDōNG 长尾山鹛
2:167

CHÁNGWÉI KUÒZUÍNIÀO 长尾阔嘴鸟
2:2

CHÁNGWÉI SHĀNJIĀONIÀO 长尾山椒
鸟
2:46; 3:120

CHÁNGWÉI YÈYÍNG 长尾夜鹰
1:202

FÉNGYÉYÍNG 缝叶莺, auch CHÁNGWÉI
FÉNGYÉYÍNG 长尾缝叶莺
2:298

CHÁNGWÉI YīNGWǔ 长尾鹦鹉
1:174

CHÁNGWÉI LIÁOMÉI 长尾鹩鹛
2:178

CHÁNZHǐ BīNYÙ 长趾滨鹬
1:141; 3:73

BÓLÁO KĒ 伯劳科
2:65; 3:124

BÓLÁO SHŪ 伯劳属
2:65

PÌTĪ 鹈鹕
(1:2)

SCHWARZHALS-, ZWERGTAUCHER
→ PÌTĪ

LAPPENTAUCHER (2) (Familie) → PO-
DICIPEDIDAE

LAPPENTAUCHER (3) (Ordnung) → PO-
DICIPEDIFORMES

LARIDAE
Die Familie LARIDAE (Möwen)

LARIFORMES
Die Ordnung LARIFORMES (Möwen-
vögel)

LARUS
Die Gattung LARUS Linnaeus

LARVIVORA
Die Gattung LARVIVORA Hodgson

LASURMEISE
Parus cyanus Pallas

LATOUCHEORNIS
Die Gattung LATOUCHEORNIS Bangs

LAUBMEISE
Sylviparus modestus Burton

LAUBSÄNGER (1) → NORDISCHER LAUB-
SÄNGER

LAUBSÄNGER (2) (Sammelbezeichnung
für die Arten der Gattung PHYLLO-
SCOPUS)

→ BART-, DAVID-, DORN-, DUNKEL-,
GELBBRAUN-, GELBBRUST-, GOLDBIN-
DEN-, GOLDHÄHNCHEN-, GRAUEHL-,
GRÜN-, HIMALAYA-, KRONEN-, PAMIR-,
SCHLUCHTEN-, STREIFENKOPF-, USSURI-,
WANDER (NORDISCHER)-, WEISSCHWANZ-
LAUBSÄNGER sowie → ZILPZALP

ŌU KĒ 鸥科
1:146; 3:75

ŌU-XÍNG MÙ 鸥形目
1:146; 3:75

ŌU SHŪ 鸥属
1:146

→ GĒQÚ SHŪ 歌鸲属
(2:123)

HUÍLÁN SHĀNQUÈ 灰蓝山雀
2:336

→ WŪ SHŪ 鸲属
(2:429)

HUÁNGMÉI LÍNQUÈ 黄眉林雀
2:345

LIÜYÍNG 柳莺
(2:274)

LAUBSÄNGER (3) (Sammelbezeichnung für die Arten der Gattung → SEI-CERCUS Swainson und → ABROSCOPUS Stuart Baker)
→BAMBUS-, BRILLEN-, GRAUKOPF-, GRAUWANGEN-, GRÜNKOPF-, ROTKOPF-, ROSTWANGEN-, SCHWARZWANGEN-LAUB-SÄNGER

LAUFHÜHNCHEN (1) (Sammelbezeichnung) SĀNZHÍCHÚN 三趾鹑
→ WACHTELLAUFHÜHNCHEN (1), (1:109)
→ BINDEN-, ROTNACKEN-, SPITZSCHWANZ-LAUFHÜHNCHEN

LAUFHÜHNCHEN (2) (Ordnung) → TURNICIFORMES

LAZULISCHNÄPPER (MEERBLAUER FLIEGENSCHNÄPPER Eumyias thalassina (Swainson)

LEIOOTHRIX Die Gattung LEIOOTHRIX Swainson 2:220

LEPTOPOECILE Die Gattung LEPTOPOECILE Severtzov 2:295

LEPTOPTilos Die Gattung LEPTOPTilos Lesson 1:23

LERCHE (Sammelbezeichnung) → BERGKALANDER-, BUSCH-, FELD-, HAUBEN-, KLEINE FELD-, KURZZEHEN-, MONGOLEN-, OHREN-, STUMMEL-, SUMPF-, TIBET-, TSCHILILERCHE
YÚNQUÈ 云雀. - Dieser Ausdruck ist auch der Artnname der → FELD- LERCHE, Alauda arvensis Linnaeus.
BÁILÍNG 百灵 (in Peking auch BÁILÍNG oder BÁILÍNG'R gesprochen) wird vornehmlich für die Angehörigen der Gattung MELANOCORYPHA verwendet und ist Artnname der stattlichen → MONGOLENLERCHE, Melanocorypha mongolica (Pallas)

LERCHEN (Familie) → ALAUDIDAE

WĒNGYÍNG 鹩鶯
(2:291)

LERWA	XUĚCHÚN SHŪ 雪鹑属
Die Gattung LERWA Hodgson	1:76
LEUCOSTICTE	DÌQUÈ SHŪ 地雀属
Die Gattung LEUCOSTICTE Swainson	2:396
Liest (Sammelbezeichnung, Gattung → HALCYON)	FĚICUI 鹩翠 (1:212)
→ BRAUN-, FEUER-, GRÜNKOPF-, KAPPENLiest	
LIMICOLA	KUÒZUÍYÙ SHŪ 阔嘴鹬属
Die Gattung LIMICOLA Koch	1:143
LIMNODROMUS	BÀNPŪYÙ SHŪ 半蹼鹬属
Die Gattung LIMNODROMUS Wied	1:136
LIMOSA	CHÉNGYÙ SHŪ 威鹬属
Die Gattung LIMOSA Brisson	1:132
LINARIA	→ JÍNCHÌ SHŪ 金翅属
Die Gattung LINARIA Bechstein	(2:390)
LIOCICHLA	SŌUMÉI SHŪ 数鹤属
Die Gattung LIOCICHLA Swinhoe	2:219
LOBIVANELLUS	RÒUCHUÍMÀIJÍ SHŪ 肉垂麦鸡属
Die Gattung LOBIVANELLUS G.R. Gray	1:124
LOCUSTELLA	HUÁNGYÍNG SHŪ 蝗莺属
Die Gattung LOCUSTELLA Kaup	2:263
LÖFFELENTE	PÍZUÍ YĀ 紫嘴鸭
Anas clypeata Linnaeus	1:34
LÖFFELSTRANDLÄUFER	SHÁOZUÍYÙ 勺嘴鹬属
Calidris pygmea (Linnaeus)	(1:143)
LÖFFLER (1)	BÁI PÍLÙ 白琵鹭
Platalea leucorodia Linnaeus	1:25
LÖFFLER (2) (Sammelbezeichnung) → LÖFFLER (1), → SCHWARZSTIRN-LÖFFLER	PÍLÙ 琵鹭 (1:25)

LÖNNBERGMÖWE	HĒITÓU ŌU 黑头鸥	MÄUSEBUSSARD	KUÁNG 鸢
Larus relictus Lönnberg	(1:150)	Buteo buteo (Linnaeus)	1:50
LONCHURA	WÉNNIÀO SHÙ 文鸟属	MAINA (Sammelbezeichnung)	BĀGĒ 八哥
Die Gattung LONCHURA Sykes	2:386	→ DSCHUNGEL-, HALSBAND-, HAUBEN-, HIRTENMAINAS	(2:85)
LOPHOBASILEUS	FÈNGTÓUQUÈYÍNG SHÙ 凤头雀莺属	MALABAR-BLÜTENPICKER → MALABAR-MISTELFRESSER	
Die Gattung LOPHOBASILEUS Pleske	2:297	MALABAR-MISTELFRESSER (MALABAR-BLÜTENPIKFER)	CHÚNSÈ ZHUÓHUĀNIÀO 纯色啄花鸟
LOPHOPHORUS	HÓNGZHÌ SHÙ 虹雉属	Dicaeum concolor Jerdon	2:361
Die Gattung LOPHOPHORUS Temminck	1:94	MALAIENADLER	LÍNDIÀO 林雕
LOPHOTRIORCHIS	→ DIĀO SHÙ 鸲属	Ictinaetus malayensis (Temminck)	1:56
Die Gattung LOPHOTRIORCHIS Sharpe	(1:53)	MALAIENBAUMFALKE	MĚNG SŪN 猛隼
LOPHURA	XIÁN SHÙ 鸳属	Falco severus Horsfield	1:69
Die Gattung LOPHURA Fleming	1:97	MALAIENKAUZ	HÈ LÍNXIĀO 褐林鸮
LORICULUS	DUĀNWĒIYÍNGWÚ SHÙ 短尾alcon属	Strix leptogrammica (Temminck)	1:196
Die Gattung LORICULUS Blyth	1:174	MALAIENPRINIE	HÈ SHĀN JIĀOYÍNG 褐山鸮莺
LOXIA	JIĀOZUĪ SHÙ 交嘴属	Prinia polychroa (Temminck)	2:305; 3:198
Die Gattung LOXIA Linnaeus	2:415	MALAIENRALLE	BĀNYĀNGJĪ 斑秧鸡
LUCHSNACHTSCHWALBE	JIĀOYÈYÍNG 角夜鹰	Rallina fasciata (Raffles)	1:114
Eurostopodus macrotis (Vigors)	1:201	MALAIENSTORCH (ADJUTANT)	TŪGUÀN 兔鹤
LUSCINIA	→ GĒQUÍ SHÙ 歌鸲属	Leptoptilos javanicus (Horsfield)	1:23
Die Gattung LUSCINIA T. Forster	(2:123)	MANDARINENTE	YUĀNYĀNG (US YUĀNYĀNG) 鸳鸯
LYMNOCRYPTES	JÍYÙ SHÙ 姬鹟属	Dendronessa galericulata (Linnaeus)	(1:36)
Die Gattung LYMNOCRYPTES Kaup	1:139	MANDARINSTAR	HUĪBÈI LIÁNGNIÀO 灰背椋鸟
LYRURUS	QÍNJÍ SHÙ 琴鸡属	Sturnia sinensis (Gmelin)	(2:81)
Die Gattung LYRURUS Swainson	1:73	MANDARINSUMPFHUHN	LÌXIÖNG TIÁNJÍ 栗胸田鸡
	M	Porzana paykullii (Ljungh)	1:116
MACRONUS → MIXORNIS Blyth	JUĀNJIŪ SHÙ 鸲鸠属	MANDSCHURENAMMER	HÓNGJÍNG WĒI WŪ 红颈苇鷈
MACROPYGIA	1:167	Emberiza yessoensis (Swinhoe)	2:444
Die Gattung MACROPYGIA Swainson		MANDSCHURENDOMMEL	ZÍBÈI WĒIYÁN 紫背苇鳽
		Ixobrychus eurhythmus (Swinhoe)	1:19

MANDSCHURENKRANICH <i>Grus japonensis</i> (P.L.S. Müller)	DĀNDÌNG HÈ 丹顶鹤, auch XIĀN HÈ 仙鹤 1:111
MANDSCHURENRALLE <i>Coturnicops exquisitus</i> (Swinhoe)	HUÀYĀNGJÍ 花秧鸡 (1:117)
MANGROVEREIHER <i>Butorides striatus</i> (Linnaeus)	LÜLÜ 绿鹭 1:13; 3:32
MANYARWEBER <i>Ploceus manyar</i> (Horsfield)	WÉNXIÖNG ZHĪBÙNIÀO 纹胸织布鸟 2:384
MARMELALK <i>Brachyramphus marmoratus</i> (Gmelin)	BĀNHĀIQÜÈ 斑海雀 1:159
MARONENTAUBE <i>Macropygia phasianella</i> (Temminck)	WŪ JUĀNJIŪ 乌鹃鵙 1:168
MASKENAMMER <i>Emberiza spodocephala</i> Pallas	HUÍTÓU WŪ 灰头鹀 2:434; 3:233
MASKENBAUMELSTER <i>Dendrocitta frontalis</i> Horsfield	HĒIÉ SHÙQUÈ 黑额树鹊 (2:97)
MASKENGIMPEL <i>Pyrrhula erythaca</i> Blyth	CHÌXÌÖNG HUÍQUÈ 赤胸灰雀 2:421; 3:228
MASKENHÄHERLING <i>Garrulax perspicillatus</i> (Gmelin)	HĒILIĀN ZÀOMÉI 黑脸噪鹛 2:200; 3:173
MASKENKERNBEISSE	HĒITÓU LÀZUÍQUÈ 黑头蜡嘴雀 , auch DÀ HĒITÓU LÀZUÍQUÈ 大黑头 蜡嘴雀 2:423/424; 3:229
MASKENRAUPENFÄNGER <i>Coracina novae-hollandiae</i> (Gmelin)	DÀ JUĀNJUÉ 大鹃鵙 2:41
MAUERLÄUFER (1) <i>Tichodroma muraria</i> (Linnaeus)	HÓNGCHÌ XUÁNBÌQUÈ 红翅旋壁雀 . - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): PÁSHÙNIÀO 爬树鸟, sowie PÁYÁNNIÀO 爬岩鸟 2:355; 3:216

MANDSCHURENKRANICH <i>Grus japonensis</i> (P.L.S. Müller)	DĀNDÌNG HÈ 丹顶鹤, auch XIĀN HÈ 仙鹤 1:111	MAUERLÄUFER (2) (Familie) → TICHO-DROMIDAE	→ SHÍKĒ 鹳科 (2:350)
MANDSCHURENRALLE <i>Coturnicops exquisitus</i> (Swinhoe)	HUÀYĀNGJÍ 花秧鸡 (1:117)	MAUERSEGLER <i>Apus apus</i> (Linnaeus)	YÚYÀN 雨燕, auch LÓUYÀN 楼燕. - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): YÉYÀN 野燕 1:205; 3:97
MANGROVEREIHER <i>Butorides striatus</i> (Linnaeus)	LÜLÜ 绿鹭 1:13; 3:32	MEENATAUBE <i>Streptopelia orientalis</i> (Latham)	SHĀN BĀNJIŪ 山斑鸠. - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): BĀNJIŪ 斑鸠 1:168; 3:80
MANYARWEBER <i>Ploceus manyar</i> (Horsfield)	WÉNXIÖNG ZHĪBÙNIÀO 纹胸织布鸟 2:384	MEERBLAUER FLIEGENSCHNÄPPER → LA-ZULISCHNÄPPER	HĀI LÚCÍ 海鸬鹚 1:10
MARMELALK <i>Brachyramphus marmoratus</i> (Gmelin)	BĀNHĀIQÜÈ 斑海雀 1:159	MEERSCHARBE <i>Phalacrocorax pelagicus</i> Pallas	NÍZHUÓMÙ SHÙ 拟啄木属 1:219
MARONENTAUBE <i>Macropygia phasianella</i> (Temminck)	WŪ JUĀNJIŪ 乌鹃鵙 1:168	MEGALAIMA Die Gattung MEGALAIMA G.R. Gray	DÀWÉIYÍNG SHÙ 大尾莺属 2:262
MASKENAMMER <i>Emberiza spodocephala</i> Pallas	HUÍTÓU WŪ 灰头鹀 2:434; 3:233	MEGALURUS Die Gattung MEGALURUS Horsfield	MÁOJIÀOYÀN 毛脚燕. - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): YÁNYÀN (1) 岩燕 2:24; 3:111
MASKENBAUMELSTER <i>Dendrocitta frontalis</i> Horsfield	HĒIÉ SHÙQUÈ 黑额树鹊 (2:97)	MEHLSCHWALBE <i>Delichon urbica</i> (Linnaeus)	SHĀNQUÈ 山雀 (2:331)
MASKENGIMPEL <i>Pyrrhula erythaca</i> Blyth	CHÌXÌÖNG HUÍQUÈ 赤胸灰雀 2:421; 3:228	MEISE (Sammelbezeichnung, Gattungen PARUS und AEGITHALOS) → BERGKOHL-, BIRKEN-, BUNT-, DAVID-, FICHTEN-, FORMOSA-, GRAU-KOPF-SCHWANZ-, KÖNIGS-, KOHL-, LASUR-, ROSTKAPPEN-SCHWANZ-, ROST-WANGEN-SCHWANZ-, SCHMUCK-, SCHWANZ-, SUMPF-, TANNEN-, WEIDEN-, WEISS-BRAUENMEISE → BEUTELMEISE (Gattung → REMIZ), 1 Art → FEUERKOPFMEISE (Gattung → CEPHALOPYRUS), 1 Art	
MASKENHÄHERLING <i>Garrulax perspicillatus</i> (Gmelin)	HĒILIĀN ZÀOMÉI 黑脸噪鹛 2:200; 3:173		
MASKENKERNBEISSE	HĒITÓU LÀZUÍQUÈ 黑头蜡嘴雀 , auch DÀ HĒITÓU LÀZUÍQUÈ 大黑头 蜡嘴雀 2:423/424; 3:229		
MASKENRAUPENFÄNGER <i>Coracina novae-hollandiae</i> (Gmelin)	DÀ JUĀNJUÉ 大鹃鵙 2:41		
MAUERLÄUFER (1) <i>Tichodroma muraria</i> (Linnaeus)	HÓNGCHÌ XUÁNBÌQUÈ 红翅旋壁雀 . - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): PÁSHÙNIÀO 爬树鸟, sowie PÁYÁNNIÀO 爬岩鸟 2:355; 3:216		

→ GOLDSCHOPFMEISE (SULTANSMEISE)
(Gattung → MELANOCHLORA), 1 Art
→ LAUBMEISE (Gattung → SYLVIPARUS),
1 Art
→ KLEIBER (2), 8 Arten
→ BARTMEISE (Gattung → PANURUS,
eine Timalie)
→ KRÄHENMEISE (Gattung → CONOSTOMA,
eine Timalie)
→ PAPAGEIMEISE (Gattung → PARADOXOR-
NIS etc., ebenfalls zu den Tima-
lien gehörig)

MEISEN (Familie) → PARIDAE

MEISENAMMER (SCHWANZGIMPEL)

Urocynchramus pylzowi Przevalski

MEISENGIMPEL

Carpodacus sibiricus (Pallas)

MEISENYUHINA (ZWERGTIMALIE)

Yuhina nigrimenta Blyth

MELANITTA

Die Gattung MELANITTA Boie

MELANOCHLORA

Die Gattung MELANOCHLORA Lesson

MELANOCORYPHA

Die Gattung MELANOCORYPHA Boie

MELOPHUS

Die Gattung MELOPHUS Swainson (am besten als Untergattung der Gattung → EMBERIZA Linnaeus zu betrachten)

MENNIGVOGEL (Sammelbezeichnung)
→ GRAUKINN-, GRAU-, KURZSCHNABEL-,

LANGSCHWANZ-, ROSEN-, SCHARLACH-

MENNIGVOGEL

ZHŪWŪ 朱鵙

2:429

CHÁNGWÉIQUÈ 长尾雀

(2:417; 3:227)

HĒIKĒ FÈNGMÉI 黑额凤鹛

(2:235)

HĀIFĀNYĀ SHŪ 海番鸭属

1:38

MIĀNQUÈ SHŪ 冕雀属

2:345

BĀILÍNG SHŪ 百灵属

2:9

FÈNGTÓUQUÈ SHŪ 凤头雀属

2:447

SHĀNJIĀONIÀO 山椒鸟

(2:43)

MERGUS

Die Gattung MERGUS Linnaeus

MERLEN (Sammelbezeichnung, Gattung

MONTICOLA)

→ AMURRÖTEL, BLAUMERLE, RÖTEL-
MERLE, STEINRÖTEL

MERLIN

Falco columbarius Linnaeus

MEROPIDAE

Die Familie MEROPIDAE (Spinte oder
Bienenfresser)

MEROPS

Die Gattung MEROPS Linnaeus

MICROHIERAX

Die Gattung MICROHIERAX Sharpe

MICROPTERNUS

Die Gattung MICROPTERNUS Blyth

MICROSARCOPS

Die Gattung MICROSARCOPS Sharpe

MICROSCELIS → HYPsipetes

MIDDENDORFFSCHWIRL

Locustella ochotensis (Middendorff)

MIKADOFASAN

Syrmaticus mikado (Ogilvie-Grant)

MILAN (Sammelbezeichnung)

→ SCHWARZMILAN

MILVUS

Die Gattung MILVUS Lacépède

MINLA

Die Gattung MINLA Hodgson

MIRAFRA

Die Gattung MIRAFRA Horsfield

QIŪSHĀYĀ SHŪ 秋沙鸭属

1:39

JĪDŌNG 琚鶲

(2:152)

HUĬBÈI SŪN 灰背隼

1:69

FĒNGHŪ KĒ 蜂虎科

1:214

FĒNGHŪ SHŪ 蜂虎属

1:214

XIĀOSŪN SHŪ 小隼属

1:65

LÌZHŪOMÙ SHŪ 栗啄木属

1:223

HUĬTÓUMÀIJĪ SHŪ 灰头麦鸡属

1:124

BĚI HUÁNGYÍNG 北煌莺

2:264

HĒI CHÁNGWÉIZHÌ 黑长尾雉

1:107

YUĀN 鸢

(1:43)

YUĀN SHŪ 鸢属

1:43

XīMÉI SHŪ 希鹛属

2:229

GĒBĀILÍNG SHŪ 歌百灵属

2:5

MISTELDROSSEL	XIÈ DÔNG 楊鶲
Turdus viscivorus Linnaeus	2:165
MISTELFRESSER (1) (Familie) → DI-CAEIDAE	
MISTELFRESSER (2) (Sammelbezeichnung) → FEUERBRUST-, GELBBAUCH-, GELB-STEISS-, MALABAR-, SCHARLACH-MISTELFRESSER	ZHUÓHUĀNIÀO 噴花鳥 (2:360)
MITTELREIHER	ZHÔNG BÁILÙ 中白鷺 (1:17)
Casmerodus intermedius (Wagler)	
MITTELSÄGER	HÓNGXIÖNG QIÜSHÄYÄ 紅胸秋沙鴨 1:40
Mergus serrator Linnaeus	
MIXORNIS	WÉNXIÖNGMÉI SHÜ 紹胸鶲屬 (2:183)
Die Gattung MIXORNIS Blyth	
MÖNCHSGEIER (KUTTENGEIER)	TÜJIÙ 兔鷹 . - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): GÖUTÓU-DIÀO 狗頭鵟; ZUOSHÄNDIÀO 生山鵟 1:59; 3:50
Aegypius monachus (Linnaeus)	
MÖNCHSKRANICH	BÁITÓU HÈ 白頭鶲 1:111
Grus monacha Temminck	
MÖWCHE, JAPANISCHES → SPITZSCHWANZ-BRONZEMÄNNCHEN	
MÖWE (Sammelbezeichnung) → BEHRING-, DREIZEHEN-, EIS-, FISCH-, (1:146)	ŌU 鴉
JAPAN-, KAPPEN-, LACH-, LÖNNBERG-, ROSEN-, SCHIEFERRÜCKEN-, SILBER-, STURM-, TIBETLACH-, ZWERGMÖWE	
MÖWEN (Familie) → LARIDAE	
MÖWENVÖGEL (Ordnung) → LARIFORMES	
MOHRENGIMPEL	JÍNTÓU HĒIQUÈ 金头黑雀 Pyrrhocryptes epaulette (Hodgson) 2:419

MISTELDROSSEL	XIÈ DÔNG 楊鶲	MOHRENSCHARBE	HĒIJÍNG LÚCÍ 黑颈鶲鶲
Turdus viscivorus Linnaeus	2:165	Phalacrocorax niger (Vieillot)	1:11
MISTELFRESSER (1) (Familie) → DI-CAEIDAE		MOHRENSCHWARZKEHLCHEN	BÁIBÂN HĒI SHÍJÍ 白斑黑石鶲
MISTELFRESSER (2) (Sammelbezeichnung) → FEUERBRUST-, GELBBAUCH-, GELB-STEISS-, MALABAR-, SCHARLACH-MISTELFRESSER	ZHUÓHUĀNIÀO 噴花鳥 (2:360)	Saxicola caprata (Linnaeus)	2:148
MITTELREIHER	ZHÔNG BÁILÙ 中白鷺 (1:17)	MONGOLENBUSSARD	DÀ KUÁNG 大鷺 . - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): HUĀBÀO 花豹; LÀOYÍNG 老鷺 1:49; 3:48
Casmerodus intermedius (Wagler)		Buteo hemilasius Temminck et Schlegel	
MITTELSÄGER	HÓNGXIÖNG QIÜSHÄYÄ 紅胸秋沙鴨 1:40	MONGOLENGIMPEL	MÒQUÈ 漠雀 (2:400)
Mergus serrator Linnaeus		Bucanetes mongolicus (Swinhoe)	
MIXORNIS	WÉNXIÖNGMÉI SHÜ 紹胸鶲屬 (2:183)	MONGOLENHÄHER	HĒIWÉI DÌYÄ 黑尾地鴟 2:99
Die Gattung MIXORNIS Blyth		Podoces hendersoni Hume	
MÖNCHSGEIER (KUTTENGEIER)	TÜJIÙ 兔鷹 . - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): GÖUTÓU-DIÀO 狗頭鵟; ZUOSHÄNDIÀO 生山鵟 1:59; 3:50	MONGOLENLERCHE	BÁILÍNG 百靈 2:10
Aegypius monachus (Linnaeus)		Melanocorypha mongolica (Pallas)	MËNGGU SHÄ HÉNG 蒙古沙鶲 1:128
MÖNCHSKRANICH	BÁITÓU HÈ 白頭鶲 1:111	MONGOLENREGENPFEIFER	BĚI LIÁNGNIÀO 北椋鳥 . - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): YÀN BĀGÉ 燕八哥 (2:81; 3:130)
Grus monacha Temminck		Charadrius mongolus Pallas	
MÖWCHE, JAPANISCHES → SPITZSCHWANZ-BRONZEMÄNNCHEN		MONGOLENSTAR	JÍDÖNG SHÜ 斑鶲屬 2:152
MÖWE (Sammelbezeichnung) → BEHRING-, DREIZEHEN-, EIS-, FISCH-, (1:146)	ŌU 鴉	Sturnia sturnina (Pallas)	XUÉQUÈ SHÜ 雪雀屬 2:379
JAPAN-, KAPPEN-, LACH-, LÖNNBERG-, ROSEN-, SCHIEFERRÜCKEN-, SILBER-, STURM-, TIBETLACH-, ZWERGMÖWE		MONTICOLA	BÁIYÄN QIÁNYÄ 白眼潛鴨 1:35; 3:43
MÖWEN (Familie) → LARIDAE		Die Gattung MONTICOLA Boie	LÉINIÀO 雷鳥 1:74
MÖWENVÖGEL (Ordnung) → LARIFORMES		MONTIFRINGILLA	XIÀO JIÀOMÉI 小鷦鷯 2:179; 3:168
MOHRENGIMPEL	JÍNTÓU HĒIQUÈ 金头黑雀 Pyrrhocryptes epaulette (Hodgson) 2:419	Die Gattung MONTIFRINGILLA C.L. Brehm	XIAOZUI HÉNG 小嘴行鴟 (1:131)
		MOORENTE	
		Aythya nyroca (Güldenstädt)	
		MOORSCHNEEHUHN	
		Lagopus lagopus (Linnaeus)	
		MOOSTIMALIE	
		Pnoepyga pusilla Hodgson	
		MORNELLREGENPFEIFER	
		Eudromias morinellus (Linnaeus)	

MORRISONHÄHERLING	YUSHĀN ZÀOMÉI 玉山噪鹛	MYCEROBAS	NILAZUÍ SHŪ 拟蜡嘴属
Garrulax morrisonianus (Ogilvie-Grant)	2:217	Die Gattung MYCEROBAS Cabanis	2:427
MOTACILLA	JÍLÍNG SHŪ 鹩鶲属	MYIOMELA → CINCLIDIUM	
Die Gattung MOTACILLA Linnaeus	2:34	MYOPHONUS	XIÀODÖNG SHŪ 喜鹊属
MOTACILLIDAE	JÍLÍNG KĒ 鹩鶲科	Die Gattung MYOPHONUS Temminck et Laugier	2:155
Die Familie MOTACILLIDAE (Stelzen)	2:26; 3:111	MYZORNIS	LÜMÉI SHŪ 绿鵙属
MUGIMAKISCHNÄPPER (TANNENSCHNÄPPER)	QÚ WĒNG 鸲鶣	Die Gattung MYZORNIS Blyth	2:222
Ficedula mugimaki (Temminck)	2:308		
MUPINDROSSEL	GĒ DÖNG 歌鵙, auch BÀOXÍNG GĒ DÖNG 宝兴歌鵙		N
Turdus mupinensis Laubmann	2:166; 3:164		
MUPINIE	BÀOXÍNG MÉIQUÈ 宝兴鹛雀	NACHTIGALL (1) Luscinia megarhynchos C.L. Brehm	XINJIĀNG GĒQÚ 新疆歌鵙
Chrysomma poecilotis (Verreaux)	2:186	NACHTIGALL (2) (Sammelbezeichnung, im Chinesischen einschließlich → BLAUKEHLCHEN, RUBINKEHLCHEN und ALPENRUBINKEHLCHEN)	GĒQÚ 歌鵙 (2:123)
MUSCICAPA	→ WĒNG SHŪ 翁属	→ BLAU-, DAVID-, NACHTIGALL (1), ORANGE-, ROSTKEHL-, ROTKOPF-, SCHWIRRNACHTIGALL	
Die Gattung MUSCICAPA Brisson	(2:321)	NACHTREIHER	YÉLÜ 夜鹭
MUSCICAPIDAE	WĒNG KĒ 翁科	Nycticorax nycticorax (Linnaeus)	1:17; 3:35
Die Familie MUSCICAPIDAE (Sänger)	2:121	NACHTSCHWALBE [Sammelbezeichnung, gleichbedeutend mit → ZIEGENMELKER (3)]	YÉYING 夜鹰 (1:201)
MUSCICAPINAE	WĒNG YÀKĒ 翁亚科	→ JOTAKA-, LANGSCHWANZ-, LUCHS-, PHARAONEN-, SAVANNENNACHTSCHWALBE	
Die Unterfamilie MUSCICAPINAE (Fliegenschnäpper)	2:306	NACKTKEHL-BUSCHWACHTEL	ZÖNGXIÖNG SHĀNZHÈGŪ 棕胸山鹧鸪
Die Familie MONARCHIDAE (Monarchen), für die bisher in der chinesischen ornithologischen Literatur noch kein Name vorhanden ist, wird von den Ornithologen Chinas bislang noch zu den MUSCICAPINAE - hier die Gattungen HYPO-THYMIS, TERPSIPHONE, RHIPIDURA, CULICICAPA und CHELIDORYNX - gerechnet		Arborophila brunneopectus (Blyth)	(1:88)
MUSKATAMADINE → MUSKATFINK		NAPOTHERA	DÖNGMÉI SHŪ 鸮鵙属
MUSKATFINK (MUSKATAMADINE)	BĀN WĒNNIÃO 斑文鸟	Die Gattung NAPOTHERA G.R. Gray	2:175
Lonchura punctulata (Linnaeus)	2:387	NASHORNALK	JIĀOZUÍHĀIQŪ 角嘴海雀
		Cerorhinca monocerata (Pallas)	1:159

NASHORNVÖGEL (Familie) → BUCEROTIDAE

NASHORNOVÖGEL (Sammelbezeichnung)
→ DOPPELHORNVOGEL, → TRAUERHORNVOGEL

NAUMANNDROSSEL (Einschließlich ROSTFLÜGELDROSSEL)
Turdus naumanni Temminck

NEBELKRÄHE → AASKRÄHE

NECTARINIA
Die Gattung NECTARINIA Illiger

NECTARINIIDAE
Die Familie NECTARINIIDAE (Nektarvögel)

NEKTARVÖGEL (Familie) → NECTARINIIDAE

NEKTARVOGEL (Sammelbezeichnung)
→ BLAUNACKEN-, FEUERSCHWANZ-, GOULD-, GRÜNSCHWANZ-, HAINAN-, ROTOHRS-, SCHARLACH(GELBRÜCKEN)-, SCHMUCK-, SCHWARZKEHL-NEKTARVOGEL

NEPALBEKASSINE
Gallinago nemoricola Hodgson

NETTA
Die Gattung NETTA Kaup

NETTAPUS
Die Gattung NETTAPUS Brandt

NEUNFARBENPITTA
Pitta brachyura (Linnaeus)

NILGANS
Alopochen aegyptiacus (Linnaeus)

XĪNIÀO 犀鸟. - Dies ist zugleich der spezifische Name für den → DOPPELHORNVOGEL, *Buceros bicornis* Linnaeus (1:218)

BĀN DÖNG 斑鶲. - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): CHUĀNCÀOJĪ 穿草鸡; SHÁ HUÀMÉI 傻画眉
2:164; 3:163

→ HUĀMÌNÀO SHŪ 花蜜鸟属
(2:364)

TÀIYÁNGNIÀO KĒ 太阳鸟科
2:364; 3:219

TÀIYÁNGNIÀO 太阳鸟
(2:365)

LÍN SHĀZHUI 林沙锥
(1:138)

CHÌZUǐ-QIÁNYÀ SHŪ 赤嘴潜鸭属
1:34

MIÁNFÚ SHŪ 棉凫属
1:37

LÁNCHÌ BĀSÈDÖNG 蓝翅八色鸫
2:3

TŪYÀN 壳雁
1:31

NILTAVA
Die Gattung NILTAVA Hodgson

NINOX
Die Gattung NINOX Hodgson

NIPPONIA
Die Gattung NIPPONIA Reichenbach

NIPPONIBIS
Nipponia nippon (Temminck)

NISAETUS
Die Gattung NISAETUS Hodgson

NODDI
Anous stolidus (Linnaeus)

NONNENKRANICH
Grus leucogeranus Pallas

NONNENSTEINSCHMÄTZER
Oenanthe pleschanka (Lepechin)

NORDISCHER LAUBSÄNGER → WANDERLAUBSÄNGER

NUCIFRAGA
Die Gattung NUCIFRAGA Brisson

NUMENIUS
Die Gattung NUMENIUS Brisson

NYCTEA
Die Gattung NYCTEA Stephens

NYCTICORAX
Die Gattung NYCTICORAX T. Forster

NYCTYORNIS
Die Gattung NYCTYORNIS Jardine et Selby

→ XIĀNWĒNG SHŪ 仙翁属
(2:315)

YÍNGXIÀO SHŪ 鹰鸮属
1:193

ZHŪHUÁN SHŪ 朱鹮属
1:24

ZHŪHUÁN 朱鹮. - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): HÓNGHÈ 红鹤
1:24; 3:37

YÍNGDIÀO SHŪ 鹰雕属
(1:52)

BÁIDÍNG HĒIYÀN'ŌU 白顶黑燕鸥
1:157

BÁIHÉ 白鹤
1:112

BÁIDÍNG JÍ 白顶鶲
(2:151; 3:158)

XÍNGYĀ SHŪ 星鸦属
2:100

SHÁOYÙ SHŪ 峨鹃属
1:131

XUĚXIÀO SHŪ 雪鸮属
1:190

→ YÈLÙ SHŪ 夜鹭属
1:17

YEFÉNGHŪ SHŪ 夜蜂虎属
1:216

OCEANODROMA	CHĀWÉI-HÁIYÀN SHŪ 叉尾海燕属
Die Gattung OCEANODROMA Reichenbach	1:7
ODINSHÜHNCHEN	HÓNGJÍNG BÀNPÚYÙ 红颈瓣蹼鹬
Phalaropus lobatus (Linnaeus)	1:145
OENANTHE	JÍ SHŪ 鹮属
Die Gattung OENANTHE Vieillot	2:149
OENOPPELIA	HUÓBĀNJIŪ SHŪ 火斑鳽属
Die Gattung OENOPPELIA Blanford (Gattungsbezeichnung für eine heute nicht mehr von → STREPTOPELIA Bonaparte getrennte Taube)	1:172
OHRENLERCHE	JIĀOBĀILÍNG 角百灵
Eremophila alpestris (Linnaeus)	2:11
OHRENTAUCHER	JIĀO PÌTĪ 角䴙䴘属
Podiceps auritus (Linnaeus)	(1:3)
OHRFASAN (Sammelbezeichnung) → BLAUER-, BRAUNER-, SCHMALSCHWANZ-	MĀJĪ 马鸡. - [Dies ist zugleich der spezifische Name für den → SCHMALSCHWANZ-OHRFASAN, Crossoptilon crossoptilon (Hodgson)]
OHRFASAN	(1:95)
OLIGURA	→ DÌYÍNG SHŪ 地莺属
Die Gattung OLIGURA Hodgson	(2:250)
OLIBUSCHSÄNGER	YÍSÈ SHÙYÍNG 异色树莺
Cettia flavigula (Blyth)	2:255; 3:186
OLIVFLUCHTVOGEL	QĀNLĀNLÙ DUĀNJIĀOBĒI 橄榄绿短脚鵙
Hypsipetes charlottae (Finsch)	(2:49)
OLIVRÜCKEN-DSCHUNGELSCHNÄPPER	GĀNLĀNBÈI LÍNWĒNG 橄榄背林鵙
Rhinomyias olivacea (Hume)	2:306
OMEIHÄHERLING	HUÍXIÖNG SÖUMÉI 灰胸薮鹛
Liocichla omeiensis Riley	2:220

ORANGENACHTIGALL	LIFÚ GĒQÚ 栗腹歌鸲
Larvivora brunnea Hodgson	(2:125; 3:146)
ORIOLIDAE	HUÁNGLÍ KĒ 黄鹂科
Die Familie ORIOLIDAE (Pirole)	2:72; 3:127
ORIOLUS	HUÁNGLÍ SHŪ 黄鹂属
Die Gattung ORIOLUS Linnaeus	2:72
OROANASSA	→ YÈLÙ SHŪ 夜鹭属
Die Gattung OROANASSA Peters	(1:17)
ORPHEUSFLUCHTVOGEL	LIĚR DUĀNJIĀOBĒI 栗耳短脚鵙
Hypsipetes amaurotis (Temminck)	(2:49)
ORTHOTOMUS	FÉNGYÈYÍNG SHŪ 缝叶莺属
Die Gattung ORTHOTOMUS Horsfield	2:297
ORTOLAN	PŪ WŪ 圃鹀
Emberiza hortulana Linnaeus	2:436
OTIDIDAE	BĀO KĒ 鸥科
Die Familie OTIDIDAE (Trappen)	1:120
OTIDIFORMES	BĀO-XÍNG MÙ 鸥形目
Die Ordnung OTIDIFORMES (Trappen)	1:120
OTIS	→ BĀO SHŪ 鸥属
Die Gattung OTIS Linnaeus	(1:120)
→ CHLAMYDOTIS, → TETRAX	
OTUS	JIĀOXIĀO SHŪ 角鸮属
Die Gattung OTUS Pennant	1:184
P	
PADDA	HÉQUÈ SHŪ 禾雀属
Die Gattung PADDA Reichenbach	2:386
PALMENSEGLER	ZÔNGYŪYÀN 棕雨燕
Cypsiurus parvus (Lichtenstein)	1:207

PALMTAUBE (SENEGALTAUBE)	ZŌNG BĀNJIŪ 棕斑鳩
Streptopelia senegalensis (Linnaeus)	1:172
PAMIRLAUBSÄNGER	HUĪ LIŪYÍNG 灰柳莺
Phylloscopus griseolus Blyth	2:276
PANDION	È SHŪ 鹗属
Die Gattung PANDION Savigny	1:64
PANURUS	WÉNXŪQUÈ SHŪ 文须雀属
Die Gattung PANURUS Koch	2:186
PAPAGEI (Sammelbezeichnung)	YīNGWŪ 鹦鹉
→ SITTICH, → FRÜHLINGSPAPAGEICHEN	(1:173)
PAPAGEIEN (1) (Familie) → PSITTACIDAE	
PAPAGEIEN (2) (Ordnung) → PSITTACIFORMES	
PAPAGEIMEISE → PAPAGEISCHNABEL	
PAPAGEISCHNABEL (PAPAGEIMEISE), (Sammelbezeichnung)	YĀQUÈ 鸽雀
→ BRAUNKOPF-, BRILLEN-, DREIZEHEN-, EINFARB-, GELBSTIRN-, GRAUKOPF-, GRAUOHR-, KURZSCHWANZ-, PRZEVALSKI-, SCHOPF-, SCHWARZKEHL-, YANGTSE-, ZAPPEY-PAPAGEISCHNABEL	(2:188)
PAPAGEISCHNABELTAUBE	HÒUZUĪ SHĀNJIŪ 厚嘴山鳩
Treron curvirostra (Gmelin)	1:163
PAPAGEISCHNÄBEL (Familie) → PARADOXORNITHIDAE	
PARADISSCHNÄPPER	SHÒUDÀI 寿带, auch SHÒUDÀINIĀO
Terpsiphone paradisi (Linnaeus)	寿带鸟. - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): BĀLIÀN 巴练; LIĀNGSHĀNBÓ 梁山伯; ZǐLIÀN 紫练 2:328; 3:206

PARADOXORNIS	→ YĀQUÈ SHŪ 鸽雀属
Die Gattung PARADOXORNIS Gould	(2:188)
PARADOXORNITHIDAE	→ HUĀMÉI KĒ 画眉科
Die Familie PARADOXORNITHIDAE (Papageischnäbel)	(2:169)
PARIDAE	→ SHĀNQUÈ KĒ 山雀科
Die Familie PARIDAE (Meisen)	(2:331; 3:207)
PARUS	SHĀNQUÈ SHŪ 山雀属
Die Gattung PARUS Linnaeus	2:331
PASSER	MÁQUÈ SHŪ 麻雀属
Die Gattung PASSER Brisson	2:373
PASSERIDAE	→ WÉNNIĀO KĒ 文鸟科
Die Familie PASSERIDAE (Sperlinge)	(2:373; 3:221)
PASSERIFORMES	QUÈ-XÍNG MÙ 雀形目
Die Ordnung PASSERIFORMES (Singsvögel, Sperlingsvögel)	3:106
PASTOR	→ LIĀNGNIĀO SHŪ 棕鸟属
Die Gattung PASTOR Temminck	(2:80)
PAVO	KŌNGQUÈ SHŪ 孔雀属
Die Gattung PAVO Linnaeus	1:109
PAZIFIKSEGLER	BÁIYĀO YŪYÀN 白腰雨燕. - Volks-tümliche Bezeichnung (in S-Shensi): BÁIWÉIBÀ YŪYÀN = BÁIYÍBÀ YŪYÀN 白尾巴雨燕
Apus pacificus (Latham)	1:206; 3:96
PEKINGSÄNGER	SHĀNMÉI 山鹛
Rhopophilus pekinensis (Swinhoe)	2:246; 3:184
PELECANIDAE	TÍHÚ KĒ 鹈鹕科
Die Familie PELECANIDAE (Pelikane)	1:8
PELECANIFORMES	TÍ-XÍNG MÙ 鹈形目
Die Ordnung PELECANIFORMES (Ruderfüßer)	1:7; 3:30

PELECANUS	TÍHÚ SHŪ 鹈鹕属	PFEIFENTE	CHÌJÍNG YĀ 赤颈鶲
Die Gattung PELECANUS Linnaeus	1:8	Anas penelope Linnaeus	1:33; 3:43
PELIKAN (Sammelbezeichnung)	TÍHÚ 鹈鹕	PFUHLSCHNEPFE	BĀNWÉI CHÉNGYÙ 斑尾塍鹬
→ GRAU-, KRAUSKOPF-, ROSAPELIKAN	1:8	Limosa lapponica (Linnaeus)	1:133
PELIKANE (Familie) → PELECANIDAE		PHAETHON	MÉNG SHŪ 鸳属
PELLORNEUM	YŌUMÉI SHŪ 细嘴属	Die Gattung PHAETHON Linnaeus	1:7
Die Gattung PELLORNEUM Swainson	2:169	PHAETHONTIDAE	MÉNG KĒ 鸳科
PERDIX	SHĀNCHŪN SHŪ 山鹑属	Die Familie PHAETHONTIDAE (Tropikvögel)	1:7
Die Gattung PERDIX Brisson	1:82	PHALACROCORACIDAE	LÚCÍ KĒ 鸬鹚科
PERICROCOTUS	SHĀNJIĀONIĀO SHŪ 山椒鸟属	Die Familie PHALACROCORACIDAE (Kormorane)	1:9; 3:30
Die Gattung PERICROCOTUS Boie	2:43	PHALACROCORAX	LÚCÍ SHŪ 鸬鹚属
PERISOREUS	ZÀOYĀ SHŪ 噪鹛属	Die Gattung PHALACROCORAX Brisson	1:9
Die Gattung PERISOREUS Bonaparte	2:88	PHALAROPODIDAE	BÀNPŪYÙ KĒ 斑蹼鹬科
PERLHALSTAUBE	ZHŪJÍNG BĀNJIŪ 珠颈斑鸠。- Volks-	Die Familie PHALAROPODIDAE (Wassertreter)	1:145
Streptopelia chinensis (Scopoli)	tümliche Bezeichnung (in S-Shensi): HUĀ BĀNJIŪ 花斑鸠；GŪGŪ 叽 叽 1:170; 3:82	PHALAROPUS	BÀNPŪYÙ SHŪ 斑蹼鹬属
PERLHUHNFRANKOLIN	ZHÈGŪ 鹧鸪	Die Gattung PHALAROPUS Brisson	1:145
Francolinus pintadeanus (Scopoli)	1:82	PHARAONENNACHTSCHWALBE	ĀIJÍ YÈYÍNG 埃及夜鹰
PERNIS	FĒNGYÍNG SHŪ 蜂鹰属	Caprimulgus aegyptius Lichtenstein	1:202
Die Gattung PERNIS Cuvier	1:42	PHASIANIDAE	ZHÌ KĒ 雉科
PETRONIA	SHÍQUÈ SHŪ 石雀属	Die Familie PHASIANIDAE (Fasanenartige)	1:76; 3:53
Die Gattung PETRONIA Kaup	2:378	PHASIANUS	ZHÌ SHŪ 雉属
PETSCHORAPIEPER	BĚI LIÙ 北鹨	Die Gattung PHASIANUS Linnaeus	1:101
Anthus gustavi Swinhoe	2:29	PHILOMACHUS	LIÚSŪYÙ SHŪ 流苏鹬属
PFAU (Sammelbezeichnung)	KÖNGQUÈ 孔雀	Die Gattung PHILOMACHUS Merrem	1:143
→ ÄHRENTRÄGERPFAU	(1:109)	PHOENICURUS	HÓNGWÉIQÚ SHŪ 红尾鸲属
PFAUFASAN → GRAUER PFAUFASAN	XIÀODÖNG 喙东	Die Gattung PHOENICURUS T. Forster	2:134
PFEIFDROSSEL (Sammelbezeichnung)	(2:155)	PHRAGAMATICOLA	LÚYÍNG SHŪ 芦莺属
→ FORMOSA-, PURPURPFEIFDROSSEL		Die Gattung PHRAGAMATICOLA Jerdon	2:269

PHYLLOSCOPUS	LIÜYÍNG SHŪ 柳莺属
Die Gattung PHYLLOSCOPUS Boie	2:274
PICA	QUÈ SHŪ 鹊属
Die Gattung PICA Brisson	2:95
PICIDAE	ZHUÓMÙNIAO KĒ 啄木鸟科
Die Familie PICIDAE (Spechte)	1:221; 3:100
PICIFORMES	LIÈ-XÍNG MÙ 鸟形目
Die Ordnung PICIFORMES (Spechtvögel)	1:219; 3:100
PICOIDES	SĀNZHÍZHUÓMÙ SHŪ 三趾啄木属
Die Gattung PICOIDES Lacépède	1:239
PICUS	LÜZHUÓMÙ SHŪ 绿啄木属
Die Gattung PICUS Linnaeus	1:224
PIEPER (Sammelbezeichnung)	LIU 鹊
→ BAUM-, BERG-, BRACH-, GODELEWSKI-, (2:26)	
PETSCHORA-, ROSEN-, ROTKEHL-, SPORN-, WALD-, WASSERPIEPER	
PINICOLA	SÖNGQUÈ SHŪ 松雀属
Die Gattung PINICOLA Vieillot	2:414
PIROL (1)	JÍN HUÁNGLÍ 金黄鹂
Oriolus oriolus (Linnaeus)	2:73
PIROL (2) (Sammelbezeichnung)	HUÁNGLÍ 黄鹂
→ BLUT-, PIROL (1), SCHWARZKOPF-, SCHWARZNACKEN-, SEIDENPIROL	(2:72)
PIROLE (Familie) → ORIOLIDAE	
PITTA (1) (Sammelbezeichnung)	BĀSÈDÖNG 八色鸫
→ BLAUNACKEN-, BLAURÜCKEN-, BRAUN-	(2:2)
KOPF-, KAPPEN-, NEUNFARBEN-, SICHEL-	
PITTA	
PITTA (2)	BĀSÈDÖNG SHŪ 八色鸫属
Die Gattung PITTA Vieillot	2:2
PITTAS (Familie) → PITTIDAE	

PITTIDAE	BĀSÈDÖNG KĒ 八色鸫科
Die Familie PITTIDAE (Pittas)	2:2
PLATALEA	PÍLÜ SHŪ 鹮属
Die Gattung PLATALEA Linnaeus	1:25
PLECTROPHENAX	XUĚWŪ SHŪ 雪鹀属
Die Gattung PLECTROPHENAX Stejneger	2:449
PLEGADIS	CÀIHUÁN SHŪ 彩鹮属
Die Gattung PLEGADIS Kaup	1:24
PLOCEIDAE	→ WÉNNIÃO KĒ 文鸟科
Die Familie PLOCEIDAE (Webervögel)	(2:373; 3:221)
PLOCEUS	ZHĪBÙNIÃO SHŪ 织布鸟属
Die Gattung PLOCEUS Cuvier	2:384
PLUVIALIS	→ HÉNG SHŪ 衍属
Die Gattung PLUVIALIS Brisson	(1:125)
PNOEOPYGA	JIĀOMÉI SHŪ 鸢鶲属
Die Gattung PNOEOPYGA Hodgson	2:178
PODICEPS	→ PÌTÌ SHŪ 鹂鶲属
Die Gattung PODICEPS Latham	(1:2)
PODICIPEDIDAE	PÌTÌ KĒ 磬鸟属科
Die Familie PODICIPEDIDAE (Lappen-taucher oder Steißfüße)	3:29
PODICIPEDIFORMES	PÌTÌ MÙ 磬鸟属目
Die Ordnung PODICIPEDIFORMES (Lappen-taucher oder Steißfüße)	(1:2); 3:29
PODOCES	→ DÌYĀ SHŪ 地鸫属
Die Gattung PODOCES Fischer	(2:99)
POLARBIRKENZEISIG	JÍBÉI ZHŪDÍNGQUÈ 极北朱顶雀
Acanthis hornemannii (Holböll)	(2:394)
[eine Rassengruppe des → BIRKEN-ZEISIG, Acanthis flammea (Linnaeus)]	
POLYPLECTRON	KÖNGQUÈZHÌ SHŪ 孔雀雉属
Die Gattung POLYPLECTRON Temminck	1:108

POLYSTICTA	→ RÓNGYĀ SHŪ 绒鸭属
Die Gattung POLYSTICTA Eyton	(1:37)
POMATORHINUS	GŌUZUİMÉI SHŪ 钩嘴鹛属
Die Gattung POMATORHINUS Horsfield	2:170
PORPHYRIO	ZÍSHUIJÍ SHŪ 紫水鸡属
Die Gattung PORPHYRIO Brisson	1:119
PORZANA	TIÁNJÍ SHŪ 田鸡属
Die Gattung PORZANA Vieillot	1:115
PRACHTAMMER	HUÁNGMÉI WŪ 黄眉鹀
Emberiza chrysophrys Pallas	2:442
PRACHTFINKEN (Familie) → ESTRILDAE	
PRACHTHÄHERLING	LÌSÈ ZÀOMÉI 丽色噪鹛
Garrulax formosus (Verreaux)	2:217
PRACHTKUCKUCK	CUÌ JĪNUĀN 翠金鹃
Chrysococcyx maculatus (Gmelin)	(1:181)
PRACHTTAUCHER	LÜHÓU QIÁNNIǎO 绿喉潜鸟
Gavia arctica (Linnaeus)	1:1
PRINIA	JIÀOYÍNG SHŪ 鸫莺属
Die Gattung PRINIA Horsfield	2:301
PRINIE (Sammelbezeichnung)	JIÀOYÍNG 鸫莺
→ BERG-, BRAUNKOPF-, GELBBAUCH-, GRAUBRUST-, MALAIEN-, ROST-, SCHWARZKEHLPRINIE	(2:301)
PRINZENHÄHERLING	HUÍFÙ ZÀOMÉI 灰腹噪鹛
Garrulax henrici (Oustalet)	2:216
PRINZENSCHNÄPPER	ZÍ SHÒUDÀI 紫寿带, auch ZÍ SHÒU-DÀINIǎO 紫寿带鸟
Terpsiphone atrocaudata (Eyton)	2:329
PROCELLARIIDAE	HUò KĒ 鸱科
Die Familie PROCELLARIIDAE (Sturmvögel)	1:5

PROCELLARIIFORMES	HUò-XÍNG MÙ 鸱形目
Die Ordnung PROCELLARIIFORMES (Röhrennasen)	1:4
PROPYRRHULA	YUÁNQUÈ SHŪ 原雀属
Die Gattung PROPYRRHULA Hodgson (heute gewöhnlich als Untergattung der Gattung PINICOLA Vieillot be- trachtet)	2:418
PRUNELLA	YÁNLIŪ SHŪ 岩鹨属
Die Gattung PRUNELLA Vieillot	2:114
PRUNELLIDAE	YÁNLIŪ KĒ 岩鹨科
Die Familie PRUNELLIDAE (Braunellen)	2:114; 3:142
PRZEVALSKI-PAPAGEIMEISE → PRZE- VALSKI-PAPAGEISCHNABEL	
PRZEVALSKI-PAPAGEISCHNABEL (PRZE- VALSKI-PAPAGEIMEISE)	HUÍGUĀN YĀQUÈ 灰冠鸦雀
Paradoxornis przewalskii (Bere- zowski et Bianchi)	2:193
PSARISOMUS	KUÒZUÍNIǎO SHŪ 阔嘴鸟属
Die Gattung PSARISOMUS Swainson	2:2
PSEUDAEDON	→ GĒQÚ SHŪ 歌鸽属
Die Gattung PSEUDAEDON Buturlin	(2:123)
PSEUDIBIS	HĒIHUÁN SHŪ 黑鶲属
Die Gattung PSEUDIBIS Hodgson	1:24
PSEUDOGLYPHS	NÍWÙJIÙ SHŪ 拟兀鹫属
Die Gattung PSEUDOGLYPHS Sharpe, eine Untergattung der Gattung GYPS Savigny	(1:60)
PSEUDOPODOCES	→ DÌYĀ SHŪ 地鵟属
Die Gattung PSEUDOPODOCES Zarudny et Loudon	(2:99)
PSITTACIDAE	YÍNGWŪ KĒ 鹦鹉科
Die Familie PSITTACIDAE (Papageien)	1:173

PSITTACIFORMES	YÍNG-XÍNG MÙ 鹦形目	PURPURREIHER	CÁO LÜ 草鷺 . - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): HUÍZHUĀNG 反栓
Die Ordnung PSITTACIFORMES (Papageien)	1:173	Ardea purpurea Linnaeus	1:12; 3:32
PSITTACULA	YÍNGWÚ SHŪ 鹦鹉属	PURPURSCHNÄPPERDROSSEL	ZÍ KUĀNZUÍDÖNG 紫宽嘴鶲
Die Gattung PSITTACULA Cuvier	1:173	Cochoa purpurea Hodgson	2:146
PTEROCLES → EREMIALECTOR		PYCNONOTIDAE	BĒI KĒ 鸲科
PTEROCLIDAE	SHĀJĪ KĒ 沙鸡科	Die Familie PYCNONOTIDAE (Bülbüls)	2:48; 3:121
Die Familie PTEROCLIDAE (Flughühner)	1:159	PYCNONOTUS	BĒI SHŪ 鸲属
PTEROCLIFORMES	SHĀJĪ MÙ 沙鸡目	Die Gattung PYCNONOTUS Boie	2:53
Die Ordnung PTEROCLIFORMES (Flughühner)	1:159	PYRRHOCORAX	SHĀNYĀ SHŪ 山鶲属
PTERODROMA	YUÁNWĒIHUÒ SHŪ 园尾鹱属	Die Gattung PYRRHOCORAX Tunstall	(2:102)
Die Gattung PTERODROMA Bonaparte	1:6	PYRRHOPECTES	HĒIQUÈ SHŪ 黑雀属
PTERUTHIUS	JUÉMÉI SHŪ 跳鹤属	Die Gattung PYRRHOPECTES Hodgson	2:419
Die Gattung PTERUTHIUS Swainson	2:223	PYRRHULA	HUÍQUÈ SHŪ 灰雀属
PTILINOPUS	GUÓJIŪ SHŪ 果鸠属	Die Gattung PYRRHULA Brisson	2:420
Die Gattung PTILINOPUS Swainson	1:163	RABENKRÄHE → AASKRÄHE	R
PTYONOPROGNE	YÁNYÀN SHŪ 岩燕属	RABENVÖGEL (Familie) → CORVIDAE	
Die Gattung PTYONOPROGNE Reichenbach	2:23	RACKE (Sammelbezeichnung)	FÓFASÉNG 佛法僧 (für die Arten der
PUCRASIA	SHÁOJĪ SHŪ 勺鸡属	→ BLAURACKE, → HINDURACKE (beide Gattung CORACIAS);	Gattung CORACIAS). [FÓFASÉNG ist zugleich der spezifische Name für die → HINDURACKE, Coracias benghalensis (Linnaeus)]
Die Gattung PUCRASIA G.R. Gray	1:100	→ DOLLARVOGEL (Gattung EURYSTOMUS)	(1:216)
PUFFINUS	→ HUÒ SHŪ 鸬属, → JIĀNSHUIHUÒ SHŪ 剪水鹱属 (1:5)	RACKEN (Familie) → CORACIIDAE	
Die Gattung PUFFINUS Brisson		RACKENVÖGEL (Ordnung) → CORACIFORMES	
PURPURHÄHNCHEN	HUĀCÁI QUÈYÍNG 花彩雀莺		
Leptopoecile sophiae Severtzov	2:295		
PURPURHUHN	ZÍSHUÍJÍ 紫水鸡		
Porphyrio porphyrio (Linnaeus)	1:119		
PURPURFEIFDROSSEL	ZÍ XIAODÖNG 紫啸鸫		
Myophonus caeruleus (Scopoli)	2:155; 3:159		

RALLE (Sammelbezeichnung)	YĀNGJĪ 梭鸡.	Dies ist zugleich der spezifische Name für die
→ GRAUBRUST-, HINDU-, MALAIEN-, MANDSCHUREN-, WASSERRALLE	→ WASSERRALLE, <i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus	
→ KIELRALLE (AMAUORNIS),		
→ SUMPFHUHN, → WACHTELKÖNIG	(1:112)	
RALLEN (1) (Familie) → RALLIDAE		
RALLEN (2) (Ordnung) → RALLIFORMES		
RALLIDAE	YĀNGJĪ KĒ 梭鸡科	
Die Familie RALLIDAE (Rallen)	1:112	
RALLIFORMES	YĀNGJĪ MŪ 梭鸡目	
Die Ordnung RALLIFORMES (Rallen)	1:112	
RALLINA	BĀNYĀNGJĪ SHŪ 斑梭鸡属	
Die Gattung RALLINA G.R. Gray	1:114	
RALLUS	YĀNGJĪ SHŪ 梭鸡属	
Die Gattung RALLUS Linnaeus	1:112	
RAUBSEESCHWALBE (RIESENSEESCHWALBE)	HÓNGZUÍ JÙDŌU 红嘴巨鸥	
Hydroprogne caspia (Pallas)	(1:153)	
RAUBWÜRGER (GRAUWÜRGER)	HUĪ BÓLÁO 灰伯劳	
Lanius excubitor Linnaeus	2:69	
RAUCHSCHWALBE	JIĀ YÀN 家燕. - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): YÀNZÌ 燕子	
Hirundo rustica Linnaeus	2:20; 3:109	
RAUHFUSSBUSSARD	MÁOJIǎO KUÁNG 毛脚𫛭	
Buteo lagopus (Pontoppidan)	1:51; 3:49	
RAUHFUSSHÜHNER (Familie) → TETRAONIDAE		
RAUHFUSSKAUZ	GUǐXIĀO 鬼鸮	
Aegolius funereus (Linnaeus)	1:200	
REBHUHN (1)	SHĀNCHÚN 山鹑	
Perdix perdix (Linnaeus)	1:83	

REBHUHN (2) (Sammelbezeichnung)	SHĀNCHÚN 山鹑. - Dies ist zugleich der spezifische Name für das → REBHUHN (1), <i>Perdix perdix</i> (Linnaeus)	
→ BARTREBHUHN, → TIBETREBHUHN	(1:83)	
RECURVIROSTRA	FĀNZUÍYÙ SHŪ 反嘴鹬属	
Die Gattung RECURVIROSTRA Linnaeus	1:145	
RECURVIROSTRIDAE	FĀNZUÍYÙ KĒ 反嘴鹬科	
Die Familie RECURVIROSTRIDAE (Stelzenläufer)	1:144; 3:74	
REGENBRACHVOGEL	ZHōNG SHÁOYÙ 中杓鹬	
Numenius phaeopus (Linnaeus)	1:132	
REGENPFEIFER (1) (Familie) → CHARADRIIDAE		
REGENPFEIFER (2) (Sammelbezeichnung)	HÉNG 行	
→ FLUSS-, HUFEISEN-, KIEBITZ-, LANGSCHNABEL-, MONGOLEN-, MORNELL-, SEE-, WANDER (= KLEINER GOLD-)-, WERMUT-, WÜSTENREGENPFEIFER	(1:125)	
REGULUS	DÀIJÚ SHŪ 戴菊属	
Die Gattung REGULUS Cuvier	2:289	
REIHER (1) (Sammelbezeichnung)	LÙ 鹭	
→ BACCHUS-, FISCH(GRAU-)-, HAINAN-, KUH-, MANGROVE-, MITTEL-, NACHT-, PURPUR-, RIFF-, ROTSCHEITEL-, SCHNEE-, SEIDEN-, SILBER-, WELLEN-	(1:12)	
REIHER		
REIHER (2) (Familie) → ARDEIDAE		
REIHERENTE	FèNGTÓU QIÁNYĀ 凤头潜鸭	
<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus)	1:35	
REISAMADINE → REISFINK		
REISFINK (REISAMADINE)	HÉQUÈ 禾雀	
<i>Padda oryzivora</i> (Linnaeus)	2:386	

REMIZ	PĀNQUÈ SHŪ 攀雀属	RHYNCHOPIDAE	JIĀNZUǐOU KĒ 剪嘴鸥科
Die Gattung REMIZ Jarocki	2:358	Die Familie RHYNCHOPIDAE (Scherenschnäbel)	1:158
REMIZIDAE	PĀNQUÈ KĒ 攀雀科	RHYNCHOPS	JIĀNZUǐOU SHŪ 剪嘴鸥属
Die Familie REMIZIDAE (Beutelmeisen)	2:358; 3:218	Die Gattung RHYNCHOPS Linnaeus	1:158
RHINOMYIAS	LÍNWĒNG SHŪ 林鵙属	RIEDSÄNGER	BĀNBÈI DÀWĒIYÍNG 斑背大尾莺
Die Gattung RHINOMYIAS Sharpe	2:306	Megalurus pryeri Seeböhm	2:263
RHIPIDURA	→ SHÀNWEIWĒNG SHŪ 扇尾鹟属	RIESENBABAX	DÀ CǎOMÉI 大草鹛
Die Gattung RHIPIDURA Vigors et Horsfield	(2:329)	Babax waddelli Dresser	2:199
RHODODENDRONBUSCHSÄNGER	DÀ SHÙYÍNG 大树莺	RIESEN-FISCHUHU	HÈ YÚXIĀO 福鱼鶲。- Dieser Name gilt auch für den → WELLENBRUST-FISCHUHU, Ketupa zeylonensis (Gmelin) (1:190)
Cettia major (Horsfield et Moore)	2:255	Ketupa blakistonii (Seeböhm)	
RHODODENDRONDROSSEL	ZÖNGBÈI DÔNG 棕背鹟	RIESENHÄHERLING	HUĀBÈI ZÀOMÉI 花背噪鹛
Turdus kessleri (Przevalski)	2:162	Garrulax maximus (Verreaux)	2:208
RHODODENDRONGIMPEL	HÓNGÈ YUÁNQUÈ 红额原雀	RIESENKLEIBER	JÙ SHĪ 巨鹇
Pinicola subhimachala (Hodgson)	(2:418)	Sitta magna Ramsay	2:351
RHODOPECHYS	→ SHĀQUÈ SHŪ 沙雀属	RIESENROTSCHWANZ (WEISSKAPPEN-ROTSCHWANZ)	HÓNGFÙ HÓNGWĒIQÚ 红腹红尾鹟
Die Gattung RHODOPECHYS Cabanis	(2:399)	Phoenicurus erythrogaster (Güldenstädt)	2:138
RHODOSPIZA	→ SHĀQUÈ SHŪ 沙雀属	RIESENSCHWIRL	CĀNGMÉI HUÁNGYÍNG 苍眉蝗莺
Die Gattung RHODOSPIZA Sharpe	(2:399)	Locustella fasciolata (Gray)	2:266
RHODOSTETHIA	XIĒWĒI ÓU SHŪ 楔尾alcon属	RIESENSEEADLER	HŪTÓU HÁIDIÀO 虎头海雕
Die Gattung RHODOSTETHIA MacGillivray [von manchen Autoren als Gattung angesehene Untergattung der Gattung LARUS Linnaeus]	1:151	Haliaeetus pelagicus (Pallas)	1:58
RHOPODYTES	DÌJUĀN SHŪ 地鹃属	RIESENSEESCHWALBE → RAUBSEESCHWALBE	
Die Gattung RHOPODYTES Cabanis et Heine	(1:182)	RIFFREIHER	YÁNLÙ 岩鹭, auch YÁN BÁILÙ 岩白鹭
RHOPOPHILUS	SHĀNMÉI SHŪ 山鹛属	Egretta sacra (Gmelin)	1:17
Die Gattung RHOPOPHILUS Giglioli et Salvadori	2:246	RINGELGANS	HĒIYÀN 黑雁
RHYACORNIS	SHUÍQÚ SHŪ 水鵠属	Branta bernicla (Linnaeus)	1:26
Die Gattung RHYACORNIS Blanford	(3:153)	RINGELTAUBE	LÍN GĒ 林鸽
		Columba palumbus Linnaeus	1:166

RIPARIA	SHĀYĀN SHŪ 沙燕属
Die Gattung RIPARIA Forster	2:18
RISSA	SĀNZHĪDŌU SHŪ 三趾鸥属
Die Gattung RISSA Stephens [von manchen Autoren als Gattung angesehene Untergattung der Gattung LARUS Linnaeus]	1:151
ROBOROWSKIGIMPEL	ZÀNGQUÈ 藏雀
Kozlowia roborowskii (Przevalski)	2:414
RÖHRENNASEN (Ordnung) → PROCELLARIIFORMES	
RÖTELAMMER	LÌ WŪ 紫鹀
Emberiza rutila Pallas	2:431; 3:231
RÖTELFALKE	HUÁNGZHĀO SŪN 黄爪隼
Falco naumanni Fleischer	1:71
RÖTELMERLE	LÍXIÖNG JÍDÖNG 栗胸矶鸫
Monticola rufigularis (Jardine et Selby)	2:153
RÖTELSCHWALBE	JÍNYĀO YĀN 金腰燕. - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): HUÁYĀN'R 花燕儿; YĀNZI 燕子 (2:22; 3:110)
RÖTELSPERLING	SHĀN MÁQUÈ 山麻雀
Passer rutilans (Temminck)	2:377; 3:222
ROHRAMMER	LÚ WŪ 芦鹀
Emberiza schoeniclus Linnaeus	2:445; 3:238
ROHRDOMMEL	DÀ MÁYĀN 大麻鳽
Botaurus stellaris (Linnaeus)	1:20
ROHRSÄNGER (Sammelbezeichnung) → BRAUEN-, CHINA-, DROSSEL-, FELD-, HIRSE-, SCHILF-, STENTOR-, STRAUCH-, TEICHROHRSÄNGER	WĒIYÍNG 莺
	(2:266)

ROHRWEIHE	BÁITÓU YÀO 白头鵙
Circus aeruginosus (Linnaeus)	1:62
ROSAPELIKAN	BÁI TÍHÚ 白鹈鹕
Pelecanus onocrotalus Linnaeus	1:8
ROSENBAUCHGIMPEL	DIĀNCHÌ ZHŪQUÈ 点翅朱雀
Carpodacus rhodopeplus (Vigors)	2:406
ROSENGIMPEL	BĚI ZHŪQUÈ 北朱雀
Carpodacus roseus (Pallas)	2:413; 3:226
ROSENKOPFSITTICH	HUĀTÓU YÍNGWŪ 花头嬰鸚
Psittacula roseata Biswas	(1:174)
ROSENMENNIGVOGEL	FĚNHÓNG SHĀNJIĀONIǎO 粉红山椒鸟
Pericrocotus roseus (Vieillot)	2:43
ROSENMÖWE	XIĒWĒIĐŌU 楔尾鷂
Larus roseus MacGillivray	1:151
ROSENPIEPER	FĚNHÓNGXIōNG LIÜ 粉红胸鹀
Anthus roseatus Blyth	2:31; 3:113
ROSENSEESCHWALBE	FĚNHÓNG YĀN'ōU 粉红燕鸥
Sterna dougallii Montagu	1:155
ROSENSTAR	FĚNHÓNG LIÁNGNIǎO 粉红椋鸟
Pastor roseus (Linnaeus)	(2:82)
ROSTBACKENSTAR → VIOLETTRÜCKENSTAR	
ROSTBAUCHSPECHT	Zōngfù ZHUÓMÙNIǎO 棕腹啄木鸟
Dendrocopos hyperythrus (Vigors)	1:235; 3:104
ROSTBRUST-MAUSTIMALIE	Zōngxiōng Yāméi 棕胸稚鶲
Trichastoma tickelli (Blyth)	2:170
ROSTBUSCHSÄNGER	Zōnghé DUĀNCHIYÍNG 棕褐短翅莺
Bradypterus luteoventris (Hodgson)	2:261; 3:188
ROSTFLÜGELDROSSEL, eine Rasse der → NAUMANN DROSSEL	

ROSTGANS
Casarca ferruginea (Pallas)

ROSTKAPPEN-SCHWANZMEISE
Aegithalos concinnus (Gould)

ROSTKEHLNACHTIGALL
Larvivora akahige (Temminck)

ROSTKEHL-ROTSCHWANZ
Phoenicurus alaschanicus (Przevalski)

ROSTPRINIE
Prinia rufescens (Blyth)

ROSTRATULA
Die Gattung ROSTRATULA Vieillot

ROSTRATULIDAE
Die Familie ROSTRATULIDAE (Goldschnepfen)

ROSTSCHNÄPPER
Muscicapa ferruginea (Hodgson)

ROSTSPECHT
Micropternus brachyurus (Vieillot)

ROSTSTEISSYUHINA
Yuhina occipitalis Hodgson

ROSTWANGEN-LAUBSÄNGER
Seicercus albogularis (Horsfield et Moore)

ROSTWANGEN-SCHWANZMEISE
Aegithalos iouschistos (Blyth)

CHÌ MÁYĀ 赤麻鸭。 - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi):
HUÁNGYĀ 黄鸭
(1:30; 3:39)

HÓNGTÓU CHÁNGWÉISHĀNQUÈ 红头长尾山雀, auch HÓNGTÓU SHĀNQUÈ
红头山雀
2:347; 3:213

RÌBĚN GĒQÚ 日本歌鸲
(2:124)

HÈLÁNSHĀN HÓNGWÉIQÚ 贺兰山红尾
鸲
2:134; 3:150

ÀNMIĀN JIĀOYÍNG 暗冕鶲莺
2:302

CÁIYÙ SHǔ 彩鹀属
1:122

CÁIYÙ Kē 彩鹀科
1:122; 3:67

HÓNGHè WĒNG 红褐鹟
2:325; 3:205

LÌZHŪMUNIÀO 栗啄木鸟
1:223

ZÖNGXIÉ FÈNGMÉI 棕肠凤鹛
2:234

ZÖNGLIÀN WĒNGYÍNG 棕脸鹟莺
2:295

HĒITÓU CHÁNGWÉISHĀNQUÈ 黑头长尾山雀, auch HĒITÓU SHĀNQUÈ
黑头山雀
2:348; 3:213

ROTBAUCHADLER
Lophotriorchis kienerii (Geoffroy)

ROTBAUCH-NILTAVA (SCHWARZKEHL-NILTAVA)
Niltava sundara Hodgson

ROTBAUCH-WÜRGERTIMALIE
Pteruthius rufiventer Blyth

ROTBINDEN-SEIDENSCHWANZ
Bombycilla japonica (Siebold)

ROTBRUST-BRACHSCHWALBE
Glareola maldivarum J.R. Forster

ROTBRUST-GRUNDSCHNÄPPER
Ficedula hyperythra (Blyth)

ROTBRUSTSPECHT
Dendrocopos catpharius (Blyth)

ROTFLANKEN-BRILLENVOGEL
Zosterops erythropleurus Swinhoe

ROTFLÜGELGIMPEL
Rhodopechys sanguinea (Gould)

ROTFUSSFALKE
Falco vespertinus Linnaeus

ROTFUSSTÖLPEL
Sula sula (Linnaeus)

ROTGESICHTSCHARBE
Phalacrocorax urile (Gmelin)

ZÖNGFù ĀI DIĀO 棕腹矮鹛
(1:56)

ZÖNGFù XIĀNWĒNG 棕腹仙鹟
2:317; 3:203

ZÖNGFù JUÉMÉI 棕腹购物中心
2:223

XIĀO TÀIPÍNGNIÀO 小太平鸟, auch SHÍERHÓNG 十二红
2:64

YĀNHÉNG 燕衡阳。 - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): Tǔ YĀNZI 土燕子
1:146; 3:75

ZÖNGXÍÔNG LÁN WĒNG 棕胸蓝鹟
2:310

CHÌXÍÔNG ZHUÓMUNIÀO 赤胸啄木鸟
1:234; 3:104

HÓNGXIÉ XIÙYÀNNIÀO 红肠绣眼鸟。 - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): BÁIYÁN'R 白眼儿
(2:372; 3:220)

CHÌCHÌ SHĀQUÈ 赤翅沙雀
2:400

HÓNGJIÀO SŪN 红脚隼。 - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): MÀZHÀ YÍNG 蚂鸷鹰; QÍNGYÍNG 青鹰
1:70; 3:51

HÓNGJIÀO JIĀNNIÀO 红脚鲣鸟
1:9

HÓNGLIÀN LÚCÍ 红脸鷦鷯
1:11

ROTHALSSÄBLER <i>Pomatorhinus ruficollis</i> Hodgson	ZÖNGJÍNG GŌUZUÍMÉI 棕颈钩嘴鹛 2:170; 3:166	ROTKOPF-LAUBSÄNGER <i>Seicercus castaniceps</i> (Blyth)	LÌTÓU WĒNGYÍNG 栗头鹟莺 2:291; 3:196
ROTHALS-SCHNEEFINK (ROTHALS-SCHNEE-SPERLING) <i>Montifringilla ruficollis</i> Blanford	ZÖNGJÍNG XUÉQUÈ 棕颈雪雀 2:382	ROTKOPFNACHTIGALL <i>Larvivora ruficeps</i> Hartert (Einer der seltensten Vögel der Welt, nur 4 Expl. überhaupt bekannt. Vielleicht die schönste Nachtigall.)	ZÖNGTÓU GĒQÚ 棕头歌鸲 (2:130; 3:148)
ROTHALS-SCHNEESPERLING → ROTHALS-SCHNEEFINK			
ROTHALSTAUCHER <i>Podiceps grisegena</i> (Boddaert)	CHÌJÍNG PÌTÍ 赤颈䴙䴘 (1:4)	ROTKOPFTESIA <i>Oligura castaneocoronto</i> (Burton)	LÌTÓU DÌYÍNG 栗头地莺 (2:251)
ROTÄPPCHENTIMALIE <i>Timalia pileata</i> Horsfield	HÓNGDÍNG MÉI 红顶鹛 2:184	ROTKOPFTROGON <i>Harpactes erythrocephalus</i> (Gould)	HÓNGTÓU YÀOJUĀN 红头咬鹃 1:208
ROTKEHLBRAUNELLE <i>Prunella rubeculoides</i> (Horsfield et Moore)	QÚ YÁNLÌU 鸲岩鹨 2:116	ROTKROPFDROSSEL <i>Turdus chrysolaus</i> Temminck	BÁIFÙ DÔNG 白腹鶲. Dieser Name gilt auch für die → FAHLDROSSEL, <i>Turdus pallidus</i> Gmelin und die → WEISSBRAUENDROSSEL, <i>Turdus obscurus</i> Gmelin (2:163; 3:162)
ROTKEHL-BUSCHWACHTEL <i>Arborophila rufogularis</i> (Blyth)	HÓNGHÓU SHĀNZHÈGŪ 红喉山鹧鸪 1:87	ROTLAPPENKIEBITZ <i>Lobivanellus indicus</i> (Boddaert)	RÓUCHUÍMÀIJÍ 肉垂麦鸡 1:124
ROTKEHLDROSSEL, eine Rasse der → BECHSTEINDROSSEL		ROTMANTELGIMPEL <i>Carpodacus rhodochlamys</i> (Brandt)	HÓNGYÀO ZHŪQUÈ 红腰朱雀 2:406
ROTKEHLPIEPER <i>Anthus cervinus</i> (Pallas)	HÓNGHÓU LIÙ 红喉鹨 2:29	ROTNACKEN-LAUFHÜHNCHEN <i>Turnix tanki</i> Blyth	HUÁNGJIÀO SĀNZHÍCHÚN 黄脚三趾鹑 . - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): SHUĬ ĀNCHŪN 水鹤鹑 1:109; 3:61
ROTKEHL-STRANLÄUFER <i>Calidris ruficollis</i> (Pallas)	HÓNGXIÖNG BÍNYÙ 红胸滨鹬 1:140	ROTOHRBÜLBÜL <i>Pycnonotus jocosus</i> (Linnaeus)	HÓNGĚR BĒI 红耳鹎 2:54
ROTKOPFALCIPPE <i>Alcippe brunnea</i> Gould	HÈ QUÈMÉI 褐雀鹛 2:243; 3:182	ROTOHR-NEKTARVOGEL <i>Anthreptes singalensis</i> (Gmelin)	ZÌJIÁTÀIYÁNGNIÀO 紫颊太阳鸟 2:364
ROTKOPF-BAUMTIMALIE <i>Stachyris ruficeps</i> Blyth	HÓNGDÍNG SUÍMÉI 红顶穗鹛 2:181; 3:168	ROTOHRSPECHT <i>Blythipicus pyrrhotis</i> (Hodgson)	HUÁNZUÍ ZÀOZHUÓMÙNIÀO 黄嘴噪鹛 木鸟 1:240
ROTKOPF-BUSCHSÄNGER <i>Cettia brunnifrons</i> (Hodgson)	ZÖNGDÍNG SHÙYÍNG 棕顶树莺 2:257	ROTOHRTIMALIE <i>Yuhina castaniceps</i> (Moore)	LÌTÓU XÍMÉI 栗头希鹛 (2:231)
ROTKOPFGIMPEL <i>Pyrrhula erythrocephala</i> Vigors	HÓNGTÓU HUÍQUÈ 红头灰雀 2:422		
ROTKOPFHÄHERLING <i>Garrulax erythrocephalus</i> (Vigors)	HÓNGTÓU ZÀOMÉI 红头噪鹛 2:217		

ROTRÜCKENTIMALIE	LÍBÉI QÍMÉI 紫背奇鹛
Heterophasia annectans (Blyth)	2:247
ROTSCHEITELALCIPPE	ZÖNGTÓU QUÈMÉI 棕头雀鹛
Alcippe ruficapilla (Verreaux)	2:240; 3:181
ROTSCHEITEL-BARTVOGEL → KUPFER-SCHMIED	.
ROTSCHEITELREIHER	LÍTÓU HÜBÁNYÁN 紫头虎斑鳽
Gorsachius goisagi (Temminck)	1:18
ROTSCHENKEL	HÓNGJIÀO YÙ 红脚鹬
Tringa totanus (Linnaeus)	1:134
ROTSCHNABELKITTA	HÓNGZUÍ LÁNQUÈ 红嘴蓝鹊. - Volks-tümliche Bezeichnung (in S-Shensi):
Urocissa erythrorhyncha (Boddaert)	MÁYĀQUÈ 麻鸦鹊 (2:93; 3:134)
ROTSCHNABEL-TROPIKVOGEL	DUĀNWÉI MÉNG 短尾鳽
Phaethon aethereus Linnaeus	1:7
ROTSCHWANZ (Sammelbezeichnung, im Chinesischen einschließlich BLAU-KOPFRÖTEL)	HÓNGWÉIQÚ 红尾鵙 (2:134)
→ ALPEN-, BAUM-, FELD-, HAUS-, RIESEN (=WEISSKAPPEN)-, ROSTKEHL-, SPIEGEL-, SPROSSER (=ZÜGEL-) ROT-SCHWANZ	.
→ BLAUKOPFRÖTEL	.
ROTSCHWANZHÄHERLING	CHÌWÉI ZÀOMÉI 赤尾噪鹛
Garrulax milnei (David)	2:218
ROTSCHWANZ-KURZFLÜGEL	DUĀNCHÌQÚ 短翅鳽
Hodgsonius phoenicuroides (Gray)	2:141; 3:154
ROTSCHWANZSIVA	HUÒWÉI XÍMÉI 火尾希鹛
Minla ignotincta Hodgson	2:229
ROTSCHWANZ-TROPIKVOGEL	HÓNGWÉI MÉNG 红尾鳽
Pnaethon rubricauda Boddaert	1:8
ROTSCHWANZWÜRGER	HÓNGWÉI BÓLÁO 红尾伯劳
Lanius cristatus Linnaeus	2:65; 3:124

ROTSTIRNGIRLITZ	JÍNÉ SÍQUE 金額丝雀
Serinus pusillus (Pallas)	2:389
ROTSTIRN-WÜRGERTIMALIE	LÍE JUÉMÉI 栗额鳽
Pteruthius aenobarbus (Temminck)	2:225
ROTWANGENSÄBLER	XIULIĀN GŌUZUİMÉI 绣脸钩嘴鹛
Pomatorhinus erythrogenys Vigors	2:172; 3:167
RUBINKEHLCHEN	HÓNGDIĀNKĒ 红点颏 (2:127; 3:147)
Calliope calliope (Pallas)	.
RUDERFÜSSER (Ordnung) → PELECANIFORMES	.
RÜPPELLSEESCHWALBE	Fèngtóuyàn'ōu 凤头燕鸥
Thalasseus bengalensis (Lesson)	1:157
RUSSSCHNÄPPER	wū wēng 鸟翁
Muscicapa sibirica Gmelin	2:321; 3:204
RUSSSEESCHWALBE	wū yàn'ōu 马燕鸥
Sterna fuscata Linnaeus	1:156

S

SAATGANS	Dòu Yàn 豆雁. - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): MÁIÉ 麦我； PŪTÔNG DÀYÀN 普通大雁
Anser fabalis (Latham)	1:26; 3:38
SAATKRÄHE	TŪBÍ WŪ YĀ 兔鼻乌鸦. - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): LĀOGUĀ 老鸹
Corvus frugilegus Linnaeus	2:104; 3:137
SÄBELSCHNÄBLER	FĀNZUÍYÙ 反嘴鹬
Recurvirostra avosetta Linnaeus	1:145
SÄGER (Sammelbezeichnung) → GÄNSE-, MITTEL-, SCHUPPEN-, ZWERGSÄGER	QIŪSHĀYĀ 秋沙鸭. - Diese Bezeichnung wird auch spezifisch für den → GÄNSESÄGER, Mergus merganser Linnaeus, gebraucht (1:39)

SÄNGER (Familie) → MUSCICAPIDAE		
SAKERFALKE (WÜRGFALKE) Falco cherrug J.E. Gray	LIÈ SŪN 猎隼. - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): TŪHŪ 兔虎 1:66; 3:51	SCHAFSTELZE <i>Motacilla flava</i> Linnaeus
SALANGANE (Sammelbezeichnung) → HIMALAYA-SALANGANE	JĪNSĪYĀN 金丝燕 (1:203)	SCHAMA <i>Copsychus malabaricus</i> (Scopoli)
SANDERLING <i>Calidris alba</i> (Pallas)	SĀNZHÍYÙ 三趾鹬 (1:142)	SCHANTUNG-SEESCHWALBE <i>Thalasseus zimmermanni</i> (Reichenow)
SANDFLUGHUHN <i>Eremialector orientalis</i> (Linnaeus)	HĒIFŪ SHĀJĪ 黑腹沙鸡 (1:161)	SCHARBE → KORMORAN (2)
SAPHIRSCHNÄPPER <i>Ficedula sapphira</i> Blyth	YÙTÓU WĒNG 玉头翁 2:314; 3:201	SCHARLACH-BLÜTENPICKER → SCHARLACH-MISTELFRESSER
SARCOGYPS Die Gattung SARCOGYPS Lesson	DÀWŪJIŪ SHŪ 大兀鹫属 1:59	SCHARLACHGIMPEL <i>Haematoxipha sipahi</i> (Hodgson)
SARKIDIORNIS Die Gattung SARKIDIORNIS Eyton	LIÚYĀ SHŪ 瘤鸭属 1:37	SCHARLACHMENNIGVOGEL <i>Pericrocotus flammeus</i> (Forster)
SARUSKRANICH <i>Grus antigone</i> (Linnaeus)	CHÌJÍNG HÈ 赤颈鹤 1:112	SCHARLACH-MISTELFRESSER (SCHARLACH-BLÜTENPICKER) <i>Dicaeum cruentatum</i> (Linnaeus)
SASIA Die Gattung SASIA Hodgson	ZÖNGZHUÓMÙ SHŪ 棕啄木属 1:223	SCHARLACHNEKTARVOGEL (GELBRÜCKEN-NEKTARVOGEL) <i>Aethopyga siparaja</i> (Raffles)
SATYRTRAGOPAN <i>Tragopan satyra</i> (Linnaeus)	HÓNGXIŌNG JIĀOZHÌ 红胸角雉 1:93	SCHATTENSCHMÄTZER <i>Cinclidium leucurum</i> (Hodgson)
SAVANNENNACHTSCHWALBE <i>Caprimulgus affinis</i> Horsfield	LÍN YÈYÍNG 林夜莺 1:203	SCHECKENDROSSEL <i>Turdus cardis</i> Temminck
SAXAULSPERLING <i>Passer ammodendri</i> Gould	HĒIDÍNG MÁQUÈ 黑顶麻雀, auch XĪYÙ MÁQUÈ 西域麻雀 2:374	SCHECKENTE <i>Polysticta stelleri</i> (Pallas)
SAXICOLA Die Gattung SAXICOLA Bechstein	SHÍJÍ SHŪ 石即鶲属 2:146	SCHELLADLER <i>Aquila clanga</i> Pallas
SCHACHWÜRGER <i>Lanius schach</i> Linnaeus	ZÖNGBÈI BÓLÁO 棕背伯劳 2:71; 3:126	SCHELLENTE <i>Glaucionetta clangula</i> (Linnaeus)
		SCHERENSCHNABEL → HALSBAND-SCHEREN-SCHNABEL
		HUÁNG JÍLÍNG 黄鹡鸰 2:38; 3:118
		BÁIYĀO QUÈQÚ 白腰鹊鸲 2:133
		XIĀO FèNGTÓUYÀN'ŌU 小凤头燕鸥 1:157
		XUÈQUÈ 血雀 2:419
		CHÌHÓNG SHĀNJIĀONIĀO 赤红山椒鸟 2:47
		ZHŪBÈI ZHUÓHUĀNIĀO 朱背啄花鸟 2:362
		HUÁNGYĀO TÀIYÁNGNIĀO 黄腰太阳鸟 2:366
		BÁIWĒI DÌQÚ 白尾地鸽 (2:141; 3:155)
		WŪHUĪ Dōng 乌灰鸫 2:159
		RÓNGYĀ 绒鸭 (1:37)
		WŪ DIĀO 乌雕 1:55
		QUÈYĀ 鹊鸭 (1:39; 3:44)

SCHERENSCHNÄBEL (Familie) → RHYN-
CHOPIDAE

SCHERENSCHWANZ (Sammelbezeichnung)
→ FLECK-, GRAURÜCKEN-, WEISSSCHEI-
TEL-SCHERENSCHWANZ
→ BACHSTUTZSCHWANZ

SCHIEFERDROSSEL (SIBIRISCHE DROSEL)
Cryptocichla sibirica (Pallas)

BÁIMÉI DÍDÖNG 白眉地鸫
(2:156; 3:160)

SCHIEFERRÜCKENMÖWE
Larus schistisagus Stejneger

HUÍBÉI ÖU 灰背鸥
1:149

SCHIKRA
Accipiter badius (Gmelin)

HÉR YÍNG 褐耳鹰
1:46

SCHILFROHRSÄNGER
Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus)

SHUÍPÚ WĒIYÍNG 水蒲苇莺
2:269

SCHILFSTEIGER
Megalurus palustris Horsfield

ZHĀOZÉ DÀWÉIYÍNG 沼泽大尾莺
2:262

SCHLANGENADLER
Circaetus gallicus (Gmelin)

DUĀNZHÍDIĀO 短趾雕
(1:63)

SCHLANGENWEIHE
Spilornis cheela (Latham)

SHÉDIĀO 蛇雕
1:63

SCHLEIEREULE (Sammelbezeichnung)

CÀOXIĀO 草鸮 . - Dieser Name wird auch spezifisch für die einzige Vertreterin der Schleiereule in China, für die → ERDEULE, Tyto longimembris (Jerdon), gebraucht
(1:183)

SCHLEIEREULEN (Familie) → TYTONIDAE

SCHLUCHTENLAUBSÄNGER
Phylloscopus magnirostris Blyth

WŪZUI LIҮYÍNG 乌嘴柳莺
2:283

SCHMALSCHWANZ-OHRFASAN
Crossoptilon crossoptilon (Hodgson)

MĀJĪ 马鸡
1:95

SCHMALSCHWANZPIPER
Anthus sylvanus (Hodgson)

SCHMUCKKAMMER
Emberiza elegans Temminck

SCHMUCKGIMPEL
Carpodacus pulcherrimus (Moore)

SCHMUCKMEISE
Parus venustulus Swinhoe

SCHMUCKNEKTARVOGEL
Nectarinia jugularis (Linnaeus)

SCHNÄPPERDROSSEL (Sammelbezeichnung)
→ GRÜN-, PURPURSCHNÄPPERDROSSEL

SCHNATTERENTE
Anas strepera Linnaeus

SCHNEEAMMER
Plectrophenax nivalis (Linnaeus)

SCHEEEULE
Nyctea scandiaca (Linnaeus)

SCHNEEFINK (SCHNEESPERLING) (1)
Montifringilla nivalis (Linnaeus)

SCHNEEFINK (SCHNEESPERLING) (2)
(Sammelbezeichnung)
→ ADAMS-, BLANFORD-, DAVID-, SCHNEEFINK (1), ROTHALS-, TACZANOWSKI-SCHNEEFINK

SCHNEEGANS
Anser caerulescens (Linnaeus)

SCHNEEGIMPEL (Sammelbezeichnung)
→ FELSEN-, GRAUKOPF-, WALDSCHNEEGIMPEL

SHĀN LIŪ 山鶲
2:32

HUÁNGHÓU WŪ 黄喉鹀 . - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi):
HUÁNGMÉIZI 黄眉子
2:433; 3:232

HÓNGMÉI ZHŪQUÈ 红眉朱雀
2:409; 3:225

HUÁNGFÙ SHĀNQUÈ 黄腹山雀
2:335; 3:210

HUÁNGFÙ HUĀMÌNIĀO 黄腹花蜜鸟
2:364

KUĀNZUÍDÖNG 宽嘴杓
2:145

ZÍBĀNG YĀ 紫膀鸭
1:33

XUĚWŪ 雪鷺
2:449

XUĚXIĀO 雪鸮
1:190; 3:91

BÁIBĀNCÌ XUÉQUÈ 白斑翅雪雀
2:379

XUÉQUÈ 雪雀
(2:379)

XUĚ YĀN 雪雁
1:28

DÌQUÈ 地雀
(2:396)

SCHNEEHUHN (Sammelbezeichnung)
→ MOORSCHNEEHUHN

LÉINIÀO 雷鸟 . - Dies ist zu-
gleich der spezifische Name für
das → MOORSCHNEEHUHN, *Lagopus*
lagopus (Linnaeus)
(1:74)

SCHNEEREIHER
Egretta eulophotes (Swinhoe)

HUÁNZUǐ BÁILÙ 黄嘴白鹭
1:17

SCHNEESPERLING (1) → SCHNEEFINK (1)

SCHNEESPERLING (2) → SCHNEEFINK (2)

SCHNEETAUBE
Columba leuconota Vigors

XUĚ GĒ 雪鸽
1:164

SCHNEIDERVOGEL (Sammelbezeichnung)
→ BERG-, LANGSCHWANZ-, WALDSCHNEI-
DERVOGEL

FÉNGYÈYÍNG 缝叶莺 . Diese Be-
zeichnung ist zugleich einer der
beiden Namen für den → LANGSCHWANZ-
SCHNEIDERVOGEL, *Orthotomus sutorius*.
(Pennant)
(2:297)

SCHNEPFEN (Familie) → SCOLOPACIDAE

SCHOPFHABICHT
Accipiter trivirgatus (Temminck)

FÉNGTÓU YÍNG 凤头鹰
1:46

SCHOPFHÄHNCHEN
Lophobasileus elegans (Przevalski)

QīNGHÁI FÉNGTÓUQUÈYÍNG 青海凤头
雀莺
2:297

SCHOPFPAPAGEIMEISE → SCHOPFPAPAGEI-
SCHNABEL

SCHOPFPAPAGEISCHNABEL (SCHOPFPAPA-
GEIMEISE)
Paradoxornis atrosuperciliaris (God-
win-Austen)

SCHOPFWESPENBUSSARD
Pernis apivorus ruficollis Lesson
(eine Rasse des → WESPENBUSSARDS)

HĒIMÉI YÀQUÈ 黑眉鶲雀
2:195

FÉNGTÓU FÉNGYÍNG 凤头蜂鹰
(1:43)

SCHREITVÖGEL (Ordnung) → CICONII-
FORMES

SCHUPPENBAUCHSPECHT
Picus myrmecophonus Stresemann

LÍNFÙ LÜZHUÓMÙNIÀO 鳞腹绿啄木
鸟
(1:224)

SCHUPPENKOPFGIMPEL
Pyrrhula nipalensis Hodgson

HÈ HUÍQUÈ 禾灰雀
2:420

SCHUPPENSÄGER
Mergus squamatus Gould

LÍNXIÉ QIŪSHĀYĀ 鳞胁秋沙鸭
1:40

SCHUPPENTIMALIE
Pnoepyga albiventris (Hodgson)

BÁIFÙ JIĀOMÉI 白腹锦鹟
2:178

SCHWALBE (Sammelbezeichnung)
→ BRAUNKEHL-UFER-, FELSEN-, MEHL-,
RAUCH-, RÖTEL-, STRICHEL-, SÜDSEE-,
UFERSCHWALBE

YĀN 燕 (Schriftsprache); YĀNZĪ 燕
子 (Umgangssprache)

SCHWALBEN (Familie) → HIRUNDINIDAE

SCHWALBENSTAR (Sammelbezeichnung)
→ GRAUSCHWALBENSTAR

YĀNJUÉ 燕贝鸟
(2:87)

SCHWALBENSTARE (Familie) → ARTAMIDAE

SCHWALMVÖGEL (Ordnung) → CAPRIMULGI-
FORMES

SCHWAN (Sammelbezeichnung)
→ HÖCKER-, SING-, ZWERGSCHWAN

TIÁNÉ 天鹅 . - Diese Bezeichnung
wird auch spezifisch für den →
SINGSchwan, *Cygnus cygnus* (Lin-
naeus), gebraucht
(1:28)

SCHWANENGANS
Anser cygnoides (Linnaeus)

HÓNG YÀN 鸿雁
1:26

SCHWANZGIMPEL → MEISENAMMER

SCHWANZMEISE
Aegithalos caudatus (Linnaeus)

YÍNHÓU CHÁNGWĒISHĀNQUÈ 银喉长
尾山雀, auch YÍNHÓU SHĀNQUÈ 银
喉山雀
2:346; 3:213

SCHWANZMEISEN (Familie) → AEGITHALIDAE

SCHWARZBAUCHNONNE
Lonchura malacca (Linnaeus)

SCHWARZBAUCH-SEESCHWALBE
Sterna acuticauda J.E. Gray

SCHWARZBRAUEN-BARTVOGEL
Megalaima oorti (S. Müller)

SCHWARZBRUSTDROSSEL
Turdus dissimilis Blyth

SCHWARZBRUSTFASAN
Lophura leucomelana lathami (J.E. Gray) [wahrscheinlich ist *Lophura leucomelana* nur eine Rassengruppe der Art *Lophura nycthemera* (Linnaeus)]

SCHWARZBRUST-HASELHUHN
Tetrastes sewerzowi Przevalski

SCHWARZDOMMEL
Ixobrychus flavicollis (Latham)

SCHWARZFLÜGEL-EIORA
Aegithina tiphia (Linnaeus)

SCHWARZFUSSELBATROS
Diomedea nigripes Audubon

SCHWARZHALSIBIS
Threskiornis melanocephalus (Latham) (1:23)

SCHWARZHALKRANICH
Grus nigricollis Przevalski

SCHWARZHALSSTAR
Gracupica nigricollis (Paykull)

SCHWARZHALSTAUCHER
Podiceps nigricollis C.L. Brehm

LÍFÙ WÉNNIÀO 紫腹文鸟
2:387

HĒIFÙ YÀN'ŌU 黑腹燕鸥
(1:155)

SHĀN NİZHŪÓMÙ 山拟啄木
1:220

HĒIXIÖNG DÖNG 黑胸鵙
2:158

HĒIXIÖNG XIÁN 黑胸鹟
1:97

HUÁXÌ ZHĒNJĪ 华西榛鸡
1:75

HĒIYÁN 黑鹇
(1:20; 3:36)

HĒICHÌ QUÈBĒI 黑翅雀鹀
2:61

HĒIJIAO XÌNTIĀNWĒNG 黑脚信天翁
1:5

BÁIHUÁN 白鹭

HĒIJÍNG HÈ 黑颈鹤
1:111

HĒILÍNG LIÁNGNIÀO 黑领椋鸟
(2:84)

HĒIJÍNG PÌTÍ 黑颈鹃鵙
(1:3)

SCHWARZKAPPENTIMALIE
Heterophasia capistrata (Vigors)

SCHWARZKAPPEN-WÜRGERTIMALIE
Pteruthius erythropterus (Vigors)

SCHWARZKEHLBRAUNELLE
Prunella atrogularis (Brandt)

SCHWARZKEHLCHEN
Saxicola torquata (Linnaeus)

SCHWARZKEHLDROSSEL, eine Rasse der
→ BECHSTEINDROSSEL

SCHWARZKEHL-NEKTARVOGEL
Aethopyga saturata (Hodgson)

SCHWARZKEHL-NILTAVA → ROTBAUCH-
NILTAVA

SCHWARZKEHL-PAPAGEIMEISE → SCHWARZ-
KEHL-PAPAGEISCHNABEL

SCHWARZKEHL-PAPAGEISCHNABEL (SCHWARZ- KEHL-PAPAGEIMEISE)
Paradoxornis flavirostris Gould
2:197; 3:172

SCHWARZKEHLPRINIE
Prinia atrogularis (Horsfield et Moore)

SCHWARZKINN-FRUCHTTAUBE
Ptilinopus leclancheri (Bonaparte)

SCHWARZKOPF-BAUMTIMALIE
Stachyris nigriceps Blyth

SCHWARZKOPFGRÜNLING
Chloris ambigua (Oustalet)

SCHWARZKOPFPIROL
Oriolus xanthornus (Linnaeus)

HĒITÓU QÍMÉI 黑头奇鹛
2:248

HÓNGCHÌ JUÉMÉI 红翅鶲鹛
2:224

HĒIHÓU YÁNLIÙ 黑喉岩鹛
2:119

HĒIHÓU SHÍJÍ 黑喉石即鹛
2:146; 3:157

HĒIXIÖNG TÀIYÁNGNIÀO 黑胸太阳鸟
2:365

HĒIKĒ GUŌJIŪ 黑頰果鳩
1:163

HĒITÓU SUÌMÉI 黑头穗鹛
2:182

HĒITÓU JÍNCHÌ 黑头金翅, auch
HĒITÓU JÍNCHÌQUE 黑头金翅雀
(2:391)

HĒITÓU HUÁNGLÍ 黑头黄鹂
2:74

SCHWARZKOPFTRAGOPAN	HĒITÓU JIÀOZHÌ 黑头角雉
Tragopan melanocephalus (J.E. Gray)	1:93
SCHWARZMILAN	YUĀN 鸟。 - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): ÈLĀODIĀO 恶老鵠; LĀOYÍNG 老鷹; YÁNYÍNG 岩鷹
Milvus migrans (Boddaert)	1:43; 3:45
SCHWARZNACKENMONARCH	HĒIZHĒNWÁNGWÉNG 黑枕王鵙
Hypothymis azurea (Boddaert)	2:327
SCHWARZNACKENPIROL	HĒIZHĒN HUÁNGLÍ 黑枕黄鹂。 - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): HUÁNGGUĀLÓU 黄瓜喽; HUÁNG LÀOGUÀ 黄老鸹
Oriolus chinensis Linnaeus	2:73; 3:127
SCHWARZNACKEN-SEESCHALBE	HĒIZHĒN YÀN'ŌU 黑枕燕鸥
Sterna sumatrana Raffles	1:155
SCHWARZSCHETTELHÄHERLING	HĒIDÍNG ZÀOMÉI 黑顶噪鹛
Garrulax affinis Blyth	2:216
SCHWARZSCHNABEL-OLIVENTAUBE	BĀNDIĀN GĒ 斑点鸽。 - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): YÁN'GĒ 岩鸽
Columba hodgsonii Vigors	1:167; 3:80
SCHWARZSCHWANZ-KERNBEISER	HĒIWĒI LÀZUÍQUÈ 黑尾蜡嘴雀
Eophona migratoria Hartert	2:424; 3:229
SCHWARZSPECHT	HĒIZHŪMÙNIĀO 黑啄木鸟
Dryocopus martius (Linnaeus)	1:228
SCHWARZSTIRNLÖFFLER	HĒILIĀN PÍLÜ 黑脸琵鹭
Platalea minor Temminck et Schlegel	1:25
SCHWARZSTIRNWÜRGER	HĒIÉ BÓLÁO 黑额伯劳
Lanius minor Gmelin	2:70
SCHWARZSTORCH	HĒI GUÀN 黑鹳。 - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): WŪGUÀN 乌鹤
Ciconia nigra (Linnaeus)	1:23; 3:36

SCHWARZWANGEN-LAUBSÄNGER	HĒILIĀN WĒNGYÍNG 黑脸鹟莺
Abroscopus schisticeps (G.R. Gray)	(2:294)
SCHWARZZÜGELGIMPEL → WEISSFLÜGEL-GIMPEL	
SCHWEFELAMMER	LIÚHUÁNG WŪ 硫磺鹀
Emberiza sulphurata Temminck et Schlegel	2:435
SCHWIRL (Sammelbezeichnung) → FELD-, MIDDENDORFF-, RIESEN-, STREIFEN-, STRICHELSCHWIRL	HUÁNGYÍNG 蝴蝶
SCHWIRRNACHTIGALL	(2:263)
Pseudaedon sibilans (Swinhoe)	HÓNGWĒI GĒQÚ 红尾歌鸲
SCOLOPACIDAE	YÙ KĒ 鹬科
Die Familie SCOLOPACIDAE (Schnepfen)	1:131; 3:70
SCOLOPAX	QIŪYŪ SHŪ 丘鹬属
Die Gattung SCOLOPAX Linnaeus	1:139
SEEADLER	BÁIWĒI HĀIDIĀO 白尾海鵰
Haliaeetus albicilla (Linnaeus)	1:57
SEEREGENPFEIFER	HUÁNJÍNG HÉNG 环颈鸻, auch BÁI-LÍNG HÉNG 白领鸻
Charadrius alexandrinus Linnaeus	1:127
SEESCHWALBE (Sammelbezeichnung) → EIL-, FEEN-, FLUSS-, LACH-, NODDI-, RAUB-, ROSEN-, RÜPPELL-, RUSS-, SCHWARZBAUCH-, SCHWARZNACKEN-, SCHANTUNG-, TRAUER-, WEISS-, BART-, WEISSFLÜGEL-, ZÜGEL-, ZWERG-SEESCHWALBE	YÀN'ŌU 燕鸥 (für die zur Gattung → STERNA und im weiteren Sinne auch für die zu den Gattungen → ANOUS, → GYGIS und → THALASSEUS zählenden Arten). Für die übrigen gelten - je nach Zugehörigkeit - die chinesischen Bezeichnungen der anderen Seeschwalbengattungen: → FÚŌU 浮鸥 (CHLIDONIAS); → ZÀOŌU 噪鸥 (GELCHELIDON); → JŪŌU 巨鸥 (HYDROPROGNE)
SEETAUCHER (1) (Sammelbezeichnung) → GELBSCHNABEL-EISTAUCHER (Tundra-taucher), PRACHTTAUCHER, STERNTAUCHER	QIÁNNIĀO 渔鸟 (1:1)

SEETAUCHER (2) (Familie) → GAVIIDAE

SEETAUCHER (3) (Ordnung) → GAVIIFORMES

SEGLER (1) (Familie) → APODIDAE

SEGLER (2) (Sammelbezeichnung)
→ BAUM-, HAUBEN-, HAUS-, HIMALAYA-SALANGANE, MAUER-, PALMEN-, PAZIFIK-, STACHELSCHWANZSEGLER

SEGLERVÖGEL (Ordnung) → APODIFORMES

SEICERCUS
Die Gattung SEICERCUS SwainsonSEIDENDRONGO
Dicrurus hottentottus (Linnaeus)SEIDENPIROL
Oriolus mellianus StresemannSEIDENREIHER
Egretta garzetta (Linnaeus)SEIDENSÄNGER
Cettia cetti (Temminck)

SEIDENSCHWÄNZE (Familie) → BOMBYCILLIDAE

SEIDENSCHWANZ
Bombycilla garrulus (Linnaeus)
→ ROTBINDEN-SEIDENSCHWANZSEIDENSTAR
Sturnopastor sericeus (Gmelin)

SENEGALTAUBE → PALMTAUBE

YŪYĀN 雨燕. Die zu den Seglern zählenden → SALANGANEN (Gattung → COLLOCALIA) heißen JĪNSIYĀN 金丝燕

→ WĒNGYĪNG SHŪ 鹈莺属
(2:291)FÀGUĀN JUĀNWĒI 发冠卷尾. - Volks-tümliche Bezeichnung (in S-Shensi): HĒI TIÉLIÀNJIĀ 黑铁炼甲
2:78; 3:129QUÈSÈ HUÁNGLÍ 鹊色黄鹂
2:75BÁILÚ 白鹭
1:16; 3:34KUĀNWĒI SHÙYÍNG 宽尾树莺
2:258TÀIPÍNGNIÀO 太平鸟, auch SHÍER-HUÁNG 十二黄
2:64; 3:123SĪGUĀNG LIÁNGNIÀO 丝光椋鸟.
- Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): NIUSHÍ BĀGĒ 牛屎八哥
(2:83; 3:131)

SERIOPHUS	SĪGUĀNNIÀO SHŪ 丝冠鸟属
Die Gattung SERIOPHUS Swainson	2:1
SERINUS	SĪQUÈ SHŪ 丝雀属
Die Gattung SERINUS Koch	2:389
SIBIA (Sammelbezeichnung, zur Gattung ACTINODURA gehörende Timalien) → BRILLEN-, FORMOSA-, TONGKING-, YÜNNANSIBIA	BĀNCHIMÉI 斑翅鹛 2:226
SIBIRISCHE DROSSEL → SCHIEFERDROSSEL	
SICHELENTE	LUÓWÉN YĀ 罗纹鸭
Anas falcata Georgi	1:32; 3:41
SICHELHUHN	LIÁNCHÌJÍ 红翅鸡
Falcipennis falcipennis (Hartlaub)	1:74
SICHELPITTA	SHUĀNGBIÀN-BĀSÈDÔNG 双辩八色鸫
Anthocincla phayrei Blyth	2:5
SICHELSÄBLER	JIĀNZUİMÉI 剑嘴鹛
Xiphirhynchus superciliaris (Blyth)	2:175
SICHELSTRANDLÄUFER	WĀNZUǐ BĪNYÙ 弯嘴滨鹬
Calidris ferruginea (Pontoppidan)	1:142
SIEBOLDTAUBE	LÜJÍU 绿鸠, auch HÓNGCHÌ LÜJÍU (1:162; 3:78)
Treron sieboldii (Temminck)	
SIKANG-KEILSCHWANZHuhn	XĪKĀNG ZHÌCHŪN 西康雉鹑
Tetraophasis obscurus (J. Verreaux)	1:80
SILBERALK	BIĀNZUǐHĀIQŪ 扁嘴海雀
Synthliboramphus antiquus (Gmelin)	1:159
SILBERBRUST-BREITMAUL	YÍNXIÖNG SĪGUĀNNIÀO 银胸丝冠鸟
Serilophus lunatus (Gould)	2:1
SILBERFASAN	BÁI XIÁN 白鹇
Lophura nycthemera (Linnaeus)	1:98
SILBERMÖWE	YÍN ÖU 银鸥
Larus argentatus Pontoppidan	1:148

SILBEROHR-SONNENVOGEL
Leiothrix argentauris (Hodgson)

SILBERREIHER
Casmerodus albus (Linnaeus), =
Egretta alba (Linnaeus)

SINGSWAN
Cygnus cygnus (Linnaeus)

SINGVÖGEL (Ordnung) → PASSERIFORMES, → SPERLINGSVÖGEL

SIPHIA
Die Gattung SIPHIA Hodgson

SITTA
Die Gattung SITTA Linnaeus

SITTICH (Sammelbezeichnung)
→ BART-, CHINA-, HALSBAND(oder KLEINER ALEXANDER)-, HIMALAYA-, LANGSCHWANZ-, ROSENKOPFSITTICH
→ PAPAGEI

SITTIDAE
Die Familie SITTIDAE (Spechtmeisen oder Kleiber)

SIVA (Sammelbezeichnung; zur Gattung MINLA gehörende Timalien)
→ BÄNDER-, BLAUFLÜGEL-, ROTSCHEWANZ-
SIVA

SMARAGDSPINT
Merops orientalis Latham

SOMATERIA
Die Gattung SOMATERIA Leach

SONNENVOGEL (CHINANACHTIGALL)
Leiothrix lutea (Scopoli)

YÍNĚR XIĀNGSINIÀO 银耳相思鸟
2:220

DÀ BÁILÙ 大白鹭. - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): BÁI LÃO-GUĀN 白老冠
(1:15; 3:34)

TIĀNÉ 天鹅, auch DÀ TIĀNÉ 大天鹅. - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): DÀ BÁIÉ 大白鹅
1:28; 3:39

→ JĪWĒNG SHŪ 姫鹟属
(2:307)

SHĪ SHŪ 鸲属
2:350

YÍNGWÚ 鹦鹉
(1:173)

SHÍKÈ 鸶科
2:350; 3:215

XÍMÉI 希鹛
(2:229)

LÜHÓU FĒNGHŪ 绿喉蜂虎
1:215

→ RÓNGYĀ SHŪ 绒鸭属
(1:37)

HÓNGZUǐ XIĀNGSINIÀO 红嘴相思鸟
2:221; 3:179

SPATELSCHWANZDRONGO
Dicrurus remifer (Temminck)

SPATZ → HAUSSPERLING
→ MÁQUÈ (2)
→ SPERLING (Sammelbezeichnung)

SPECHT (Sammelbezeichnung)
→ BLASSKOPF-, BRAUNBAUCH-, BUNT-, DREIZEHEN-, GELBHAUBEN-, GELBNACKEN-, GOLDMANTEL-, GRAU-, GRAU-SCHEITEL-, KIZUKI-, KLEIN-, ROST-, ROSTBAUCH-, ROTBRUST-, ROTOHRR-, SCHUPPENBAUCH-, SCHWARZ-, STREIFENBRUST-, SULTAN-, TÜPFELZWERG-, WEISSBAUCH-, SCHWARZ-, WEISSBRAUENMAUS-, WEISSFLÜGEL-, WEISSRÜCKEN-SPECHT

SPECHE (Familie) → PICIDAE

SPECHTMIEISE → KLEIBER (1) und (2)

SPECHTMIESEN (Familie) → SITTIDAE

SPECHTVÖGEL (Ordnung) → PICIFORMES

SPELAEORNIS
Die Gattung SPELAEORNIS David et Oustalet

SPERBER
Accipiter nisus (Linnaeus)

SPERBEREULE
Surnia ulula (Linnaeus)

SPERBERGRASMÜCKE
Sylvia nisoria (Bechstein)

SPERBERKUCKUCK
Hierococcyx sparverioides (Vigors)

XIǎO PÁNWĒI 小盘尾
2:79

ZHUÓMÙNIÀO 啄木鸟
(1:221)

LIÁOMÉI SHŪ 鸱鸺属
2:176

QUE YÍNG 雀鹰. - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): YÀOYÍNG 鹊鹰; YÀOZÌ 鹊子
1:47; 3:47

MĚNGXIÀO 益鸟
1:191

HÉNGBĀN YÍNG 横斑莺
2:271

YÍNGTÓU DÙJUĀN 鹰头杜鹃. - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): YÁNGQUÈ 洋雀
(1:176; 3:84)

SPERLING (Sammelbezeichnung)
 → FELD-, HAUS-, RÖTEL-, SAXAUL-,
 WEIDENSPERLING (Gattung PASSER).
 → ERDSPERLING (= → DAVID-SCHNEE-
 FINK, Gattung MONTIFRINGILLA).
 → SCHNEESPERLING (= → SCHNEEFINK,
 Gattung MONTIFRINGILLA).
 → STEINSPERLING (Gattung PETRONIA)

SPERLINGE (Familie) → PASSERIDAE

SPERLINGSKAUZ
Glaucidium passerinum (Linnaeus)

SPERLINGSVÖGEL (Ordnung) → SING-
 VÖGEL, → PASSERIFORMES

SPHENURUS

Die Gattung SPHENURUS Swainson [von 1:161
 manchen Autoren als Gattung be-
 trachtete Untergattung der Gat-
 tung TRERON Vieillot]

SPIEGELROTSCHWANZ

Phoenicurus auroreus (Pallas)

SPIESSBEKASSINE → STIFTBEKASSINE

SPIESSENTE
Anas acuta Linnaeus

SPILORNIS
 Die Gattung SPILORNIS G.R. Gray

SPINNENJÄGER (Sammelbezeichnung)
 → GRAUKEHL-, STREIFENSPINNENJÄGER

SPINT (Sammelbezeichnung, = BIENEN-
 FRESSER (3))

→ BENGALEN-, BLAUBART-, BLAUSCHWANZ-,
 HINDU-, SMARAGDSPINT
 → BIENENFRESSER (1)

MÁQUE 麻雀 . Dieser Name bezeich-
 net im engeren Sinne den → FELD-
 SPERLING, *Passer montanus* (Linnae-
 us), im weiteren Sinne Angehörige
 der Gattung PASSER.
 (2:373)

BĚI XIŪLIÚ 北褐鶲
 1:191

LÜJIŪ SHŪ 绿鳩属

BĚI HÓNGWÉIQÚ 北红尾鶲 . - Volks-
 tümliche Bezeichnung (in S-Shensi):
 HUÓYÀN 火燕
 2:137; 3:152

ZHĒNWÉI YĀ 针尾鶲 . - Volkstüm-
 liche Bezeichnung (in S-Shensi):
 JIĀNWÉI YĀ 尖尾鶲
 1:31; 3:40

SHÉDIĀO SHŪ 蛇鶲属
 1:63

BÚZHŪNIĀO 捕蛛鸟
 (2:370)

FĒNGHŪ 蜂虎
 (1:214)

SPINTE (Familie) → MEROPIDAE

SPINUS
 Die Gattung SPINUS Koch

SPITZSCHWANZ-BRONZEMÄNNCHEN
Lonchura striata (Linnaeus)
 (Aus ihm züchtete man in China
 und Japan seit Jahrhunderten als
 Haustier das "Japanische Möwchen")

SPITZSCHWANZ-LAUFHÜHNCHEN
Turnix sylvatica (Desfontaines)

SPITZSCHWANZ-STRANDLÄUFER
Calidris acuminata (Horsfield)

SPIZAETUS Vieillot → NISAETUS
 Hodgson

SPIZIXOS
 Die Gattung SPIZIXOS Blyth

SPORNAMMER
Calcarius lapponicus (Linnaeus)

SPORNPIEPER
Anthus novaeseelandiae (Gmelin)

SPOTTDROSSEL → CHINESISCHE SPOTT-
 DROSSEL

SPROSSERROTSCHWANZ (ZÜGELROTSCHWANZ) HÓNGBÈI HÓNGWÉIQÚ 红背红尾鶲
Phoenicurus erythronotus (Eversmann) 2:134

SQUATAROLA
 Die Gattung SQUATAROLA Cuvier
 [Ein früher für den → KIEBITZREGEN-
 PFEIFER, *Pluvialis squatarola* (Lin-
 naeus), häufig gebrauchter Gattungs-
 name; heute wird eine Gattung SQUA-
 TAROLA nicht mehr von PLUVIALIS ge-
 trennt]

→ JÍNCHÌ SHŪ 金翅属
 (2:390)

BÁIYÀO WÉNNIĀO 白腰文鸟
 2:386

LÍN SĀNZHÍCHÚN 林三趾鹑
 1:109

JIĀNWÉI BÍNYÙ 尖尾滨鹬
 1:141

YÍNGZUÍBĒI SHŪ 鹦嘴鶲属
 2:59

TIĚZHÀOWŪ 铁爪鹀
 2:448

TIÁN LIŪ 田鶲
 (2:31); 3:114

HUĪBĀNHÉNG SHŪ 灰斑鶲属
 (1:125)

STACHELSCHWANZSEGLER	ZHĒNWĒIYŪYĀN 针尾雨燕
Hirundapus caudacutus (Latham)	1:204
STACHYRIS	SUÌMÉI SHŪ 穗鹛属
Die Gattung STACHYRIS Blyth	2:180
STAR	ZǐCHÌ LIÁNGNIÀO 紫翅椋鸟
Sturnus vulgaris Linnaeus	2:82
STAR (Sammelbezeichnung)	LIÁNGNIÀO 棕鸟
→ ELSTER-, GRAUKOPF-, GRAUSCHWALBEN-, GRAU-, MANDARIN-, MONGOLEN-, ROSEN-, SCHWARZHALS-, SEIDEN-, STAR, VIOLETTRÜCKEN (=ROSTBACKEN)-	(2:80)
STAR	
→ MAINA (4 Arten); → BEO	
STARE (Familie) → STURNIDAE	
STEINADLER	JÍN DIÀO 金雕 . - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): JIÉBÁIDIÀO
Aquila chrysaetos (Linnaeus)	洁白雕 1:53; 3:49
STEINKAUZ	XIÀOXIÀO 小鵟, auch ZÒNGWÉNFÙ
Athene noctua (Scopoli)	XIÀOXIÀO 纵纹腹小鵟 1:194; 3:93
STEINORTOLAN	HUĪJÍNG WŪ 灰颈鵟
Emberiza buchanani Blyth	2:436
STEINRÖTEL	BÁIBÈI JÍDÔNG 白背矶鸫
Monticola saxatilis (Linnaeus)	2:152
STEINSCHMÄTZER	SUÌ JÍ 穗鹛
Oenanthe oenanthe (Linnaeus)	2:149
STEINSCHMÄTZER (Sammelbezeichnung, Gattung OENANTHE)	JÍ 鹟. (Durch vorangesetzte Silben werden die Artnamen gebildet)
→ ISABELL-, NONNEN-, STEINSCHMÄTZER, (2:149)	
WÜSTENSTEINSCHMÄTZER	
STEINSPERLING	SHÍQUÈ 石雀
Petronia petronia (Linnaeus)	2:378

STEINWÄLZER	FĀNSHÍYÙ 翻石鹬
Arenaria interpres (Linnaeus)	1:136
STEISSFÜSSE → LAPPENTAUCHER	
STELZE (Sammelbezeichnung)	JÍLÍNG 鸥鸽
→ BACH-, BAUM(WALD)-, GEBIRG-, SCHAF-, ZITRONENSTELZE	(2:34)
STELZEN (Familie) → MOTACILLIDAE	
STELZENLÄUFER	HēICHÌ CHÁNGJIÀOYÙ 黑翅长脚鹬
Himantopus himantopus (Linnaeus)	1:144
STELZENLÄUFER (Familie) → RECURVIROSTRIDAE	
STENTORROHRSÄNGER	NÁN DÀ WĚIYÍNG 南大苇莺
Acrocephalus stentoreus (Hemprich et Ehrenberg)	2:267
STEPHENADLER	CÁOYUÁN DIÀO 草原雕
Aquila nipalensis (Hodgson)	(1:55)
STEPHENBRAUNELLE	HÈLÁNSHĀN YÁNLÌU 贺兰山岩鹨
Prunella koslowi (Przevalski)	2:120
STEPHENHUHN	MÁOTUÍSHĀJÍ 毛腿沙鸡
Syrrhaptes paradoxus (Pallas)	1:160
STEPPENSCHLAMMLÄUFER	BÀNPǔYÙ 半蹼鹬
Limnodromus semipalmatus (Blyth)	1:137
STEPHENWEIHE	CÁOYUÁN YÀO 草原鹞
Circus macrourus (Gmelin)	1:61
STERNA	YÀN'ÓU SHŪ 燕鸥属
Die Gattung STERNA Linnaeus	1:153
STERNTAUCHER	HÓNGHÓU QIÁNNIÀO 红喉潜鸟
Gavia stellata (Pontoppidan)	1:1
STIEGLITZ (DISTELFINK)	HÓNGÉ JÍNCHÍ 红额金翅, auch HÓNGÉ JÍNCHÍQUÈ 红额金翅雀
Carduelis carduelis (Linnaeus)	(2:392)

STIFTBEKASSINE (SPIESSBEKASSINE)
Gallinago stenura (Bonaparte)

STOCKENTE
Anas platyrhynchos Linnaeus

STÖRCHE (Familie) → CICONIIDAE

STORCH (Sammelbezeichnung)
→ WEISSSTORCH, → SCHWARZSTORCH;
→ MALAIENSTORCH (ADJUTANT)

STRANDLÄUFER (Sammelbezeichnung)
→ ALPEN-, LANGZEHEN-, LÖFFEL-,
ROTKEHL-, SICHEL-, SPITZSCHWANZ-,
TEMMINCKSTRANDLÄUFER, sowie GROSSER
KNUTT, KNUTT und SANDLING

STRAUCHROHRSÄNGER
Acrocephalus concinens (Swinhoe)

STREIFENBABAX
Babax lanceolatus (Verreaux)

STREIFENBRUSTSPECHT
Dendrocopos atratus (Blyth)

STREIFENBRUST-ZAUNKÖNIGTIMALIE
Napothera epilepidota (Temminck)

STREIFENBÜLBÜL
Pycnonotus striatus (Blyth)

STREIFENGANS
Anser indicus (Latham)

ZHĒNWĒI SHĀZHUI 针尾沙锥
(1:138; 3:72)

LÜTÓU YĀ 绿头鸭 . - Volkstümli-
che Bezeichnung (in S-Shensi):
DÀYÉYĀ 大野鸭 ; für das Weibchen:
DÀMÁYĀ 大麻鸭
1:32; 3:41

GUÀN 鹳
(1:21)

BĪNYŪ 滨鹬
(1:140)

DÀOTIÁN WĒIYÍNG 稻田苇莺 . - Die-
ser Name bezeichnet auch den →
FELDROHRSÄNGER, Acrocephalus agri-
cola (Jerdon)
(2:268; 3:189)

MÀOWÉN CÀOMÉI 孜纹草鹛
2:198; 3:172

WÉNXIÖNG ZHUÓMÙNIÀO 纹胸啄木鸟
1:236

WÉNXIÖNG DÖNGMÉI 纹胸鹤鹛
2:176

ZÖNGWÉN LÜ BĒI 纵纹绿鹛
2:58

BĀNTÓU YÀN 斑头雁 . - Volkstümli-
che Bezeichnung (in S-Shensi): BÁI-
TÓU YÀN 白头雁
1:28; 3:39

STREIFENKEHLBÜLBÜL
Pycnonotus finlaysoni Strickland

STREIFENKOPF-LAUBSÄNGER
Phylloscopus reguloides (Blyth)

STREIFENOHRREULE
Otus brucei (Hume)

STREIFENROHRSÄNGER → BRAUENROHR-
SÄNGER

STREIFENSCHWIRL
Locustella certhiola (Pallas)

STREIFEN-SPINNENJÄGER
Arachnothera magna Blyth

STREIFENTIMALIE
Pellorneum ruficeps Swainson

STREPTOPELIA
Die Gattung STREPTOPELIA Bona-
parte

STRICHELBRAUNELLE
Prunella strophiata (Blyth)

STRICHELSCHWALBE
Cecropis striolata (Temminck et
Schlegel)

STRICHELSCHWIRL
Locustella lanceolata (Temminck)

STRIGIDAE
Die Familie STRIGIDAE (Eigent-
liche Eulen)

STRIGIFORMES
Die Ordnung STRIGIFORMES (Eulen)

STRIX
Die Gattung STRIX Linnaeus

WÉNHÓU BĒI 纹喉鸨
2:58

GUĀNWÉN LIÜYÍNG 冠纹柳莺 . -
Volkstümliche Bezeichnung (in S-
Shensi): LIŪCHUÀN'R 柳事儿
2:286; 3:195

ZÖNGWÉN JIÀOXIĀO 纵纹角鶲
1:185

XIǎO HUÁNGYÍNG 小煌莺
2:263

WÉNBĒI BŪZHŪNIÀO 纹背捕蛛鸟
2:370

ZÖNGTÓU YŌUMÉI 棕头幽鹛
2:169

BĀNJIŪ SHŪ 斑鳩属
1:168

ZÖNGXIÖNG YÁNLÌU 棕胸岩鹨
2:117; 3:143

BĀNYÀO YÀN 斑腰燕
(2:23)

MÀOBĀN HUÁNGYÍNG 斑斑煌莺
2:265

CHÍXIĀO KĒ 鸱鸺科
1:184; 3:88

XIĀO-XÍNG MÙ 鸱形目
1:183; 3:88

LÍNXIĀO SHŪ 林鸮属
1:196

STUMMELLERCHE
Calandrella rufescens (Vieillot)

STURMMÖWE
Larus canus Linnaeus

STURMSCHWALBE (Sammelbezeichnung)
(1:7)

STURMSCHWALBEN (Familie) → HYDROBATIDAE, → WELLENLÄUFER

STURMTAUCHER (Sammelbezeichnung)
→ WEISSGESICHT-, KEILSCHWANZ-,
DUNKELSTURMTAUCHER

STURMVÖGEL (Familie) → PROCELLARIIDAE

STURMVOGEL (Sammelbezeichnung)
→ EIS-, BRUSTBAND-, TAHITI-, BULWERSTURMVOGEL

STURNIA
Die Gattung STURNIA Lesson

STURNIDAE
Die Familie STURNIDAE (Stare)

STURNOPASTOR
Die Gattung STURNOPASTOR Blyth

SHĀBÀILÍNG 沙百灵 . - Dieser Name bezeichnet auch die → TSCHILILERCHE, Calandrella cheleensis (Swinhoe) (2:5)

HÀI ŌU 海鸥
1:147

HÀIYÁN 海燕
(1:7)

HUÒ 鱼。Der chinesische Ausdruck ist umfassender, da er alle → PROCELLARIIDAE - jedoch nicht die → HYDROBATIDAE - sprachlich mit einbegreift, also auch die im deutschen Sprachgebrauch unter → STURMVOGEL zu findenden Arten
1:5

HUÒ 鱼。Der chinesische Ausdruck ist umfassender, da er alle → PROCELLARIIDAE - jedoch nicht die → HYDROBATIDAE - sprachlich mit einbegreift, also auch die → STURMTAUCHER
(1:5)

→ LIÁNGNIÀO SHŪ 棕鸟属
(2:80)

LIÁNGNIÀO KĒ 棕鸟科
2:80; 3:130

→ LIÁNGNIÀO SHŪ 棕鸟属
(2:80)

STURNUS
Die Gattung STURNUS Linnaeus

STUTZSCHWANZ-ZAUNKÖNIGTIMALIE
Napothera brevicaudata (Blyth)

SÜDSEEDROSSEL
Turdus poliocephalus Latham

SÜDSEESCHWALBE
Hirundo tahitica Gmelin

SULA
Die Gattung SULA Brisson

SULIDAE
Die Familie SULIDAE (Tölpel)

SULTANSMEISE → GOLDSCHOPFMEISE

SULTANSPECHT
Chrysocolaptes lucidus (Scopoli)

SUMPFHUHN (Sammelbezeichnung)
→ KLEINES SUMPFHUHN, MANDARIN-,
TÜPFEL-, ZIMT-, ZWEIFARBEN-,
ZWERGSUMPFHUHN

SUMPFLÄUFER
Limicola falcinellus (Pontoppidan)

SUMPFLERCHE
Melanocorypha maxima Blyth

SUMPFMEISE
Parus palustris Linnaeus

SUMFOHREULE
Asio flammeus (Pontoppidan)

SUNIAEULE
Otus sunia (Hodgson)

→ LIÁNGNIÀO SHŪ 棕鸟属
(2:80)

HÓNGWÉI DÔNGMÉI 红尾鵙鹛
2:175

DÀO DÔNG 岛鵙
2:161

YÁNG YÀN 洋燕
2:21

JIĀNNIÀO SHŪ 鲸鸟属
1:9

JIĀNNIÀO KĒ 鲸鸟科
1:9

JÍNBÈIZHŪMÙNIÀO 金背啄木鸟
1:240

TIĀNJÍ 田鸡
(1:115)

KUÒZUÍYÙ 阔嘴鹬
1:143

CHÁNGZUÍ BÀILÍNG 长嘴百灵
2:9

ZHĀOZÉ SHĀNQUÈ 沼泽山雀
2:340; 3:212

DUĀN ĚRXIÀO 短耳鸮
1:199

HÓNG JIÀOXIÀO 红角鸮 . - Volks-tümliche Bezeichnung (in S-Shensi):
YÈ MĀOZǐ 夜猫子
1:185

SURNIA	MĒNGXIĀO SHŪ 猛鶲属
Die Gattung SURNIA Duméril	1:191
SURNICULUS	WŪJUĀN SHŪ 乌鵰属
Die Gattung SURNICULUS Lesson	1:181
SWINHOEFASAN	LÁNFÙ XIÁN 蓝腹鹇
Lophura swinhoii (Gould)	1:99
SWINHOE-NILJAVA	ZŌNGFÙ LÁN WĒNG 棕腹蓝翁
Niltava vivida (Swinhoe)	2:317
SWINHOE-WELLENLÄUFER	HĒI CHĀWÉIHÁIYÀN 黑叉尾海燕
Oceanodroma monorhis (Swinhoe)	1:7
SYLVIA	YÍNG SHŪ 莺属
Die Gattung SYLVIA Scopoli	2:271
SYLVIIDAE	YÍNG KĒ 莺科
Die Familie SYLVIIDAE (Grasmückenartige) [Cheng Tso-hsin 2:250 hat stattdessen SYLVIINAE YÍNG YÁKÈ 莺亚科]	(2:250)
SYLVIPARUS	LÍNQUÈ SHŪ 林雀属
Die Gattung SYLVIPARUS Burton	2:345
SYNTHLIBORAMPHUS	BIĀNZUĬHÁIQUÈ SHŪ 扁嘴海雀属
Die Gattung SYNTHLIBORAMPHUS Brandt	1:159
SYRMATICUS	CHÁNGWĒIZHÌ SHŪ 长尾雉属
Die Gattung SYRMATICUS Wagler	1:106
SYRRHAPTES	MÁOTUĬSHĀJĪ SHŪ 毛腿沙鸡属
Die Gattung SYRRHAPTES Illiger	1:159
SZETSCHWANHÄHER	HĒITÓU ZÀOYĀ 黑头噪鹛
Perisoreus internigrans (Thayer et Bangs)	2:88
SZETSCHWAN-KEILSCHWANZHÜHN	SÍCHUĀN ZHÌCHÚN 四川雉鹑
Tetraophasis szechenyii Madarász	1:80

T

TACHYBAPTUS	→ PÍTÍ SHŪ 鹈鷺属
Die Gattung TACHYBAPTUS Reichenbach	(1:2)
TACZANOWSKIBUSCHSÄNGER	BĚI DUĀNCHÍYÍNG 北短翅莺
Bradypterus taczanowskii (Swinhoe)	2:260; 3:188
TACZANOWSKI-SCHNEEFINK (TACZANOWSKI-SCHNEESPERLING)	BÁIYÀO XUÉQUÈ 白腰雪雀
Montifringilla taczanowskii (Przewalski)	2:381
TACZANOWSKI-SCHNEESPERLING → TACZANOWSKI-SCHNEEFINK	
TADORNA	MÁYĀ SHŪ 麻鸭属
Die Gattung TADORNA Oken	1:30
TAFELENTE	HÓNGTÓU QIÁNYĀ 红头潜鸭
Aythya ferina (Linnaeus)	1:34
TAHITI-STURMVOGEL	GŌUZUĬ YUÁNWĒIHUÒ 钩嘴圆尾鹱
Pterodroma rostrata (Peale)	1:6
TANNENHÄHER	XÍNGYĀ 星鶲
Nucifraga caryocatactes (Linnaeus)	2:100; 3:136
TANNENMEISE	MÉI SHĀNQUÈ 煤山雀
Parus ater Linnaeus	2:337; 3:210
TANNENSCHNÄPPER → MUGIMAKISCHNÄPPER	
TARSIGER	QÚ SHŪ 鸱属
Die Gattung TARSIGER Hodgson	2:130
TAUBE (Sammelbezeichnung)	GEŽI 鸽子
→ BINDEN-GRÜN-, BINDENSCHWANZ-, FELSEN-, FORMOSA-GRÜN-, FRUCHT-(3 Arten), GELBAUGEN-, GLANZKÄFER-, HIMALAYA-, HOHL-, KEILSCHWANZ-GRÜN-, KLIPPEN-, KUPFER-, MARONEN-, MEENA-, PALM(oder SENEGAL)-,	

PAPAGEISCHNABEL-, PERLHALS-, RINGEL-, SCHNEE-, SCHWARZSCHNABEL-
OLIVEN-, SIEBOLD-, TÜRKEN-, TURTEL-, VEILCHEN-, ZWERGLACHTAUBE
TAUBEN (Familie) → COLUMBIIDAE

TAUBENVÖGEL (Ordnung) → COLUMBIIFORMES

TAUCHER → LAPPENTAUCHER, → SEE-TAUCHER

TEESA (Sammelbezeichnung)
→ KIEFERN-, WEISSAUGENTEEASA

TEICHHUHN
Gallinula chloropus (Linnaeus)

TEICHROHSÄNGER
Acrocephalus scirpaceus (Hermann)

TEICHWASSERLÄUFER
Tringa stagnatilis (Bechstein)

TEMENUCHUS
Die Gattung TEMENUCHUS Cabanis

TEMMINCKSTRANDLÄUFER
Calidris temminckii (Leisler)

TEMMINCKTRAGOPAN
Tragopan temminckii (J.E. Gray)

TEMNURUS
Die Gattung TEMNURUS Lesson

TEPHRODORNIS
Die Gattung TEPHRODORNIS Swainson

KUÁNGYÍNG 猛鷹
(1:51)

HĒISHUÍJÍ 黑水鸡, auch HÓNGGUDÍNG
红骨顶
1:119; 3:65

LÚ WĒIYÍNG 芦苇莺
2:267

ZÉ YÙ 泽鹬
1:134

→ LIÁNGNIÀO SHŪ 棕鸟属
(2:80)

WŪJIÀO BÍNYÙ 乌脚滨鹬
1:141; 3:74

HUÍBĀN JIÀOZHÌ 灰斑角雉 ; auch
HÓNGFÙ JIÀOZHÌ 红腹角雉 , welches neben HÓNGJÍ 红鸡 gleichzeitig einer der beiden volkstümlichen Namen (in S-Shensi) ist.
1:94; 3:56

→ SHÙQUÈ SHŪ 树鹊属
(2:97)

LÍNJUÉ SHŪ 林鵠属
2:40

TEREKIA → XENUS

TEREKWASSERLÄUFER
Xenus cinereus (Güldenstädt)

TERPSIPHONE
Die Gattung TERPSIPHONE Gloger

TESIA (1)
Die Gattung TESIA Hodgson

TESIA (2) (Sammelbezeichnung)
→ GOLDSCHEITEL-, GRAUBAUCH-, ROT-KOPFTESIA

TETRAO
Die Gattung TETRAO Linnaeus

TETRAOGALLUS
Die Gattung TETRAOGALLUS J.E. Gray

TETRAONIDAE
Die Familie TETRAONIDAE (Rauhfuhthühner), (heute gewöhnlich als Unterfamilie der → PHASIANIDAE angesehen)

TETRAOPHASIS
Die Gattung TETRAOPHASIS Elliot

TETRASTES
Die Gattung TETRASTES Keyserling et Blasius

TETRAX
Die Gattung TETRAX F. Forster

THALASSEUS
Die Gattung THALASSEUS Boie

THORSHÜHNCHEN
Phalaropus fulicarius (Linnaeus)

THRESKIORNIS
Die Gattung THRESKIORNIS G.R. Gray

QIÁOZUÍYÙ 翘嘴鹬
(1:136)

SHÒUDÀI SHŪ 寿带属
2:328

→ DÌYÍNG SHŪ 地莺属
(2:250)

DÌYÍNG 地莺
(2:250)

SŌNGJÍ SHŪ 松鸡属
1:73

XUĚJÍ SHŪ 雪鸡属
1:77

SŌNGJÍ KĒ 松鸡科
1:73

ZHÍCHÚN SHŪ 雉鹑属
1:79

ZHĒNJÍ SHŪ 椋鸡属
1:74

→ BĀO SHŪ 鸱属
(1:120)

FÈNGTÓUYÀN'ŌU SHŪ 凤头燕鸥属
1:157

HUÍ BÀNPŪYÙ 灰瓣蹼鹬
1:145

BÁIHUÁN SHŪ 白鹳属
1:23

THRESKIORNITHIDAE	HUÁN KĒ 鹳科
Die Familie THRESKIORNITHIDAE (Ibis)	1:23; 3:37
THURAGIMPEL (WALDGIMPEL) Carpodacus thura Bonaparte et Schlegel	BÁIMÉI ZHŪQUÈ 白眉朱雀 2:410
TIBETFLUGHUHN Syrrhaptes tibetanus Gould	XÍZÀNG MÁOTUISHĀJÍ 西藏毛腿沙鸡 1:160
TIBET-KÖNIGSHUHN Tetraogallus tibetanus Gould	XUĚJĪ 雪鸡 1:77
TIBETLACHMÖWE Larus brunnicephalus Jerdon	ZŌNGTÓU ŌU 棕头鸥 1:150
TIBETLERCHE Calandrella acutirostris Hume	XÌZUÍ SHĀBAILÍNG 细嘴沙百灵 2:8
TIBETTREBUHN Perdix hodgsoniae (Hodgson)	GĀOYUÁN SHĀNCHÚN 高原山鹑 1:84
TIBETWÜRGER Lanius tephronotus (Vigors)	HUÍBÈI BÓLÁO 灰背伯劳 2:72; 3:159
TICHODROMA Die Gattung TICHODROMA Illiger	XUÁNBÌQUÈ SHŪ 旋壁雀属 2:355
TICHODROMIDAE Die Familie TICHODROMIDAE (Mauerläufer)	→ SHÍKĒ 鹳科 (2:350)
TICKELLTIMALIE Heterophasia melanoleuca (Blyth)	QUÈSÈ QÍMÉI 鹊色奇鹛 2:249
TIGERASTRILD → TIGERFINK	
TIGERFINK (TIGERASTRILD) Amandava amandava (Linnaeus)	HÓNGMÉIHUĀQUÈ 红梅花雀 (2:385)
TIGERWÜRGER Lanius tigrinus Drapiez	HŪWÉN BÓLÁO 虎纹伯劳 2:67; 3:125
TIMALIA Die Gattung TIMALIA Horsfield	MÉI SHŪ 鹩属 2:184

TIMALIEN (Familie) → TIMALIIDAE	
TIMALIIDAE	→ HUÀMÉI KĒ 画眉科 (2:169)
Die Familie TIMALIIDAE (Timalien oder Drosselmeisen)	
TISA	→ WŪ SHŪ 鸦属 (2:429)
Die Gattung TISA Clark	
TÖLPEL (1) (Sammelbezeichnung)	JIĀNNIĀO 针鸟 (1:9)
→ BRAUNTÖLPEL (WEISSBAUCHTÖLPEL),	
→ ROTFUSSTÖLPEL	
TÖLPEL (2) (Familie) → SULIDAE	
TONGKINGSIBIA	HUÍTÓU BĀNCHIMÉI 灰头斑翅鹛 2:228
Actinodura souliei Oustalet	
TONKIBÜLBÜL	HĒIHÓU-HÓNGTÚN BĒI 黑喉红臀鶲 2:57
Pycnonotus cafer (Linnaeus)	
TRAGOPAN (1)	JIÀOZHÌ SHŪ 角雉属 1:93
Die Gattung TRAGOPAN Cuvier	
TRAGOPAN (2) (Sammelbezeichnung)	JIÀOZHÌ 角雉 (1:93)
→ BRAUNBAUCH-, SATYR-, SCHWARZ-	
KOPF-, TEMMINCK-TRAGOPAN	
TRAPPE (Sammelbezeichnung)	BĀO 鸱 (1:120)
→ GROSS-, KRAGEN-, ZWERGTRAPPE	
TRAPPEN (1) (Familie) → OTIDIDAE	
TRAPPEN (2) (Ordnung) → OTIDIFORMES	
TRAUERENTE	HĒI HĀIFĀNYĀ 黑海番鸭 (1:38)
Melanitta nigra (Linnaeus)	
TRAUERFISCHER	GUĀN YÚGŌU 冠鱼狗 1:209; 3:97
Ceryle lugubris (Temminck)	
TRAUERHORNVOGEL	BĀNXĪNIĀO 斑犀鸟 (1:219)
Anthracoboceros coronatus (Boddaert)	
TRAUERRAUPENFÄNGER	ĀNHUĪ JUĀNJIŪÉ 暗灰鹃鵙 2:42; 3:119
Coracina melaschistos (Hodgson)	

TRAUERSEESCHWALBE	HĒI FŪŌU 黑浮鸥
Chlidonias niger (Linnaeus)	1:152
TRERON	SHĀNJIŪ SHŪ 山鳩属
Die Gattung TRERON Vieillot (s. dazu die Bemerkungen zur Gattung → SPHENURUS Swainson)	1:162
TRICHLASTOMA	YĀMÉI SHŪ 雉鶲属
Die Gattung TRICHLASTOMA Blyth	2:170
TRIEL → KRABBENTRIEL	
TRIELE (Familie) → BURHINIDAE	
TRILLERKAUZ	XIŪLIŪ 鸣鸺 (1:192; 3:92)
Glaucidium castanopterum (Hors- field)	
TRILLERSPERBER	SŌNG QUÈ YĪNG 松雀鹰 . - Volks- tümliche Bezeichnung (in S-Shensi): QUÈYÀO 雀鷹, YÀOZI 鷹子 1:48; 3:47
TRINGA	YÙ SHŪ 鹬属 (1:133)
Die Gattung TRINGA Linnaeus, → Bemerkungen zu → YÙ SHŪ 鹬属	
TRISTRAMAMMER	BÁIMÉI WŪ 白眉鵙 2:443
Emberiza tristrami Swinhoe	
TROGLODYTES	JIĀOLIÁO SHŪ 焦鶲鶲属 2:112
Die Gattung TROGLODYTES Vieillot	
TROGLODYTIIDAE	JIĀOLIÁO KĒ 鷫鶲科 2:112; 3:142
Die Familie TROGLODYTIIDAE (Zaun- könige)	
TROGON → ROTKOPFTROGON	
TROGONE (1) (Familie) → TROGONIDAE	
TROGONE (2) (Ordnung) → TROGONI- FORMES	

TROGONIDAE	YĀOJUĀN KĒ 咬鹃科
Die Familie TROGONIDAE (Trogone)	1:208
TROGONIFORMES	YĀOJUĀN MÙ 咬鹃目
Die Ordnung TROGONIFORMES (Trogone)	1:208
TROPIKVÖGEL (Familie) → PHAETHONTI- DAE	
TROPIKVOGEL (Sammelbezeichnung) → ROTSCHNABEL-, ROTSWANZ-, WEISS- SCHWANZ-TROPIKVOGEL	MĒNG 鸟 (1:7-8)
TSCHILILERCHE	SHĀBĀILÍNG 沙百灵 . - Dieser Na- me bezeichnet auch die → STUMMEL- LERCHE, Calandrella rufescens (Vieillot) (2:5)
Calandrella cheleensis (Swinhoe)	
TÜPFELSUMPFHUHN	BĀNXIÓNG TIÁNJĪ 斑胸田鸡 1:116
Porzana porzana (Linnaeus)	
TÜPFELZWERGSPECHT	JÍZHUÓMÙNIÀO 姬啄木鸟 (1:223; 3:101)
Vivia innominata (Burton)	
TÜRKENTAUBE	HUĪ BĀNJIŪ 灰斑鸠 . - Volkstümli- che Bezeichnung (in S-Shensi): BĀN- JIŪ 斑鸠 1:169; 3:81
Streptopelia decaocto (Frivaldszky)	
TUNDRATAUCHER → GELBSCHNABEL-EIS- TAUCHER	
2:121	
TURDINAE	DÔNG YÀKĒ 鸽亚科
Die Unterfamilie TURDINAE (Drossel- artige)	
TURDUS	DÔNG SHŪ 鸽属
Die Gattung TURDUS Linnaeus	2:158
TURMFALKE	HÓNG SŪN 红隼 . - Volkstümliche Be- zeichnung (in S-Shensi): HÓNGYÍNG 红鹰 1:71; 3:52
Falco tinnunculus Linnaeus	

TURNICIDAE	SĀNZHÍCHÚN KĒ 三趾鹑科
Die Familie TURNICIDAE (Wachtelaufhühnchen)	1:109
TURNICIFORMES	SĀNZHÍCHÚN MÙ 三趾鹑目
Die Ordnung TURNICIFORMES (Laufhühnchen)	1:109
TURNIX	SĀNZHÍCHÚN SHŪ 三趾鹑属
Die Gattung TURNIX Bonnaterre	1:109
TURTELTAUBE	BĀNJIŪ 斑鸠
Streptopelia turtur (Linnaeus)	1:168
TYTO	CÀOXIĀO SHŪ 草鸮属
Die Gattung TYTO Billberg	1:183
TYTONIDAE	CÀOXIĀO KĒ 草鸮科
Die Familie TYTONIDAE (Schleier-eulen)	1:183

U

UFERSCHNEPFE	HĒIWÉI CHÉNGYÙ 黑尾塍鹬
Limosa limosa (Linnaeus)	1:133
UFERSCHWALBE	HUĪ SHĀYĀN 灰沙燕. - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi):
Riparia riparia (Linnaeus)	MÁ YĀNZI 麻燕子; SHĀYĀN 沙燕 2:18; 3:108
UGUISU → JAPANBUSCHSÄNGER	
UHU	DIĀOXIĀO 鸱鸺, auch PŪTŌNG DIĀO-XIĀO 普通鸺鸺. - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi):
Bubo bubo (Linnaeus)	HĒNHÚ 恨狐 1:188; 3:89
→ KOROMANDELHU, → FISCHUHU (Gattung KETUPA)	
UNGLÜCKSHÄHER	BĒI ZÀOYĀ 北噪鹛
Perisoreus infaustus (Linnaeus)	2:88

V

UPUPA	DÀISHÈNG SHŪ 戴胜属
Die Gattung UPUPA Linnaeus	1:217
UPUPIDAE	DÀISHÈNG KĒ 戴胜科
Die Familie UPUPIDAE (Wiedehopfe)	1:217; 3:100
URAGUS	CHÁNGWÉIQUE SHŪ 长尾雀属
Die Gattung URAGUS Keyserling et Blasius (richtiger als Untergattung der Gattung CARPODACUS Kaup anzusehen, wenn diese in ihrem weiten Umfang aufrecht erhalten bleibt)	2:417
UROCISSA	→ LÜQUÈ SHŪ 绿鵙属
Die Gattung UROCISSA Cabanis	(2:91)
UROCYNCHRAMUS	ZHŪWŪ SHŪ 朱鹀属
Die Gattung UROCYNCHRAMUS Przewalski	2:428
UROSPHENA	→ SHÙYĪNG SHŪ 树莺属
Die Gattung UROSPHENA Swinhoe	(2:252)
USSURILAUBSÄNGER	HUĪJIĀO LIŪYĪNG 灰脚柳莺
Phylloscopus tenellipes Swinhoe	2:285
VANELLUS	FĒNGTÓUMAIJĪ SHŪ 凤头麦鸡属
Die Gattung VANELLUS Brisson	1:123
VEILCHENTAUPE	GUŌ GĒ 果鸽
Columba janthina Temminck	1:167
VIOLETTRÜCKENSTAR (ROSTBACKENSTAR)	ZĪBÈI LIÁNGNIĀO 紫背椋鸟
Sturnia philippensis (J.R. Forster)	(2:81)
VIREOTIMALIE	DĀNLÜ JUÉMÉI 淡绿购鹛
Pteruthius xanthochloris G.R. Gray	2:225; 3:180
VIVIA	JÍZHUÓMÙ SHŪ 姬啄木属
Die Gattung VIVIA Hodgson	(1:222)

WACHHOLDERDROSSEL	TIÁN DÔNG 田 鹂
<i>Turdus pilaris</i> Linnaeus	2:165
WACHHOLDERKERNBEISER	BÁICHÌ NÌLÀZUÍQUÈ 白 翅 拟 蜡 嘴 雀
<i>Mycerobas carnipes</i> (Hodgson)	2:427; 3:230
WACHTEL (1)	ĀNCHÚN (US ĀNCHŪN) 鹤 鸮 , oder ein- fach CHÚN 鸮 . - Die beiden chine- sischen Namen gelten auch für die → JAPANWACHTEL, <i>Coturnix japonica</i> Temminck et Schlegel 1:86; 3:54
WACHTEL (2) (Sammelbezeichnung) → JAPAN-, ZWERGWACHTEL sowie	CHÚN 鸮 (1:86)
WACHTEL (1)	LÍNG XIŪLIŪ 领 鸶 鸮
WACHTELKAUZ	CHÁNGJIÀOYĀNGJĪ 长 脚 独 鸡
<i>Glaucidium brodiei</i> (Burton)	1:191; 3:92
WACHTELKÖNIG	SĀNZHÍCHÚN 三 趾 鸮
<i>Crex crex</i> (Linnaeus)	1:115
WACHTELLAUFHÜNCHE (1) (Sammel- bezeichnung)	TIÁN WŪ 田 鸥 . - Volkstümliche Be- zeichnung (in S-Shensi): HUĀMÉIZĪ 花 眉 子 2:441; 3:236
WACHTELLAUFHÜNCHE (2) (Familie) → TURNICIDAE	XUÁNMÙQUÈ 旋 木 雀 , auch PŪTÔNG XUÁNMÙQUÈ 普 通 旋 木 雀 2:356; 3:217
WALDBAUMLÄUFER	DÀ SHĀZHUI 大 沙 锥
<i>Certhia familiaris</i> Linnaeus	(1:139)
WALDBEKASSINE	
<i>Gallinago megala</i> Swinhoe	

WALDBRAUNELLE
Prunella immaculata (Hodgson)

WALDGIMPEL → THURAGIMPEL

WALDHÄHERLING
Garrulax ocellatus (Vigors)

WALDKAUZ
Strix aluco Linnaeus

WALDOHREULE
Asio otus (Linnaeus)

WALDPIEPER
Anthus hodsoni Richmond

WALDSCHNEEGIMPEL
Leucosticte nemoricola (Hodgson)

WALDSCHNEIDERVOGEL
Orthotomus atrogularis Temminck

WALDSCHNEPFE
Scolopax rusticola Linnaeus

WALDSTELZE → BAUMSTELZE

WALDWASSERLÄUFER
Tringa ochropus Linnaeus

WANDERFALKE
Falco peregrinus Tunstall

WANDERLAUBSÄNGER (NORDISCHER LAUB-
SÄNGER)

Phylloscopus borealis (Blasius)

WANDERREGENPFEIFER (KLEINER GOLD-
REGENPFEIFER)

Pluvialis dominica (P.L.S. Müller)

HÉHÓNGBÈI YÁNLÌU 褐 红 背 岩 鸥
2:120

YÁNWÉN ZÀOMÉI 眼 纹 噪 鸥
2:209

HUĬ LÍNXIĀO 灰 林 鸮
1:196; 3:94

CHÁNG ĚRXIĀO 长 耳 鸮
1:199; 3:95

SHÙ LIŪ 树 鸮
2:27; 3:112

LÍN DÌQUÈ 林 地 雉
2:396; 3:225

HĒIHÓU FÉNGYÈYÍNG 黑 喉 缝 叶 莺
2:299

QIŪYÙ 立 鸱
1:139

BÀIYĀO Cǎo Yù 白 腰 草 鸱 . - Volks-
tümliche Bezeichnung (in S-Shensi):
LÜZHĀ 绿 鸱
1:134; 3:71

YÓU SŪN 游 雉 . - Der chinesische
Name gilt auch für den → WÜSTEN-
FALKEN, *Falco pelegrinoides* Tem-
minck
(1:67)

JÍBĚI LIÜYÍNG 极 北 柳 莺 . - Volks-
tümliche Bezeichnung (in S-Shensi):
LIŪCHUÀN'R 柳 串 儿
2:283; 3:194

Jīn Héng 金 衍
(1:125; 3:68)

WANDERWASSERLÄUFER
Heteroscelus incanus (Gmelin)

HUÍ YÙ 灰鶲. - Diesen Namen trägt auch der → GRAUBÜRZEL-WASSERLÄUFER, *Heteroscelus brevipes* (Vieillot) (1:135; 3:72)

WARZENIBIS
Pseudibis papillosa (Temminck)

HĒIHUÁN 黑鶲
(1:24)

WASSERAMSEL
Cinclus cinclus (Linnaeus), s. auch → BACHWASSERAMSEL, *Cinclus pallasi* Temminck

HÉWŪ 河鳥
2:110

WASSERAMSELN (Familie) → CINCLIDAE

WASSERFASAN
Hydrophasianus chirurgus (Scopoli)

SHUÍZHÌ 水雉
1:122

WASSERHAHN
Gallicrex cinerea (Gmelin)

DŌNGJĪ 董鷄
1:118; 3:64

WASSERLÄUFER → DUNKLER WASSERLÄUFER

WASSERPIEPER
Anthus spinolella (Linnaeus)

SHUÍ LIŪ 水鶲
2:30; 3:113

WASSERRALLE
Rallus aquaticus Linnaeus

YĀNGJĪ 梯鷄, auch PŪTÖNG YĀNGJĪ
普通梯鷄
1:113; 3:62

WASSERRÖTEL
Rhyacornis fuliginosus (Vigors)

HÓNGWĒI SHUÍQÚ 红尾水鸲. - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): DIĀNSHUIQUÈ 点水雀;
SHÍYÀN'R 石燕儿
(2:140); 3:153

WASSERTRETER (1) (Sammelbezeichnung)
→ ODINSHÜHNCHEN, THORSHÜHNCHEN

BÀNPŪYÙ 辩蹼鶲
(1:145)

WASSERTRETER (2) (Familie) → PHALAROPODIDAE

BÀNPŪYÙ KĒ 辩蹼鶲科
1:145

WATVÖGEL (Ordnung) → CHARADRIIFORMES

WEBER (Sammelbezeichnung)
→ BAJA-, MANYARWEBER

WEBERVÖGEL (Familie) → PLOCEIDAE

WEIDENAMMER
Emberiza aureola Pallas

WEIDENMEISE
Parus montanus Conrad

WEIDENSPERLING
Passer hispaniolensis (Temminck)

WEIH (Sammelbezeichnung; Gattung AVICEDA)
→ DREIFARBEN-, HINDUWEIH

WEIHE (Sammelbezeichnung)
→ ELSTER-, KORN-, ROHR-, STEPPEN-, WIESENWEIHE

WEISSAUGENTEESA
Butastur teesa (Franklin)

WEISSBARTSEESCHWALBE
Chlidonias hybrida (Pallas)

WEISSBAUCH-SCHWARZSPECHT
Dryocopus javensis (Horsfield)

WEISSBAUCH-SEEADLER
Haliaeetus leucogaster (Gmelin)

ZHĪBUNIÃO 织布鸟
(2:384)

HUÁNGXIÖNG WŪ 黄胸鹀
2:432; 3:232

HĒTÓU SHĀNQUÈ 猫头山雀
2:341

HĒIXIÖNG MÁQUÈ 黑头麻雀
2:374

JUĀNSŪN 鹊隼. Dies ist zugleich der spezifische Name für den → HINDUWEIH, *Aviceda jerdoni* (Blyth). Der → BRAHMENWEIH, *Haliastur indus* (Boddaert), chinesisch LÍ-YUĀN 栗鹀, ist nach chinesischem Sprachgebrauch ein "Milan" (LÍ-YUĀN = "Kastanien(farbiger) Milan") (1:41)

YÀO 鸥. Die → SCHLANGENWEIHE, *Spilornis cheela* Latham, chinesisch SHÉDIĀO 蛇鷺, gehört nach chinesischem Sprachgebrauch zu den "Adlern" (DIĀO 鸢) (1:60)

BÁIYĀN KUÁNGYÍNG 白眼鹭鷺
1:51

XŪ FÚÔU 须浮鸥
1:152

BÁIFÙ HĒIZHUÓMÙNIÃO 白腹黑啄木鸟
1:229

BÁIFÙ HÁIDIĀO 白腹海鵰
1:57

WEISSBAUCHTÖLPEL → BRAUNTÖLPEL		WEISSHALSAMSEL	BÁIJÍNG DÖNG 白颈鵟
WEISSBAUCH-ZWERGGANS	MIÁNFÚ 棉凫	Turdus albocinctus Royle	2:160
Nettapus coromandelianus (Gmelin)	1:37	WEISSHAUBENHÄHERLING	BÁIGUĀN ZÀOMÉI 白冠噪鹛
WEISSBRAUENALCIPPE	BÁIMÉI QUÈMÉI 白眉雀鹛	Garrulax leucolophus (Hardwicke)	2:203
Alcippe vinipectus (Hodgson)	2:238	WEISSKAPPEN-ROTSCHWANZ → RIESEN-ROTSCHWANZ	
WEISSBRAUEN-BLAUSCHWANZ	BÁIMÉI LÍN QÚ 白眉林鵙	WEISSKEHL-DSCHUNGELSCHNÄPPER	BÁIHÓU LÍNWĒNG 白喉林鵙
Tarsiger indicus (Vieillot)	2:132	Rhinomyias brunneata (Slater)	2:306
WEISSBRAUEN-FAHLDROSSEL	BÁIFÙ DÖNG 白腹鵟. Dieser Name	WEISSKEHL-FÄCHERSCHWANZ	BÁIHÓU SHÀNWIĒWĒNG 白喉扇尾鹟
Turdus obscurus Gmelin	gilt auch für die → FAHLDROSSEL,	Rhipidura albicollis (Vieillot)	2:330
	Turdus pallidus Gmelin und die	WEISSKEHLHÄHERLING	BÁIHÓU ZÀOMÉI 白喉噪鹛
	→ ROTKROPFDROSSEL, Turdus chrysolaus Temminck	Garrulax albogularis (Gould)	2:201; 3:173
	(2:163; 3:162)	WEISSKOPFSCHMÄTZER	BÁIDÍNG XÌQÚ 白顶溪鸲
WEISSBRAUEN-FÄCHERSCHWANZ	BÁIMÉI SHÀNWIĒWĒNG 白眉扇尾鹟	Chaimarrornis leucocephalus (Vigors)	2:139; 3:153
Rhipidura aureola Lesson	2:330	WEISSKOPFTIMALIE	BÁITÓUJUÉMÉI 白头鳩鹛
WEISSBRAUEN-MAUSSPECHT	ZÖNGZHUÓMÙNIÀO 棕啄木鸟	Gampsorhynchus rufulus Blyth	2:226
Sasia ochracea Hodgson	1:223	WEISSNACKENKRANICH	BÁIZHĒN HÈ 白枕鹤
WEISSBRAUEN-MEISE	BÁIMÉI SHĀNQUÈ 白眉山雀	Grus vipio Pallas	1:111
Parus superciliosus (Przevalski)	2:343	WEISSOHRHÄHERLING	HĒIHÓU ZÀOMÉI 黑喉噪鹛
WEISSBRUST-KIELRALLE	KÜÈNIÀO 苦恶鸟, auch BÁIXIÖNG KÜÈ-NIÀO 白胸苦恶鸟	Garrulax chinensis (Scopoli)	2:204
Amaurornis phoenicurus (Pennant)	1:117; (3:64)	WEISSOHTIMALIE	BÁIĚR QÍMÉI 白耳奇鹛
WEISSFLÜGELGIMPEL (SCHWARZZÜGEL-GIMPEL)	JÙZUǐ SHĀQUÈ 巨嘴沙雀	Heterophasia auricularis (Swinhoe)	2:249
Rhodospiza obsoleta (Lichtenstein)	(2:399)	WEISSRÜCKENSPECHT	BÁIBÈI ZHUÓMÙNIÀO 白背啄木鸟
WEISSFLÜGELSEESCHWALBE	BÁICHÌ FÚOU 白翅浮鸥	Dendrocopos leucotos (Bechstein)	1:233; 3:103
Chlidonias leucopterus (Temminck)	1:152; 3:76	WEISSSCHEITEL-SCHERENSCHWANZ	HĒIBÈI YĀNWEI 黑背燕尾. - Volks-tümliche Bezeichnung (in S-Shensi):
WEISSFLÜGELSPECHT	BÁICHÌ ZHUÓMÙNIÀO 白翅啄木鸟	Enicurus leschenaulti (Vieillot)	SHUÍYĀQUÈ 水鷗雀
Dendrocopos leucopterus (Salvadori)	1:232	WEISSSCHWANZ-GLANZFASAN	2:144; 3:156
WEISSFUSS-BUSCHSÄNGER	DÀNJIÀO SHÙYÍNG 淡脚树莺	Lophophorus sclateri Jerdon	BÁIWĒISHĀO HÓNGZHÌ 白尾梢虹雉
Cettia pallidipes (Blanford)	2:253	WEISSSCHWANZHÄHER	1:94
WEISSGESICHT-STURMTAUCHER	BÁIÉ HUÒ 白额鹱	Podoces biddulphi Hume	BÁIWĒI DIYĀ 白尾地鸫
Calonectris leucomelas (Temminck)	(1:5)		2:100

WEISSSCHWANZKLEIBER <i>Sitta himalayensis</i> Jardine et Selby	BÁIWĒI SHĪ 白尾鶲 2:352	WERMUTREGENPFEIFER <i>Eupoda asiatica</i> (Pallas)	HÓNGXIÖNG HÉNG 红胸鶲。 - Dieser Name bezeichnet auch den → HUF-EISEN-REGENPFEIFER, <i>Eupoda veredus</i> (Gould) (1:130)
WEISSCHWANZ-LAUBSÄNGER <i>Phylloscopus davisoni</i> (Oates)	BÁIBĀNWĒI LIÜYÍNG 白斑尾柳莺 2:288	WESPENBUSSARD <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus)	FĒNGYÍNG 蜂鷹 1:42
WEISSCHWANZ-TROPIKVOGEL <i>Phaethon lepturus</i> Daudin	BÁIWĒI MÉNG 白尾鶲 1:8	WIEDEHOPF <i>Upupa epops</i> Linnaeus	DÀISHÈNG 戴胜。 - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): CHÒU PÓNÍANG 好婆娘; HUĀ GŪNIĀNG 花姑娘; HŪBŌBŌ 呼噜噜; RÈ-HÔNGHÔNG 热烘烘; SHĀN HÉSHĀNG 山和尚 1:217; 3:100
WEISSSTORCH <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus)	BÁI GUĀN 白鶲 1:22	WIEDEHOPFE (Familie) → UPUPIDAE	SĀNDÀOMÉI CĀO WŪ 三道眉草鷗。 - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): SHĀN DÀIZI 山带子 2:438; 3:235
WEISSWANGENHÄHERLING <i>Garrulax sannio</i> Swinhoe	BÁIJIÁ ZÀOMÉI 白颊噪鹛 2:213; 3:177	WIESENAMMER <i>Emberiza cioides</i> Brandt	WŪHUI YÀO 乌灰鵠 1:61
WEISSWANGENKLEIBER <i>Sitta leucopsis</i> Gould	BÁILÌAN SHĪ 白脸鶲 2:350	WIESENWEIHE <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus)	DÀIJÚ 戴菊 2:289; 3:196
WELLENBRUST-FISCHUHU <i>Ketupa zeylonensis</i> (Gmelin)	HÈ YÚXIĀO 褐鱼鸮。 - Dieser Name gilt auch für den → RIESEN-FISCHUHU, <i>Ketupa blakistoni</i> (Seeböhm) (1:190)	WILDGANS → GANS (1)	BÓLÁO 伯劳 (2:65)
WELLENHÄHERLING <i>Garrulax lunulatus</i> (Verreaux)	BĀNBÈI ZÀOMÉI 斑背噪鹛 2:208; 3:176	WINTERGOLDHÄHNCHEN <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus)	WÜRGERTIMALIE (Sammelbezeichnung) → ROTBAUCH-, ROTSTIRN-, SCHWARZ-KAPPEN-, ZIMTKEHL-WÜRGERTIMALIE. Zur Gattung PTERUTHIUS gehört auch die → VIREOTIMALIE JUÉMÉI 贝鸟鷗 (2:223)
WELLENLÄUFER (1) <i>Oceanodroma leucorhoa</i> (Vieillot)	BÁIYÀO CHĀWÉIHÀIYÀN 白腰叉尾海燕 1:7	WÜRGER (2) (Familie) → LANIIDAE	
WELLENLÄUFER (2) (Sammelbezeichnung) → SWINHOEWELLENLÄUFER und WELLENLÄUFER (1)	CHĀWÉIHÀIYÀN 叉尾海燕 (1:7)		
WELLENREIHER <i>Gorsachius melanophous</i> (Raffles)	HĒIGUĀN HŪBĀNYÁN 黑冠虎斑鷗 1:19		
WENDEHALS <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus	YÍLÌE 蚁䴕。 - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): SHÉPÍ-NIÃO 蛇皮鸟, WĀIBÓ 歪脖 1:221; 3:101		

WÜRGFALKE → SAKERFALKE

WÜSTENFALKE

Falco pelegrinoides Temminck
→ YÓU SŪN

WÜSTENGRASMÜCKE

Sylvia nana (Hemprich et Ehrenberg)

WÜSTENREGENPFEIFER

Charadrius leschenaultii Lesson

WÜSTENSTEINSCHMÄTZER

Oenanthe deserti (Temminck)

YÓU SŪN 游隼. - Der chinesische Name gilt auch für den → WANDERFALKEN, Falco peregrinus Tunstall (1:67)

MÒ YÍNG 漠莺
2:273TIĚZUÍ SHĀ HÉNG 铁嘴沙鸻
1:130; 3:70MÒ JÍ 漠鶲
2:150

YUHINA

Die Gattung YUHINA Hodgson

YUHINA (Sammelbezeichnung, für einige zur Gattung YUHINA gehörende Timaliens)

→ BRAUNKOPF-, DIADEM-, KEHLSTREIFEN-, MEISEN-, ROSTSTEISSYUHINA; ferner → GELBNACKENTIMALIE, GRÜN-RÜCKENTIMALIE, ROTOHRTIMALIE

YUNGIPICUS

Die Gattung YUNGIPICUS Bonaparte

FÈNGMÉI SHŪ 凤鹛属

2:232

FÈNGMÉI 凤鹛
(2:232)→ ZHUÓMÙ SHŪ 啄木属
(1:230)

Z

X

XENUS

Die Gattung XENUS Kaup

QIÁOZUÍYÙ SHŪ 翘嘴鹛属
(1:136)

XIPHIRHYNCHUS

Die Gattung XIPHIRHYNCHUS Blyth

JIÀNZUÍMÉI SHŪ 剑嘴鹛属
2:175

Y

YANGTSE-PAPAGEIMEISE → YANGTSE-PAPAGEISCHNABEL

YANGTSE-PAPAGEISCHNABEL (YANGTSE-PAPAGEIMEISE)

Paradoxornis heudei David

ZHÈNDÀN YĀQUÈ 震旦鸦雀
2:197

YÜNNANKLEIBER

Sitta yunnanensis Ogilvie-Grant

YÜNNANSIBIA

Actinodura waldeni Godwin-Austen

DIĀN SHĪ 滇䴓
2:352WÉNTÓU BĀNCHÌMÉI 纹头斑翅鹛
(2:227)

ZAPPEY-PAPAGEIMEISE → ZAPPEY-PAPAGEISCHNABEL

ZAPPEY-PAPAGEISCHNABEL (ZAPPEY-PAPAGEIMEISE)

Paradoxornis zappeyi (Thayer et Bangs)

ZAUNKÖNIG

Troglodytes troglodytes (Linnaeus)

ZAUNKÖNIGE (Familie) → TROGLODYTIDAE

ZEISIG (ERLENZEISIG)

Spinus spinus (Linnaeus)

ZIEGENMELKER (1)

Caprimulgus europaeus Linnaeus

ZIEGENMELKER (2) (Familie) → CAPRIMULGIDAE

ZIEGENMELKER (3) (Sammelbezeichnung, s. auch → NACHTSCHWALBE)

ÀNSÈ YĀQUÈ 暗色鸦雀

2:192

JIĀOLIÀO 鸫鹛

2:112; 3:142

HUÁNGQUÈ 黄雀

(2:392)

ŌU YÈYÍNG 欧夜鹰

1:202

YÈYÍNG 夜鹰. - Dies ist zugleich der spezifische Name für die → JOTAKANACHTSCHWALBE, Caprimulgus indicus Latham
(1:201)

ZILPZALP	ZÖNG LIÜYÍNG 棕柳莺
<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot)	2:274
ZIMTDOMMEL	LÌ WĚIYÁN 栗苇鳽。 - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi):
<i>Ixbrychus cinnamomeus</i> (Gmelin)	SHUÍ LUÒTUǑ 水骆驼 1:20; 3:36
ZIMTKEHLSCHNÄPPER	CHÉNGXIÔNG WĒNG 橙胸鵑
<i>Siphia strophiata</i> Hodgson	(2:310; 3:200)
ZIMTKEHL-WÜRGERTIMALIE	LÌHÓU JUÉMÉI 栗喉鳽鵑
<i>Pteruthius melanotis</i> Hodgson	2:225
ZIMTKLEIBER	LÌFÙ SHĪ 栗腹鳽
<i>Sitta castanea</i> Lesson	2:354
ZIMTSUMPFHUHN	HÓNGXIÔNG TIÁNJĪ 红胸田鸡。 -
<i>Porzana fusca</i> (Linnaeus)	Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): TIÁNJIZĪ 田鸡子 1:116; 3:63
ZIPPAMMER	HUİMÉI YÁN WŪ 灰眉岩鳽。 - Dieser Name gilt auch für die → FELSENAMMER, <i>Emberiza godlewskii</i> Taczanovski. - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): HUİMÉIZĪ 灰眉子 (2:436; 3:234)
ZITRONENSTELZE	HUÁNGTÓU JÍLÍNG 黄头鹡鸰
<i>Motacilla citreola</i> Pallas	2:37; 3:117
ZOOTHERA	SHĀNDÔNG SHŪ 山鳽属
Die Gattung ZOOTHERA Vigors	2:166
ZOSTEROPIDAE	XIÙYÀNNIÃO KĒ 绣眼鸟科
Die Familie ZOSTEROPIDAE (Brillenvögel)	2:371; 3:219
ZOSTEROPS	XIÙYÀNNIÃO SHŪ 绣眼鸟属
Die Gattung ZOSTEROPS Vigors et Horsfield	2:371

ZÜGELROTSCHWANZ → SPROSSERROT-SCHWANZ	
ZÜGELSEESCHWALBE	HÈCHÍ YÀN'ŌU 褐翅燕鸥
<i>Sterna anaethetus</i> Scopoli	1:155
ZWEIFARBEN-SUMPFHUHN	ZÖNGBÈI TIÁNJĪ 棕背田鸡
<i>Porzana bicolor</i> Walden	1:117
ZWERGADLER	XIĀO DIĀO 小鵟
<i>Hieraetus pennatus</i> (Gmelin)	(1:56)
ZWERGAMMER	XIĀO WŪ 小鳽
<i>Emberiza pusilla</i> Pallas	2:441; 3:237
ZWERGBLÄSSGANS	XIĀO BÁIÉ YÀN 小白额雁
<i>Anser erythropus</i> (Linnaeus)	1:27
ZWERGBRACHVOGEL	XIĀO SHÁOYŪ 小杓鹬
<i>Numenius minutus</i> Gould	1:131
ZWERGDOMMEL	XIĀO WĚIYÁN 小苇鳽
<i>Ixbrychus minutus</i> (Linnaeus)	1:19
ZWERGKURZFLÜGEL	BÁICHÌ DUĀNCHÌDÔNG 白翅短翅鸲
<i>Brachypteryx leucophrys</i> (Temminck)	2:121
ZWERGLACHTAUBE	HUōBĀNJIŪ 火斑鳩
<i>Streptopelia tranquebarica</i> (Hermann)	(1:172; 3:83)
ZWERGMÖWE	XIĀO ŌU 小鸥
<i>Larus minutus</i> Pallas	1:150
ZWERGOHREULE	XINJIĀNG JIĀOXIĀO 新疆角鸮
<i>Otus scops</i> (Linnaeus)	1:185
ZWERGSÄGER	BĀNTÓU QIŪSHĀYĀ 斑头秋沙鸭
<i>Mergellus albellus</i> (Linnaeus)	(1:39; 3:44)
ZWERGSCHNÄPPER	HÓNGHÓU WĒNG 红喉鹟, auch HUÁNG-DIĀNKĒ 黄点颏. Letztere Bezeichnung ist auch der volkstümliche Name für den → ZWERGSCHNÄPPER in S-Shensi.
<i>Ficedula parva</i> (Bechstein)	2:309; 3:200

ZWERGSCHNEFFE
Lymnocryptes minimus (Brünnich)

JÍYÚ 姫鶲

1:140

ZWERGSCHWAN
Cygnus bewickii Yarrell

DUĀNZUĪ TIĀNÉ 短嘴天鹅

1:29

ZWERGSEESCHWALBE
Sterna albifrons Pallas

BÁIÉ YÀN'ŌU 白额燕鸥

1:156; 3:77

ZWERGSUMPFHUHN
Porzana pusilla (Pallas)

XIĀO TIÁNJÍ 小田鸡 . - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi):
TIÁNJÍZI 田鸡子

1:115; 3:63

ZWERGTAUCHER
Tachybaptus ruficollis (Pallas)

XIĀO PÌTÍ 小鴟鷀 , gelegentlich auch einfach → PÌTÍ 鸳鸯 oder SHUÍ HÚLŪ 水葫芦 . - Volkstümliche Bezeichnung (in S-Shensi): SHUÍ HÚLŪ 水葫芦 ; YÀO HÚLŪ 药葫芦
(1:2; 3:29)

ZWERGTIMALIE → MEISENYUHINA

ZWERGTRAPPE
Tetrao tetrix (Linnaeus)

XIĀO BÀO 小鸨

1:121

ZWERGWACHTEL
Coturnix chinensis (Linnaeus)

LÁNXIÓNG CHÚN 蓝胸鹑

1:87

SYSTEMATISCHE ÜBERSICHT ÜBER DIE VÖGEL CHINAS

Die systematische Übersicht verdanke ich der Mitarbeit von Herrn Dr. H.E. Wolters, wobei die Reihenfolge der Ordnungen sich bis auf kleine Korrekturen an die Liste von Cheng Tso-hsin hält, während die Familien und Gattungen, soweit tunlich, der Systematik in der im Erscheinen begriffenen Artenliste der Vögel der Welt von H.E. Wolters angeglichen worden sind. In den wenigen Fällen, in denen die Abgrenzung der Familien und Gattungen von derjenigen bei Cheng abweicht, sind für diese Familien und Gattungen gegenwärtig keine chinesischen Namen vorhanden. Sie fehlen deshalb im alphabetischen Verzeichnis. Die Liste lässt die Rassen der einzelnen Arten unberücksichtigt; für diese sind ohnehin im allgemeinen weder chinesische noch deutsche Namen, sondern nur wissenschaftliche Namen vorhanden.

I. Gaviiformes (Seetaucher)

1. Gaviidae (Seetaucher)

(1) *Gavia* J.R. Forster

Gavia stellata (Pontoppidan) - Sterntaucher

Gavia arctica (Linnaeus) - Prachttaucher

Gavia adamsii (G.R. Gray) - Gelbschnabel-Eistaucher (Tundra-taucher)

II. Podicipediformes (Lappentaucher oder Steissfüsse)

2. Podicipedidae (Lappentaucher oder Steissfüsse)

(2) *Podiceps* Latham

Podiceps grisegena (Boddaert) - Rothalstaucher

Podiceps cristatus (Linnaeus) - Haubentaucher

Podiceps auritus (Linnaeus) - Ohrentaucher

Podiceps nigricollis C.L. Brehm - Schwarzhalsstaucher

(3) *Tachybaptus* Reichenbach

Tachybaptus ruficollis (Pallas) - Zergtaucher

III. Procellariiformes (Röhrennasen)

3. Diomedaeidae (Albatrosse)

(4) *Diomedea* Linnaeus

Diomedea albaturus Pallas - Kurzschwanalbatros

Diomedea nigripes Audubon - Schwarzfussalbatros

4. Procellariidae (Sturmvögel)

(5) *Fulmarus* Stephens

Fulmarus glacialis (Linnaeus) - Eissturmvogel

- (16) *Casmerodius* Gloger
Casmerodius albus (Linnaeus) - Silberreiher
Casmerodius intermedius (Wagler) - Mittelreiher

(17) *Egretta* T. Forster
Egretta eulophotes (Swinhoe) - Schneereiher
Egretta garzetta (Linnaeus) - Seidenreiher
Egretta sacra (Gmelin) - Riffreiher

(18) *Ardea* Linnaeus
Ardea cinerea Linnaeus - Fischreiher (Graureiher)
Ardea purpurea Linnaeus - Purpureiher

(19) *Butorides* Blyth
Butorides striatus (Linnaeus) - Mangrovereiher

(20) *Ardeola* Boie
Ardeola bacchus (Bonaparte) - Bacchusreiher

(21) *Bubulcus* Bonaparte
Bubulcus ibis (Linnaeus) - Kuhreiher

(22) *Nycticorax* T. Forster
Nycticorax nycticorax (Linnaeus) - Nachtreiher

(23) *Oroanassa* Peters
Oroanassa magnifica (Ogilvie-Grant) - Hainanreiher

(24) *Gorsachius* Bonaparte
Gorsachius melanolophus (Raffles) - Wellenreiher
Gorsachius goisagi (Temminck) - Rotscheitelreiher

(25) *Ixobrychus* Billberg
Ixobrychus flavicollis (Latham) - Schwarzdommel
Ixobrychus cinnamomeus (Gmelin) - Zimtdommel
Ixobrychus eurhythmus (Swinhoe) - Mandschuren-dommel
Ixobrychus sinensis (Gmelin) - Chinesendommel
Ixobrychus minutus (Linnaeus) - Zwergdommel

(26) *Botaurus* Stephens
Botaurus stellaris (Linnaeus) - Rohrdommel

12. *Ciconiidae* (Störche)

(27) *Leptoptilos* Lesson
Leptoptilos javanicus (Horsfield) - Malaienstorch (Adjutant)

(28) *Ciconia* Brisson
Ciconia ciconia (Linnaeus) - Weissstorch
Ciconia nigra (Linnaeus) - Schwarzstorch

(29) *Ibis* Lacépède
Ibis leucocephalus (Pennant) - Brustband-Nimmersatt

13. *Threskiornithidae* (Ibisse)

(30) *Platalea* Linnaeus
Platalea leucorodia Linnaeus - Löffler

- Platalea minor* Temminck et Schlegel - Schwarzstirnlöffler
 (31) *Plegadis* Kaup
Plegadis falcinellus (Linnaeus) - Braunsichler
 (32) *Pseudibis* Hodgson
Pseudibis papillosa (Temminck) - Warzenibis
 (33) *Nipponia* Reichenbach
Nipponia nippon (Temminck) - Nipponibis
 (34) *Threskiornis* G.R. Gray
Threskiornis melanocephalus (Latham) - Schwarzhalsibis

VI. Anseriformes (Entenvögel)

14. *Anatidae* (Entenartige)
 (35) *Dendrocygna* Swainson
Dendrocygna javanica (Horsfield) - Javapfeifgans
 (36) *Cygnus* Bechstein¹
Cygnus cygnus (Linnaeus) - Singschwan
Cygnus bewickii Yarrell - Zwergschwan
Cygnus olor (Gmelin) - Höckerschwan
 (37) *Anser* Brisson²
Anser caerulescens (Linnaeus) - Schneegans
Anser indicus (Latham) - Streifengans
Anser cygnoides (Linnaeus) - Schwanengans
Anser fabalis (Latham) - Saatgans
Anser albifrons (Scopoli) - Blässgans
Anser erythropus (Linnaeus) - Zwergblässgans
Anser anser (Linnaeus) - Graugans
 (38) *Branta* Scopoli
Branta bernicla (Linnaeus) - Ringelgans
 (39) *Alopochen* Stejneger
Alopochen aegyptiacus (Linnaeus) - Nilgans
 (40) *Casarca* Bonaparte
Casarca ferruginea (Pallas) - Rostgans
 (41) *Tadorna* Oken
Tadorna tadorna (Linnaeus) - Brandgans
 (42) *Sarkidiornis* Eyton
Sarkidiornis melanotos (Pennant) - Glanzente (Glanzgans)
 (43) *Nettapus* Brandt
Nettapus coromandelianus (Gmelin) - Weissbauch-Zwerggans
 (44) *Dendronessa* Swainson
Dendronessa galericulata (Linnaeus) - Mandarinente
 (45) *Anas* Linnaeus³
Anas penelope Linnaeus - Pfeifente
Anas falcata Georgi - Sichelente
Anas strepera Linnaeus - Schnatterente

- Anas formosa* Georgi - Gluckente
Anas crecca Linnaeus - Krickente
Anas acuta Linnaeus - Spiessente
Anas querquedula Linnaeus - Knäkente
Anas clypeata Linnaeus - Löffelente
Anas poecilorhyncha J.R. Forster - Fleckschnabelente
Anas platyrhynchos Linnaeus - Stockente
 (46) *Netta* Kaup
Netta rufina (Pallas) - Kolbenente

(47) *Aythya* Boie

- Aythya ferina* (Linnaeus) - Tafelente
Aythya nyroca (Güldenstädt) - Moorente
Aythya baeri (Radde) - Baerente
Aythya fuligula (Linnaeus) - Reiherente
Aythya marila (Linnaeus) - Bergente
 (48) *Polysticta* Eyton
Polysticta stelleri (Pallas) - Scheckente
 (49) *Histrionicus* Lesson
Histrionicus histrionicus (Linnaeus) - Kragenente
 (50) *Clangula* Leach
Clangula hyemalis (Linnaeus) - Eisente
 (51) *Melanitta* Boie
Melanitta nigra (Linnaeus) - Trauerente
Melanitta deglandi (Bonaparte) - Höckerschnabelente
 (52) *Glaucionetta* Stejneger
Glaucionetta clangula (Linnaeus) - Schellente
 (53) *Mergellus* Selby
Mergellus albellus (Linnaeus) - Zwergsäger
 (54) *Mergus* Linnaeus
Mergus serrator Linnaeus - Mittelsäger
Mergus squamatus Gould - Schuppensäger
Mergus merganser Linnaeus - Gänsehäher

VII. Falconiformes (Greifvögel)

15. *Accipitridae* (Greife)
 (55) *Sarcogyps* Lesson
Sarcogyps calvus (Scopoli) - Kahlkopfgeier
 (56) *Aegypius* Savigny
Aegypius monachus (Linnaeus) - Mönchsgeier (Kuttengeier)
 (57) *Gyps* Savigny
Gyps himalayensis Hume - Himalayageier
Gyps bengalensis (Gmelin) - Bengalengeier

- (58) *Gypaetus* Storr
Gypaetus barbatus (Linnaeus) - Bartgeier (Lämmergeier)
- (59) *Haliaeetus* Savigny
Haliaeetus pelagicus (Pallas) - Riesenseeadler
Haliaeetus albicilla (Linnaeus) - Seeadler
Haliaeetus leucogaster (Gmelin) - Weissbauch-Seeadler
Haliaeetus leucoryphus (Pallas) - Bindenseeadler
- (60) *Haliastur* Selby
Haliastur indus (Boddaert) - Brahminenweihe
- (61) *Ichthyophaga* Lesson
Ichthyophaga humilis (Müller) - Braunschwanz-Seeadler
- (62) *Milvus* Lacépède
Milvus migrans (Boddaert) - Schwarzmilan
- (63) *Elanus* Savigny
Elanus caeruleus (Desfontaines) - Gleitaar
- (64) *Pernis* Cuvier
Pernis apivorus (Linnaeus) - Wespenbussard
- (65) *Aviceda* Swainson
Aviceda leuphotes (Dumont) - Dreifarbenweihe
Aviceda jerdoni (Blyth) - Hinduweihe
- (66) *Accipiter* Brisson
Accipiter trivirgatus (Temminck) - Schopfhabicht
Accipiter gentilis (Linnaeus) - Habicht
Accipiter nisus (Linnaeus) - Sperber
Accipiter virgatus (Temminck) - Trillersperber
Accipiter badius (Gmelin) - Schikra
Accipiter soloensis (Horsfield) - Chinesenschikra
- (67) *Buteo* Lacépède
Buteo rufinus (Cretzschmar) - Adlerbussard
Buteo hemilasius Temminck et Schlegel - Mongolenbussard
Buteo lagopus (Pontoppidan) - Rauhfussbussard
Buteo buteo (Linnaeus) - Mäusebussard
- (68) *Aquila* Brisson
Aquila chrysaetos (Linnaeus) - Steinadler
Aquila heliaca Savigny - Kaiseradler
Aquila nipalensis (Hodgson) - Steppenadler
Aquila clanga Pallas - Schelladler
- (69) *Hieraetus* Kaup⁴
Hieraetus pennatus (Gmelin) - Zwergadler
Hieraetus fasciatus (Vieillot) - Habichtsadler
- (70) *Lophotriorchis* Sharpe

- Lophotriorchis kienerii* (Geoffroy) - Rotbauchadler
- (71) *Nisaetus* Hodgson
Nisaetus nipalensis Hodgson - Bergadler
- (72) *Ictinaetus* Blyth
Ictinaetus malayensis (Temminck) - Malaienadler
- (73) *Butastur* Hodgson
Butastur indicus (Gmelin) - Kiefernteesa
Butastur teesa (Franklin) - Weissaugenteesa
- (74) *Circaetus* Vieillot
Circaetus gallicus (Gmelin) - Schlangenadler
- (75) *Spilornis* G.R. Gray
Spilornis cheela (Latham) - Schlangenweihe
- (76) *Circus* Lacépède
Circus aeruginosus (Linnaeus) - Rohrweihe
Circus pygargus (Linnaeus) - Wiesenweihe
Circus melanoleucus (Pennant) - Elsterweihe
Circus macrourus (Gmelin) - Steppenweihe
Circus cyaneus (Linnaeus) - Kornweihe
16. *Pandionidae* (Fischadler)
(77) *Pandion* Savigny
Pandion haliaetus (Linnaeus) - Fischadler
17. *Falconidae* (Falken)
(78) *Microhierax* Sharpe
Microhierax melanoleucus (Blyth) - Elster-Zwergfalke
- (79) *Falco* Linnaeus
Falco peregrinus Tunstall - Wanderfalke
Falco pelegrinoides Temminck - Wüstenfalke
Falco rusticulus Linnaeus - Gerfalke
Falco cherrug J.E. Gray - Sakerfalke (Würgfalke)
Falco columbarius Linnaeus - Merlin
Falco naumanni Fleischer - Rötelfalke
Falco tinnunculus Linnaeus - Turmfalke
Falco vespertinus Linnaeus - Rotfussfalke
Falco severus Horsfield - Malaienbaumfalke
Falco subbuteo Linnaeus - Baumfalke
- II. Galliformes (Hühnervögel)
18. *Phasianidae* (Fasanenartige)
(80) *Tetrao* Linnaeus
Tetrao parvirostris Bonaparte - Felsenauerhuhn
- (81) *Lyrurus* Swainson
Lyrurus tetrix (Linnaeus) - Birkhuhn

- (82) *Lagopus* Brisson
Lagopus lagopus (Linnaeus) - Moorschneehuhn
- (83) *Falcipennis* Elliot
Falcipennis falcipennis (Hartlaub) - Sichelhuhn
- (84) *Tetrastes* Keyserling et Blasius
Tetrastes bonasia (Linnaeus) - Haselhuhn
Tetrastes sewerzowi Przevalski - Schwarzbrust-Haselhuhn
- (85) *Coturnix* Bonnaterre
Coturnix coturnix (Linnaeus) - Wachtel
Coturnix japonica (Temminck et Schlegel) - Japanwachtel
Coturnix chinensis (Linnaeus) - Zwergwachtel
- (86) *Francolinus* Stephens
Francolinus pintadeanus (Scopoli) - Perlhuhnfrankolin
- (87) *Bambusicola* Gould
Bambusicola fytchii Anderson - Graubrauen-Bambushuhn
Bambusicola thoracica (Temminck) - Gelbbrauen-Bambushuhn
- (88) *Alectoris* Kaup
Alectoris chukar (J.E. Gray) - Chukarhuhn
- (89) *Perdix* Brisson
Perdix perdix (Linnaeus) - Rebhuhn
Perdix dauricae (Pallas) - Bartrebhuhn
Perdix hodgsoniae (Hodgson) - Tibatrebhuhn
- (90) *Arborophila* Hodgson
Arborophila torqueola (Valenciennes) - Hügelhuhn
Arborophila rufogularis (Blyth) - Rotkehl-Buschwachtel
Arborophila crudigularis (Swinhoe) - Formosabuschwachtel
Arborophila brunneopectus (Blyth) - Nacktkehl-Buschwachtel
Arborophila rufipectus Boulton - Boultonbuschwachtel
Arborophila gingica (Gmelin) - Chinabuschwachtel
Arborophila ardens (Styan) - Hainanbuschwachtel
- (91) *Tetraphasis* Elliot
Tetraphasis obscurus (J. Verreaux) - Sikang-Keilschwanzhuhn
Tetraphasis szechenyii Madarász - Szetschwan-Keilschwanzhuhn
- (92) *Tetraogallus* J.E. Gray
Tetraogallus himalayensis G.R. Gray - Himalaya-Königshuhn
Tetraogallus tibetanus Gould - Tibet-Königshuhn
- (93) *Lerwa* Hodgson
Lerwa lerwa (Hodgson) - Haldenhuhn
- (94) *Tragopan* Cuvier
Tragopan melanocephalus (J.E. Gray) - Schwarzkopftragopan
Tragopan satyra (Linnaeus) - Satyrtragopan

- Tragopan temminckii* (J.E. Gray) - Temmincktragopan
Tragopan caboti (Gould) - Braunbauchtragopan
- (95) *Gallus* Brisson
Gallus gallus (Linnaeus) - Bankivahuhn
- (96) *Ithaginis* Wagler
Ithaginis cruentus (Hardwicke) - Blutfasan
- (97) *Pucrasia* G.R. Gray
Pucrasia macrolopha (Lesson) - Koklasfasan
- (98) *Lophophorus* Temminck
Lophophorus impejanus (Latham) - Gelbschwanz-Glanzfasan
Lophophorus sclateri Jerdon - Weisschwanz-Glanzfasan
Lophophorus lhuysii Geoffroy St. Hilaire - Grünschwanz-Glanzfasan
- (99) *Crossoptilon* Hodgson
Crossoptilon crossoptilon (Hodgson) - Schmalschwanz-Ohrfasan
Crossoptilon auritum (Pallas) - Blauer Ohrfasan
Crossoptilon mantchuricum Swinhoe - Brauner Ohrfasan
- (100) *Lophura* Fleming
Lophura leucomelana (Latham) - Schwarzbrustfasan
Lophura nycthemera (Linnaeus) - Silberfasan
Lophura swinhoii (Gould) - Swinhoefasan
- (101) *Syrmaticus* Wagler
Syrmaticus mikado (Ogilvie-Grant) - Mikadofasan
Syrmaticus ellioti (Swinhoe) - Elliotfasan
Syrmaticus humiae (Hume) - Burmafasan
Syrmaticus reevesii (J.E. Gray) - Königsfasan
- (102) *Phasianus* Linnaeus
Phasianus colchicus Linnaeus - Jagdfasan
- (103) *Chrysolophus* J.E. Gray
Chrysolophus pictus (Linnaeus) - Goldfasan
Chrysolophus amherstiae (Leadbeater) - Diamantfasan
- (104) *Polyplectron* Temminck
Polyplectron bicalcaratum (Linnaeus) - Grauer Pfaufasan
- (105) *Pavo* Linnaeus
Pavo muticus Linnaeus - Ährenträgerpfau
- IX. Otidiformes (Trappen)
19. *Otididae* (Trappen)
- (106) *Otis* Linnaeus
Otis tarda Linnaeus - Grosstrappe
- (107) *Chlamydotis* Lesson
Chlamydotis undulata (Jacquin) - Kragentrappe

(108) *Tetrao* T. Forster

Tetrao tetrix (Linnaeus) - Zwergrappe

X. Turniciformes (Laufhühnchen)

20. *Turnicidae* (Wachtellaufhühnchen)

(109) *Turnix* Bonnaterre

Turnix sylvatica (Desfontaines) - Spitzschwanz-Laufhühnchen

Turnix tanki Blyth - Rotnacken-Laufhühnchen

Turnix suscitator (Gmelin) - Bindenlaufhühnchen

XI. Gruiformes (Kranichvögel)

21. *Gruidae* (Kraniche)

(110) *Grus* Pallas

Grus antigone (Linnaeus) - Saruskranich

Grus grus (Linnaeus) - Kranich

Grus nigricollis Przevalski - Schwarzhalskranich

Grus monacha Temminck - Mönchskranich

Grus japonensis (P.L.S. Müller) - Mandschurenkranich

Grus vipio Pallas - Weissnackenkranich

Grus leucogeranus Pallas - Nonnenkranich

(111) *Anthropoides* Vieillot

Anthropoides virgo (Linnaeus) - Jungfernkranich

XII. Ralliformes (Rallen)

22. *Rallidae* (Rallen)

(112) *Coturnicops* G.R. Gray

Coturnicops exquisitus (Swinhoe) - Mandschurenralle

(113) *Rallina* G.R. Gray

Rallina eurizonoides (Lafresnaye) - Hinduralle

Rallina fasciata (Raffles) - Malaienralle

(114) *Crex* Bechstein

Crex crex (Linnaeus) - Wachtelkönig

(115) *Rallus* Linnaeus

Rallus aquaticus Linnaeus - Wasserralle

Rallus striatus Linnaeus - Graubrstralle

(116) *Porzana* Vieillot⁵

Porzana porzana (Linnaeus) - Tüpfelsumpfhuhn

Porzana parva (Scopoli) - Kleines Sumpfhuhn

Porzana pusilla (Pallas) - Zwerghumpfuhnhuhn

Porzana paykullii (Ljungh) - Mandarinsumpfhuhn

Porzana fusca (Linnaeus) - Zimtsumpfhuhn

Porzana bicolor Walden - Zweifarbensumpfhuhn

(117) *Amaurornis* Reichenbach

Amaurornis akool (Sykes) - Braunbauch-Kielralle

Amaurornis phoenicurus (Pennant) - Weissbrust-Kielralle

(118) *Gallicrex* Blyth

Gallicrex cinerea (Gmelin) - Wasserhahn

(119) *Porphyrio* Brisson

Porphyrio porphyrio (Linnaeus) - Purpurhuhn

(120) *Gallinula* Brisson

Gallinula chloropus (Linnaeus) - Teichhuhn

(121) *Fulica* Linnaeus

Fulica atra Linnaeus - Blässhuhn

XIII. Jacaniformes (Blatthühnchenartige)

23. *Jacanidae* (Blatthühnchen)

(122) *Hydrophasianus* Wagler

Hydrophasianus chirurgus (Scopoli) - Wasserfasan

24. *Rostratulidae* (Goldschnepfen)

(123) *Rostratula* Vieillot

Rostratula benghalensis (Linnaeus) - Goldschnepfe

XIV. Charadriiformes (Watvögel)

25. *Scolopacidae* (Schnepfen)

(124) *Scolopax* Linnaeus

Scolopax rusticola Linnaeus - Waldschnepfe

(125) *Philomachus* Merrem

Philomachus pugnax (Linnaeus) - Kampfläufer

(126) *Calidris* Merrem⁶

Calidris tenuirostris (Horsfield) - Grosser Knutt

Calidris canutus (Linnaeus) - Knutt

Calidris ferruginea (Pontoppidan) - Sichelstrandläufer

Calidris acuminata (Horsfield) - Spitzschwanz-Strandläufer

Calidris pygmea (Linnaeus) - Löffelstrandläufer

Calidris ruficollis (Pallas) - Rotkehl-Strandläufer

Calidris temminckii (Leisler) - Temminckstrandläufer

Calidris subminuta (Middendorff) - Langzehen-Strandläufer

Calidris alba (Pallas) - Sanderling

Calidris alpina (Linnaeus) - Alpenstrandläufer

(127) *Limicola* Koch

Limicola falcinellus (Pontoppidan) - Sumpfläufer

(128) *Gallinago* Brisson

Gallinago gallinago (Linnaeus) - Bekassine

Gallinago hardwickii (J.E. Gray) - Kreischbekassine

Gallinago megala Swinhoe - Waldbekassine

Gallinago stenura (Bonaparte) - Stiftbekassine (Spiessbekassine)

Gallinago solitaria Hodgson - Bergbekassine

- Gallinago nemoricola* Hodgson - Nepalbekassine
 (129) *Lymnocryptes* Kaup
Lymnocryptes minimus (Brünnich) - Zwergschnepfe
 (130) *Limnodromus* Wied
Limnodromus semipalmatus (Blyth) - Steppenschlammläufer
 (131) *Limosa* Brisson
Limosa limosa (Linnaeus) - Uferschnepfe
Limosa lapponica (Linnaeus) - Pfuhlschnepfe
 (132) *Numenius* Brisson
Numenius arquata (Linnaeus) - Grosser Brachvogel
Numenius madagascariensis (Linnaeus) - Isabellbrachvogel
Numenius phaeopus (Linnaeus) - Regenbrachvogel
Numenius minutus Gould - Zwergbrachvogel
 (133) *Tringa* Linnaeus
Tringa erythropus (Pallas) - Dunkler Wasserläufer
Tringa totanus (Linnaeus) - Rotschenkel
Tringa guttifer (Nordmann) - Kurzfuss-Wasserläufer
Tringa nebularia (Gunnerus) - Grünschenkel
Tringa stagnatilis (Bechstein) - Teichwasserläufer
Tringa glareola Linnaeus - Bruchwasserläufer
Tringa ochropus Linnaeus - Waldwasserläufer
 (134) *Xenus* Kaup
Xenus cinereus (Güldenstädt) - Terekwasserläufer
 (135) *Actitis* Illiger
Actitis hypoleucus Linnaeus - Flussuferläufer
 (136) *Heteroscelus* Baird
Heteroscelus brevipes (Vieillot) - Graubürzel-Wasserläufer
Heteroscelus incanus (Gmelin) - Wanderwasserläufer
 (137) *Arenaria* Brisson
Arenaria interpres (Linnaeus) - Steinwälzer
 26. *Phalaropodidae* (Wassertreter)⁷
 (138) *Phalaropus* Brisson
Phalaropus lobatus (Linnaeus) - Odinstühnchen
Phalaropus fulicarius (Linnaeus) - Thorsthühnchen
 27. *Burhinidae* (Triele)
 (139) *Burhinus* Illiger
Burhinus recurvirostris (Cuvier) - Krabbentriell
 28. *Haematopodidae* (Austernfischer)
 (140) *Haematopus* Linnaeus
Haematopus ostralegus Linnaeus - Austernfischer
 29. *Recurvirostridae* (Stelzenläufer)
- (141) *Himantopus* Brisson
Himantopus himantopus (Linnaeus) - Stelzenläufer
 (142) *Recurvirostra* Linnaeus
Recurvirostra avosetta Linnaeus - Säbelschnäbler⁸
 (143) *Ibidorhyncha* Vigors
Ibidorhyncha struthersii Vigors - Ibisschnabel
 30. *Charadriidae* (Regenpfeifer)⁹
 (144) *Microsarcops* Sharpe
Microsarcops cinereus (Blyth) - Graukopfkiebitz
 (145) *Lobivanellus* G.R. Gray
Lobivanellus indicus (Boddaert) - Rotlappenkiebitz
 (146) *Hoplopterus* Bonaparte
Hoplopterus duvaucelii (Lesson) - Bachkiebitz
 (147) *Vanellus* Brisson
Vanellus vanellus (Linnaeus) - Kiebitz
 (148) *Pluvialis* Brisson
Pluvialis squatarola (Linnaeus) - Kiebitzregenpfeifer
Pluvialis dominica (P.L.S. Müller) - Wanderregenpfeifer
 (Kleiner Goldregenpfeifer)
 (149) *Eudromias* Brehm
Eudromias morinellus (Linnaeus) - Mornellregenpfeifer
 (150) *Eupoda* Brandt
Eupoda asiatica (Pallas) - Wermutregenpfeifer
Eupoda veredus (Gould) - Hufeisenregenpfeifer
 (151) *Charadrius* Linnaeus
Charadrius mongolus Pallas - Mongolenregenpfeifer
Charadrius leschenaultii Lesson - Wüstenregenpfeifer
Charadrius placidus J.E. et G.R. Gray - Langschnabel-Regenpfeifer
Charadrius dubius Scopoli - Flussregenpfeifer
Charadrius alexandrinus Linnaeus - Seereggenpfeifer
 31. *Glareolidae* (Brachschwalbenartige)
 (152) *Glareola* Brisson
Glareola maldivarum J.R. Forster - Rotbrust-Brachschwalbe
XV. Lariformes (Möwenvögel)
 32. *Laridae* (Möwen)
 (153) *Larus* Linnaeus¹⁰
Larus crassirostris Vieillot - Japanmöwe
Larus canus Linnaeus - Sturmmöwe
Larus argentatus Pontoppidan - Silbermöwe
Larus schistisagus Stejneger - Schieferückenmöwe

- Larus glaucescens* Naumann - Beringmöwe
Larus hyperboreus Gunnerus - Eismöwe
Larus ichthyaetus Pallas - Fischmöwe
Larus relictus Lönnberg - Lönnbergmöwe
Larus brunnicephalus Jerdon - Tibetlachmöwe
Larus ridibundus Linnaeus - Lachmöwe
Larus saundersi (Swinhoe) - Kappenmöwe
Larus minutus Pallas - Zwergmöwe
Larus roseus MacGillivray - Rosenmöwe
Larus tridactylus Linnaeus - Dreizehenmöwe
- 33. Sternidae (Seeschwalben)**
- (154) *Rhynchos* Linnaeus
Rhynchos albicollis Swainson - Halsband-Scherenschnabel
- (155) *Chlidonias* Rafinesque
Chlidonias niger (Linnaeus) - Trauerseeschwalbe
Chlidonias leucopterus (Temminck) - Weissflügel-Seeschwalbe
Chlidonias hybrida (Pallas) - Weissbart-Seeschwalbe
- (156) *Gelochelidon* C.L. Brehm
Gelochelidon nilotica (Gmelin) - Lachseeschwalbe
- (157) *Hydroprogne* Kaup
Hydroprogne caspia (Pallas) - Raubseeschwalbe (Riesenseeschwalbe)
- (158) *Thalasseus* Boie
Thalasseus bergii (Lichtenstein) - Eilseeschwalbe
Thalasseus zimmermanni (Reichenow) - Schantung-Seeschwalbe
Thalasseus bengalensis (Lesson) - Rüppellseeschwalbe
- (159) *Sterna* Linnaeus
Sterna sumatrana Raffles - Schwarznacken-Seeschwalbe
Sterna dougallii Montagu - Rosenseeschwalbe
Sterna hirundo Linnaeus - Flusseeschwalbe
Sterna acuticauda J.E. Gray - Schwarzbauch-Seeschwalbe
Sterna anaethetus Scopoli - Zügelseeschwalbe
Sterna albifrons Pallas - Zwergseeschwalbe
Sterna fuscata Linnaeus - Russseeschwalbe
- (160) *Gygis* Wagler
Gygis alba (Sparrmann) - Feenseeschwalbe
- (161) *Anous* Stephens
Anous stolidus (Linnaeus) - Noddi
- XVI. Alciformes (Alken)**
- 34. Alcidae (Alken)**
- (162) *Brachyrhamphus* Brandt

- Brachyrhamphus marmoratus* (Gmelin) - Marmelalk
(163) *Synthliboramphus* Brandt
Synthliboramphus antiquus (Gmelin) - Silberalk
(164) *Cerorhinca* Bonaparte
Cerorhinca monocerata (Pallas) - Nashornalk
- XVII. Pterocliformes (Flughühner)**
35. *Pteroclidae* (Flughühner)
(165) *Syrrhaptes* Illiger
Syrrhaptes paradoxus (Pallas) - Steppenhuhn
Syrrhaptes tibetanus Gould - Tibetflughuhn
(166) *Eremialector* W.L. Sclater¹¹
Eremialector orientalis (Linnaeus) - Sandflughuhn
- XVIII. Columbiformes (Taubenvögel)**
36. *Columbidae* (Tauben)¹²
(167) *Chalcophaps* Gould
Chalcophaps indica (Linnaeus) - Glanzkäfertaube
(168) *Streptopelia* Bonaparte
Streptopelia chinensis (Scopoli) - Perlhalstaube
Streptopelia senegalensis (Linnaeus) - Palmtaube (Senegaltaube)
Streptopelia turtur (Linnaeus) - Turteltaube
Streptopelia orientalis (Latham) - Meenataube
Streptopelia decaocto (Frivaldszky) - Türkentaube
Streptopelia tranquebarica (Hermann) - Zwerglachtaube
(169) *Columba* Linnaeus¹³
Columba leuconota Vigors - Schneetaube
Columba rupestris Pallas - Klippentaube
Columba livia Gmelin - Felsentaube
Columba eversmanni Bonaparte - Gelaugentaube
Columba oenas Linnaeus - Hohltaube
Columba palumbus Linnaeus - Ringeltaube
Columba pulchricollis Blyth - Himalayataube
Columba hodgsonii Vigors - Schwarzschnabel-Oliventaube
Columba punicea Blyth - Kupfertaube
Columba janthina Temminck - Veilchentaube
(170) *Macropygia* Swainson
Macropygia unchall (Wagler) - Bindenschwanztaube
Macropygia phasianella (Temminck) - Maronentaube
- (171) *Ducula* Hodgson
Ducula aenea (Linnaeus) - Bronzefruchttaube
Ducula badia (Raffles) - Fahlbauch-Fruchttaube
(172) *Ptilinopus* Swainson
Ptilinopus leclancheri (Bonaparte) - Schwarzkinn-Fruchttaube

- (173) *Treron Vieillot*
Treron sphenurus (Vigors) - Keilschwanz-Grüntaube
Treron sieboldii (Temminck) - Sieboldtaube
Treron formosae Swinhoe - Formosa-Grüntaube
Treron bicincta (Jerdon) - Bindengrüntaube
Treron curvirostra (Gmelin) - Papageischnabeltaube

XIX. Psittaciformes (Papageien)

37. *Psittacidae* (Papageien)¹⁴

- (174) *Loriculus Blyth*
Loriculus vernalis (Sparrmann) - Frühlingspapageichen
(175) *Psittacula Cuvier*
Psittacula himalayana (Lesson) - Himalayasittich
Psittacula roseata Biswas - Rosenkopfsittich
Psittacula krameri (Scopoli) - Halsbandsittich (Kleiner Alexander-sittich)
Psittacula derbiana (Fraser) - Chinasittich
Psittacula alexandri (Linnaeus) - Bartsittich
Psittacula longicauda (Boddaert) - Langschwanzsittich

XX. Cuculiformes (Kuckucksvögel)

38. *Cuculidae* (Kuckucke)¹⁵

- (176) *Centropus Illiger*
Centropus bengalensis (Gmelin) - Bengalenkuckuck
Centropus sinensis (Stephens) - Heckenkuckuck
(177) *Clamator Kaup*
Clamator jacobinus (Boddaert) - Jakobinerkuckuck
Clamator coromandus (Linnaeus) - Koromandelkuckuck
(178) *Hierococcyx S. Müller*
Hierococcyx fugax (Horsfield) - Fluchtkuckuck
Hierococcyx sparverioides (Vigors) - Sperberkuckuck
Hierococcyx micropterus (Gould) - Kurzflügelkuckuck

- (179) *Surniculus Lesson*

Surniculus lugubris (Horsfield) - Drongokuckuck

- (180) *Cuculus Linnaeus*

Cuculus canorus Linnaeus - Kuckuck
Cuculus saturatus Blyth - Hopfkuckuck
Cuculus poliocephalus Latham - Gackelkuckuck

- (181) *Cacomantis S. Müller*

Cacomantis merulinus (Scopoli) - Braunbauchkuckuck

- (182) *Chrysococcyx Boie*

Chrysococcyx xanthorhynchus (Horsfield) - Amethystkuckuck
Chrysococcyx maculatus (Gmelin) - Prachtkuckuck

- (183) *Eudynamys Vigors et Horsfield*
Eudynamys scolopacea (Linnaeus) - Koël
(184) *Rhopodytes Cabanis et Heine*
Rhopodytes tristis (Lesson) - Kokil

XXI. Strigiformes (Eulen)

39. *Tytonidae* (Schleiereulen)¹⁶

- (185) *Tyto Billberg*
Tyto longimembris (Jerdon) - Erdeule
40. *Strigidae* (Eigentliche Eulen)
(186) *Asio Brisson*
Asio flammeus (Pontoppidan) - Sumpfohreule
Asio otus (Linnaeus) - Waldohreule

- (187) *Strix Linnaeus*

Strix uralensis Pallas - Habichtskauz
Strix nebulosa J.R. Forster - Bartkauz
Strix aluco Linnaeus - Waldkauz
Strix leptogrammica (Temminck) - Malaienkauz

- (188) *Otus Pennant*

Otus spilocephalus (Blyth) - Fuchseule
Otus brucei (Hume) - Streifenoheule
Otus sunia (Hodgson) - Suniaeule
Otus scops (Linnaeus) - Zwergohreule
Otus bakkamoena Pennant - Halsbandeule

- (189) *Bubo Duméril*

Bubo bubo (Linnaeus) - Uhu
Bubo coromandus (Latham) - Koromandeluhu

- (190) *Ketupa Lesson*

Ketupa blakistoni (Seeböhm) - Riesen-Fischuhu
Ketupa zeylonensis (Gmelin) - Wellenbrust-Fischuhu
Ketupa flavipes (Hodgson) - Himalaya-Fischuhu

- (191) *Nyctea Stephens*

Nyctea scandiaca (Linnaeus) - Schneeeule

- (192) *Surnia Duméril*

Surnia ulula (Linnaeus) - Sperbereule

- (193) *Aegolius Kaup*

Aegolius funereus (Linnaeus) - Rauhfusskauz

- (194) *Athene Boie*

Athene noctua (Scopoli) - Steinkauz

Athene brama (Temminck) - Brahmakauz

- (195) *Glaucidium Boie*¹⁷

Glaucidium passerinum (Linnaeus) - Sperlingskauz

- Glaucidium brodiei* (Burton) - Wachtelkauz
Glaucidium castanopterum (Horsfield) - Trillerkauz
(196) *Ninox* Hodgson
Ninox scutulata (Raffles) - Falkenkauz
- XXIII. Caprimulgiformes (Schwalmvögel)**
41. *Caprimulgidae* (Ziegenmelker)
(197) *Eurostopodus* Gould
Eurostopodus macrotis (Vigors) - Luchsnachtschwalbe
(198) *Caprimulgus* Linnaeus
Caprimulgus indicus Latham - Jotakanachtschwalbe
Caprimulgus europaeus Linnaeus - Ziegenmelker
Caprimulgus aegyptius Lichtenstein - Pharaonennachtschwalbe
Caprimulgus macrurus Horsfield - Langschwanz-Nachtschwalbe
Caprimulgus affinis Horsfield - Savannennachtschwalbe
- XXIV. Apodiformes (Seglervögel)**
42. *Apodidae* (Segler)
(199) *Collocalia* G.R. Gray
Collocalia brevirostris (Horsfield) - Himalaya-Salangane
(200) *Hirundapus* Hodgson
Hirundapus caudacutus (Latham) - Stachelschwanzsegler
(201) *Cypsiurus* Lesson
Cypsiurus parvus (Lichtenstein) - Palmensegler
(202) *Apus* Scopoli
Apus apus (Linnaeus) - Mauersegler
Apus pacificus (Latham) - Pazifiksegler
Apus affinis (J.E. Gray) - Haussegler
43. *Hemiprocnidae* (Baumsegler)
(203) *Hemiprocne* Nitzsch
Hemiprocne longipennis (Rafinesque) - Haubensegler
- XXIV. Trogoniformes (Trogone)**
44. *Trogonidae* (Trogone)
(204) *Harpactes* Swainson
Harpactes erythrocephalus (Gould) - Rotkopftrogon
- XXV. Coraciiformes (Rackenvögel)**
45. *Coraciidae* (Racken)
(205) *Coracias* Linnaeus
Coracias garrulus Linnaeus - Blauracke
Coracias benghalensis (Linnaeus) - Hinduracke
(206) *Eurystomus* Vieillot
Eurystomus orientalis Linnaeus - Dollarvogel
46. *Upupidae* (Wiedehopfe)
(207) *Upupa* Linnaeus

- Upupa epops* Linnaeus - Wiedehopf
47. *Bucerotidae* (Nashornvögel)
(208) *Anthracoceros* Reichenbach
Anthracoceros coronatus (Boddaert) - Trauerhornvogel
(209) *Buceros* Linnaeus
Buceros bicornis Linnaeus - Doppelhornvogel
48. *Alcedinidae* (Eisvögel)
(210) *Ceryle* Boie
Ceryle rudis (Linnaeus) - Graufischer
Ceryle lugubris (Temminck) - Trauerfischer
(211) *Halcyon* Swainson
Halcyon coromanda (Latham) - Feuerliest
Halcyon pileata (Boddaert) - Kappenliest
Halcyon smyrnensis (Linnaeus) - Braunliest
Halcyon chloris (Boddaert) - Grünkopfliest
(212) *Alcedo* Linnaeus
Alcedo hercules Laubmann - Herkuleseisvogel
Alcedo atthis (Linnaeus) - Eisvogel
(213) *Ceyx* Lacépède
Ceyx erithacus (Linnaeus) - Dschungelfischer
49. *Meropidae* (Spinte oder Bienenfresser)
(214) *Merops* Linnaeus
Merops viridis Linnaeus - Hinduspint
Merops orientalis Latham - Smaragdspint
Merops philippinus Linnaeus - Blauschwanzspint
Merops apiaster Linnaeus - Bienenfresser
Merops leschenaulti Vieillot - Bengalenspint
(215) *Nyctyornis* Jardine et Selby
Nyctyornis athertoni (Jardine et Selby) - Blaubartspint
- XXVI. Piciformes (Spechtvögel)**
50. *Capitonidae* (Bartvögel)
(216) *Megalaima* G.R. Gray
Megalaima virens (Boddaert) - Blaukopf-Bartvogel
Megalaima faiosticta (Temminck) - Grünohr-Bartvogel
Megalaima franklinii (Blyth) - Goldkehl-Bartvogel
Megalaima oorti (S. Müller) - Schwarzbrauen-Bartvogel
Megalaima asiatica (Latham) - Blauwang-Bartvogel
Megalaima haemacephala (P.L.S. Müller) - Kupferschmied (Rot-scheitel-Bartvogel)
51. *Picidae* (Spechte)
(217) *Sasia* Hodgson
Sasia ochracea Hodgson - Weissbrauen-Mausspecht

- (218) *Vivia Hodgson*
Vivia innominata (Burton) - Tüpfelzwergspecht
- (219) *Blythipicus Bonaparte*
Blythipicus pyrrhotis (Hodgson) - Rotohrspecht
- (220) *Gecinulus Blyth*
Gecinulus grantia (McClelland) - Blasskopfspecht
- (221) *Chrysocolaptes Blyth*
Chrysocolaptes lucidus (Scopoli) - Sultanspecht
- (222) *Dinopium Rafinesque*
Dinopium javanense (Ljung) - Goldmantelspecht
- (223) *Dryocopus Boie*
Dryocopus martius (Linnaeus) - Schwarzspecht
Dryocopus javensis (Horsfield) - Weissbauch-Schwarzspecht
- (224) *Picus Linnaeus*
Picus canus Gmelin - Grauspecht
Picus myrmecophoneus Stresemann - Schuppenbauchspecht
Picus chlorolophus Vieillot - Gelbhaubenspecht
Picus flavinucha Gould - Gelbnackenspecht
- (225) *Yungipicus Bonaparte*
Yungipicus kizuki (Temminck) - Kizukispecht
Yungipicus canicapillus (Blyth) - Grauscheitelspecht
- (226) *Dendrocopos Koch*
Dendrocopos minor (Linnaeus) - Kleinspecht
Dendrocopos atratus (Blyth) - Streifenbrustspecht
Dendrocopos leucotos (Bechstein) - Weissrückenspecht
Dendrocopos leucopterus (Salvadori) - Weissflügelspecht
Dendrocopos major (Linnaeus) - Buntspecht
Dendrocopos catpharius (Blyth) - Rotbrustspecht
Dendrocopos darjellensis (Blyth) - Braunbauchspecht
Dendrocopos hyperythrus (Vigors) - Rostbauchspecht
- (227) *Picoides Lacépède*
Picoides tridactylus (Linnaeus) - Dreizehenspecht
- (228) *Micropternus Blyth*
Micropternus brachyurus (Vieillot) - Rostspecht
52. *Jyngidae* (Wendehälse)
(229) *Jynx Linnaeus*
Jynx torquilla Linnaeus - Wendehals
- XXVII. Passeriformes Singvögel (Sperlingsvögel)
53. *Eurylaimidae* (Breitrachen)
(230) *Serilophus Swainson*
Serilophus lunatus (Gould) - Silberbrust-Breitmaul

- (231) *Psarisomus Swainson*
Psarisomus dalhousiae (Jameson) - Langschwanz-Breitmaul
54. *Pittidae* (Pittas)
(232) *Pitta Vieillot*
Pitta nipalensis (Hodgson) - Blaunackenpitta
Pitta soror Ramsay - Blaurückenpitta
Pitta brachyura (Linnaeus) - Neunfarbenpitta
Pitta sordida (P.L.S. Müller) - Kappenpitta
Pitta oatesi (Hume) - Braunkopfpitta
- (233) *Anthocincla Blyth*
Anthocincla phayrei Blyth - Sichelpitta
55. *Alaudidae* (Lerchen)
(234) *Mirafra Horsfield*
Mirafra javanica Horsfield - Buschlerche
- (235) *Alauda Linnaeus*
Alauda arvensis Linnaeus - Feldlerche
Alauda gulgula Franklin - Kleine Feldlerche
- (236) *Galerida Boie*
Galerida cristata (Linnaeus) - Haubenlerche
- (237) *Eremophila Boie*
Eremophila alpestris (Linnaeus) - Ohrenlerche
- (238) *Melanocorypha Boie*
Melanocorypha bimaculata (Ménétrier) - Bergkalanderlerche
Melanocorypha maxima Blyth - Sumpflerche
Melanocorypha mongolica (Pallas) - Mongolenlerche
- (239) *Calandrella Kaup*
Calandrella brachydactyla (Leisler) - Kurzehenlerche
Calandrella acutirostris Hume - Tibetlerche
Calandrella rufescens (Vieillot) - Stummellerche
Calandrella cheleensis (Swinhoe) - Tschililerche
56. *Prunellidae* (Braunellen)
(240) *Prunella Vieillot*¹⁸
Prunella collaris (Scopoli) - Alpenbraunelle
Prunella himalayana (Blyth) - Himalayabraunelle
Prunella koslowi (Przevalski) - Steppenbraunelle
Prunella rubeculoides (Horsfield et Moore) - Rotkehlbraunelle
Prunella strophiata (Blyth) - Strichelbraunelle
Prunella fulvescens (Severtzov) - Fahlbraunelle
Prunella montanella (Pallas) - Bergbraunelle
Prunella atrogularis (Brandt) - Schwarzkehlbraunelle
Prunella immaculata (Hodgson) - Waldbraunelle

57. *Sylviidae* (Grasmückenartige)(241) *Sylvia Scopoli**Sylvia communis* Latham - Dorngrasmücke*Sylvia nana* (Hemprich et Ehrenberg) - Wüstengrasmücke*Sylvia curruca* (Linnaeus) - Klappergrasmücke*Sylvia minula* Hume - Buschgrasmücke*Sylvia nisoria* (Bechstein) - Sperbergrasmücke(242) *Hippolais Conrad**Hippolais caligata* (Lichtenstein) - Buschspötter(243) *Acrocephalus J.A. und F. Naumann**Acrocephalus arundinaceus* (Linnaeus) - Drosselrohrsänger*Acrocephalus orientalis* (Temminck et Schlegel) - Chinarohrsänger*Acrocephalus stentoreus* (Hemprich et Ehrenberg) - Stentorrohrsänger*Acrocephalus scirpaceus* (Hermann) - Teichrohrsänger*Acrocephalus agricola* (Jerdon) - Feldrohrsänger*Acrocephalus concinens* (Swinhoe) - Strauchrohrsänger*Acrocephalus bistrigiceps* Swinhoe - Brauenrohrsänger (Streifrohrsänger)*Acrocephalus sorghophilus* (Swinhoe) - Hirserohrsänger*Acrocephalus schoenobaenus* (Linnaeus) - Schilfrohrsänger(244) *Locustella Kaup**Locustella certhiola* (Pallas) - Streifenschwirl*Locustella ochotensis* (Middendorff) - Middendorffschwirl*Locustella lanceolata* (Temminck) - Strichelschwirl*Locustella naevia* (Boddaert) - Feldschwirl*Locustella fasciolata* (Gray) - Riesenschwirl(245) *Bradypterus Swainson**Bradypterus thoracicus* (Blyth) - Fleckenbuschsänger*Bradypterus major* (Brooks) - Kaschmirbuschsänger*Bradypterus taczanowskii* (Swinhoe) - Taczanowskibuschsänger*Bradypterus luteoventris* (Hodgson) - Rostbuschsänger(246) *Urosphena Swinhoe**Urosphena squameiceps* (Swinhoe) - Kurzschwanz-Buschsänger(247) *Cettia Bonaparte**Cettia pallidipes* (Blanford) - Weissfuss-Buschsänger*Cettia major* (Horsfield et Moore) - Rhododendronbuschsänger*Cettia brunnifrons* (Hodgson) - Rotkopf-Buschsänger*Cettia diphone* (Kittlitz) - Japanbuschsänger (Uguisu)*Cettia montana* (Horsfield) - Bergbuschsänger*Cettia acanthizoides* (Verreaux) - Bambusbuschsänger*Cettia flavolivacea* (Blyth) - Olivbuschsänger*Cettia cetti* (Temminck) - Seidensänger(248) *Phragmaticola Jerdon**Phragmaticola aedon* (Pallas) - Dickschnabelsänger(249) *Phylloscopus Boie*¹⁹*Phylloscopus schwarzi* (Radde) - Bartlaubsänger*Phylloscopus armandii* (Milne-Edwards) - Davidlaubsänger*Phylloscopus griseolus* Blyth - Pamirlaubsänger*Phylloscopus subaffinis* Ogilvie-Grant - Dornlaubsänger*Phylloscopus affinis* (Tickell) - Himalayalaubsänger*Phylloscopus fuscatus* (Blyth) - Dunkellaubsänger*Phylloscopus collybita* (Vieillot) - Zilpzalp*Phylloscopus borealis* (Blasius) - Wanderlaubsänger (Nordischer Laubsänger)*Phylloscopus tenellipes* Swinhoe - Ussurilaubsänger*Phylloscopus magnirostris* Blyth - Schluchtenlaubsänger*Phylloscopus trochiloides* (Sundevall) - Grünlaubsänger*Phylloscopus inornatus* (Blyth) - Gelbbrauen-Laubsänger*Phylloscopus proregulus* (Pallas) - Goldhähnchen-Laubsänger*Phylloscopus maculipennis* (Blyth) - Graukehl-Laubsänger*Phylloscopus pulcher* Blyth - Golddinden-Laubsänger*Phylloscopus coronatus* (Temminck et Schlegel) - Kronenlaubsänger*Phylloscopus reguloides* (Blyth) - Streifenkopf-Laubsänger*Phylloscopus davisoni* (Oates) - Weisschwanz-Laubsänger*Phylloscopus cantator* (Tickell) - Gelbrust-Laubsänger(250) *Seicercus Swainson**Seicercus burkii* (Burton) - Brillenlaubsänger*Seicercus affinis* (Horsfield et Moore) - Grünkopf-Laubsänger*Seicercus xanthoschistos* (G.R. Gray) - Graukopf-Laubsänger*Seicercus poliogenys* (Blyth) - Grauwangen-Laubsänger*Seicercus albogularis* (Horsfield et Moore) - Rostwangen-Laubsänger*Seicercus castaniceps* (Blyth) - Rotkopf-Laubsänger(251) *Abroscopus Stuart Baker**Abroscopus superciliaris* (Blyth) - Bambuslaubsänger*Abroscopus schisticeps* (G.R. Gray) - Schwarzwangen-Laubsänger(252) *Oligura Hodgson**Oligura castaneocoronata* (Burton) - Rotkopftesia(253) *Tesia Hodgson*

- Tesia cyaniventer* Hodgson - Graubauchtesia
Tesia olivea (Horsfield) - Goldscheiteltesia
(254) *Orthotomus* Horsfield
Orthotomus cucullatus (Temminck) - Bergschneidervogel
Orthotomus sutorius (Pennant) - Langschwanz-Schneidervogel
Orthotomus atrogularis Temminck - Waldschneidervogel
(255) *Prinia* Horsfield
Prinia flaviventris (Delessert) - Gelbbauhprinie
Prinia criniger (Hodgson) - Bergprinie
Prinia polychroa (Temminck) - Malaienprinie
Prinia atrogularis (Horsfield et Moore) - Schwarzkehlprinie
Prinia inornata Sykes - Braunkopfprinie [von manchen Autoren
als Rassengruppe der Rahmbrustprinie, *Prinia subflava*
(Gmelin), angesehen]
Prinia hodgsonii Blyth - Graubrustprinie
Prinia rufescens (Blyth) - Rostprinie
(256) *Cisticola* Kaup
Cisticola juncidis (Rafinesque) - Cistensänger
Cisticola exilis (Vigors et Horsfield) - Goldkopf-Cistensänger
(257) *Graminicola* Jerdon
Graminicola bengalensis Jerdon - Bengalengrassänger
(258) *Megalurus* Horsfield
Megalurus palustris Horsfield - Schilfsteiger
Megalurus pryeri Seeböhm - Riedsänger
(259) *Rhopophilus* Giglioli et Salvadori
Rhopophilus pekinensis (Swinhoe) - Pekingsänger
58. *Regulidae* (Goldhähnchen)
(260) *Regulus* Cuvier²⁰
Regulus regulus (Linnaeus) - Wintergoldhähnchen
Regulus goodfellowi Ogilvie-Grant - Formosagoldhähnchen
59. *Leptopoecilidae* (Buschhähnchen)
(261) *Leptopoecile* Severtzov
Leptopoecile sophiae Severtzov - Purpurhähnchen
(262) *Lophobasileus* Pleske
Lophobasileus elegans (Przevalski) - Schopfhähnchen
60. *Aegithalidae* (Schwanzmeisen)
(263) *Aegithalos* Hermann
Aegithalos caudatus (Linnaeus) - Schwanzmeise
Aegithalos iouschistos (Blyth) - Rostwangen-Schwanzmeise
Aegithalos concinnus (Gould) - Rostkappen-Schwanzmeise
Aegithalos fuliginosus (Verreaux) - Graukopf-Schwanzmeise

61. *Paradoxornithidae* (Papageischnäbel)
(264) *Panurus* Koch
Panurus biarmicus (Linnaeus) - Bartmeise
(265) *Paradoxornis* Gould²¹ (einschl. *Cholornis* Verreaux, Suthora
Hodgson, *Chleuasicus* Blyth und *Neosuthora* Hellmayr)
Paradoxornis falvirostris Gould - Schwarzkehl-Papageischnabel
Paradoxornis heudei David - Yangtse-Papageischnabel
Paradoxornis gularis G.R. Gray - Graukopf-Papageischnabel
Paradoxornis unicolor (Hodgson) - Einfarb-Papageischnabel
Paradoxornis paradoxus (Verreaux) - Dreizehen-Papageischnabel
Paradoxornis nipalensis (Hodgson) - Grauohr-Papageischnabel
Paradoxornis przewalskii (Berezowski et Bianchi) - Przevalska-
Papageischnabel
Paradoxornis fulvifrons (Hodgson) - Gelbstirn-Papageischnabel
Paradoxornis atrosuperciliaris (Godwin-Austen) - Schopfpapa-
geischnabel
Paradoxornis conspicillatus (David) - Brillen-Papageischnabel
Paradoxornis webbianus (Gould) - Braunkopf-Papageischnabel
Paradoxornis zappeyi (Thayer et Bangs) - Zappey-Papageischnabel
Paradoxornis davidianus (Slater) - Kurzschwanz-Papageischnabel
(266) *Conostoma* Hodgson
Conostoma aemodium Hodgson - Krähenmeise
62. *Timaliidae* (Timalien oder Drosselmeisen)
(267) *Chrysomma* Blyth
Chrysomma sinense (Gmelin) - Goldaugentimalie
Chrysomma poecilotis (Verreaux) - Mupinie
(268) *Timalia* Horsfield
Timalia pileata Horsfield - Rotkäppchen-timalie
(269) *Mixornis* Blyth
Mixornis gularis (Horsfield) - Gelbbrust-Baumtimalie
(270) *Stachyris* Blyth
Stachyris ruficeps Blyth - Rotkopf-Baumtimalie
Stachyris chrysaea Blyth - Goldkopf-Baumtimalie
Stachyris nigriceps Blyth - Schwarzkopf-Baumtimalie
Stachyris striolata (Müller) - Fleckenhals-Baumtimalie
(271) *Pnoepyga* Hodgson
Pnoepyga albiventer (Hodgson) - Schuppentimalie
Pnoepyga pusilla Hodgson - Moostimalie
(272) *Spelaeornis* David et Oustalet
Spelaeornis troglodytoides (Verreaux) - Binden-Zaunkönig-
timalie

Spelaeornis formosus (Walden) - Fleckenbrust-Zaunkönigstimalie
Spelaeornis chocolatinus (Godwin-Austen et Walden) - Langschwanz-Zaunkönigstimalie
(273) *Napothena* G.R. Gray
Napothena brevicaudata (Blyth) - Stutzschwanz-Zaunkönigstimalie
Napothena epilepidota (Temminck) - Streifenbrust-Zaunkönigstimalie
(274) *Xiphirhynchus* Blyth
Xiphirhynchus superciliaris (Blyth) - Sichelsäbler
(275) *Pomatorhinus* Horsfield
Pomatorhinus hypoleucus (Blyth) - Langschnabelsäbler
Pomatorhinus erythrogenys Vigors - Rotwangensäbler
Pomatorhinus ruficollis Hodgson - Rothalssäbler
(276) *Trichastoma* Blyth
Trichastoma tickelli (Blyth) - Rostbrust-Maustimalie
(277) *Pellorneum* Swainson
Pellorneum ruficeps Swainson - Streifentimalie
(278) *Babax* David
Babax lanceolatus (Verreaux) - Streifenbabax
Babax waddelli Dresser - Riesenbabax
Babax koslowi (Bianchi) - Koslow-Babax
(279) *Garrulax* Lesson²²
Garrulax sannio Swinhoe - Weisswangenhäherling
Garrulax perspicillatus (Gmelin) - Maskenhäherling
Garrulax maesi (Oustalet) - Lärmhäherling
Garrulax leucolophus (Hardwicke) - Weisshaubenhäherling
Garrulax chinensis (Scopoli) - Weissohrhäherling
Garrulax galbanus Godwin-Austen - Gelbbauenhäherling
Garrulax albogularis (Gould) - Weisskehlhäherling
Garrulax caerulatus (Hodgson) - Grauflankenhäherling
Garrulax moniliger (Hodgson) - Lätzchenhäherling
Garrulax pectoralis (Gould) - Brustbandhäherling
Garrulax merulinus Blyth - Fleckenhäherling
Garrulax canorus (Linnaeus) - Augenbrauenhäherling (Chinesische Spottdrossel)
Garrulax davidi (Swinhoe) - Davidhäherling
Garrulax maximus (Verreaux) - Riesenhäherling
Garrulax lunulatus (Verreaux) - Wellenhäherling
Garrulax cineraceus (Godwin-Austen) - Grauhäherling
Garrulax sukatschewi (Berezowski et Bianchi) - Kansuhäherling

Garrulax lineatus (Vigors) - Borstenhäherling
Garrulax milnei (David) - Rotschwanzhäherling
Garrulax formosus (Verreaux) - Prachthäherling
Garrulax erythrocephalus (Vigors) - Rotkopfhäherling
Garrulax affinis Blyth - Schwarzscheitelhäherling
Garrulax morrisonianus (Ogilvie-Grant) - Morrisonhäherling
Garrulax henrici (Oustalet) - Prinzenhäherling
Garrulax elliotii (Verreaux) - Elliothäherling
Garrulax subunicolor (Blyth) - Goldschwingenhäherling
Garrulax squamatus (Gould) - Blauflügelhäherling
Garrulax ocellatus (Vigors) - Waldhäherling
(280) *Liocichla* Swinhoe
Liocichla phoenicea (Gould) - Karminflügelhäherling
Liocichla omeiensis Riley - Omeihäherling
Liocichla steerii Swinhoe - Formosahäherling
(281) *Leiothrix* Swainson
Leiothrix argentauris (Hodgson) - Silberohr-Sonnenvogel
Leiothrix lutea (Scopoli) - Sonnenvogel (Chinanachtigall)
(282) *Myzornis* Blyth
Myzornis pyrrhura Blyth - Feuerschwanztimalie
(283) *Cutia* Hodgson
Cutia nipalensis Hodgson - Cutia
(284) *Pteruthius* Swainson
Pteruthius rufiventer Blyth - Rotbauch-Würgertimalie
Pteruthius erythropterus (Vigors) - Schwarzkappen-Würgertimalie
Pteruthius xanthochloris G.R. Gray - Vireotimalie
Pteruthius melanotis Hodgson - Zimtkehl-Würgertimalie
Pteruthius aerobarbus (Temminck) - Rotstirn-Würgertimalie
(285) *Gampsorhynchus* Blyth
Gampsorhynchus rufulus Blyth - Weisskopftimalie
(286) *Actinodura* Gould
Actinodura egertonii Gould - Brillensibia
Actinodura waldeni Godwin-Austen - Yunnansibia
Actinodura souliei Oustalet - Tongkingsibia
Actinodura morrisoniana Ogilvie-Grant - Formosasibia
(287) *Minla* Hodgson
Minla ignotincta Hodgson - Rotschwanzsiva
Minla strigula (Hodgson) - Bändersiva
Minla cyanouroptera (Hodgson) - Blauflügelsiva (Blauflügel-Sonnenvogel)

- (288) Alcippe Blyth
Alcippe chrysotis (Blyth) - Gold-Alcippe
Alcippe variegaticeps Yen - Buntkopfalcippe
Alcippe castaneiceps (Hodgson) - Kastanienalcippe
Alcippe vinipectus (Hodgson) - Weissbrauenalcippe
Alcippe striaticollis (Verreaux) - Bergalcippe
Alcippe ruficapilla (Verreaux) - Rotscheitelalcippe
Alcippe cinereiceps (Verreaux) - Braunkopfalcippe
Alcippe brunnea Gould - Rotkopfalcippe
Alcippe poioicephala (Jerdon) - Graukopfalcippe
Alcippe morrisonia Swinhoe - Grauaugenalcippe
- (289) Heterophasia Blyth
Heterophasia annectans (Blyth) - Rotrückentimalie
Heterophasia capistrata (Vigors) - Schwarzkappentimalie
Heterophasia gracilis (Horsfield) - Grautimalie
Heterophasia melanoleuca (Blyth) - Tickelltimalie
Heterophasia auricularis (Swinhoe) - Weissohrtimalie
Heterophasia pulchella (Godwin-Austen) - Blaukopftimalie
- (290) Yuhina Hodgson
Yuhina castaniceps (Moore) - Rotohrtimalie
Yuhina flavicollis Hodgson - Gelbnackentimalie
Yuhina gularis Hodgson - Kehlstreifenyuhina
Yuhina diademata Verreaux - Diademyuhina
Yuhina occipitalis Hodgson - Roststeissyuuhina
Yuhina brunneiceps Ogilvie-Grant - Braunkopfyuhina
Yuhina nigrimenta Blyth - Meisenyuhina (Zwergtimalie)
Yuhina zantholeuca (Blyth) - Grünrückentimalie
63. Paridae (Meisen)
- (291) Sylviparus Burton
Sylviparus modestus Burton - Laubmeise
- (292) Parus Linnaeus
Parus dichrous Blyth - Birkenmeise
Parus cyanus Pallas - Lasurmeise
Parus major Linnaeus - Kohlmeise
Parus monticolus Vigors - Bergkohlmeise
Parus spilonotus Bonaparte - Königsmeise
Parus holsti Seeböhm - Formosameise
Parus venustulus Swinhoe - Schmuckmeise
Parus ater Linnaeus - Tannenmeise
Parus rufonuchalis Blyth - Fichtenmeise
Parus varius Temminck et Schlegel - Buntmeise
- Parus davidi (Berezovski et Bianchi) - Davidmeise
Parus superciliosus (Przevalski) - Weissbrauenmeise
Parus montanus Conrad - Weidenmeise
Parus palustris Linnaeus - Sumpfmeise
- (293) Melanochlora Lesson
Melanochlora sultanea (Hodgson) - Goldschopfmeise
64. Tichodromidae (Mauerläufer)
- (294) Tichodroma Illiger
Tichodroma muraria (Linnaeus) - Mauerläufer
65. Certhiidae (Baumläufer)
- (295) Certhia Linnaeus
Certhia familiaris Linnaeus - Waldbaumläufer
Certhia himalayana Vigors - Himalayabaumläufer
Certhia discolor Blyth - Braunkehl-Baumläufer
66. Troglodytidae (Zaunkönige)
- (296) Troglodytes Vieillot
Troglodytes troglodytes (Linnaeus) - Zaunkönig
67. Cinclidae (Wasseramseln)
- (297) Cinclus Borkhausen
Cinclus cinclus (Linnaeus) - Wasseramsel
Cinclus pallasi Temminck - Bachwasseramsel
68. Muscicapidae (Sänger)²³
- (298) Enicurus Temminck
Enicurus maculatus Vigors - Fleckscherenschwanz
Enicurus leschenaulti (Vieillot) - Weisscheitel-Scherenschwanz
Enicurus schistaceus (Hodgson) - Graurücken-Scherenschwanz
Enicurus scouleri Vigors - Bachstutzschwanz
- (299) Copsychus Wagler
Copsychus saularis (Linnaeus) - Dajal
Copsychus malabaricus (Scopoli) - Schama
- (300) Chaimarrornis Hodgson
Chaimarrornis leucocephalus (Vigors) - Weisskopfschmätzer
- (301) Oenanthe Vieillot
Oenanthe pleschanka (Lepechin) - Nonnensteinschmätzer
Oenanthe deserti (Temminck) - Wüstensteinschmätzer
Oenanthe oenanthe (Linnaeus) - Steinschmätzer
Oenanthe isabellina (Temminck) - Isabellsteinschmätzer
- (302) Muscicapa Brisson²⁴
Muscicapa striata (Pallas) - Grauschnäpper
Muscicapa sibirica Gmelin - Russschnäpper
Muscicapa griseisticta (Swinhoe) - Fleckenschnäpper

- Muscicapa latirostris* Raffles - Braunschnäpper
Muscicapa ferruginea (Hodgson) - Rostschnäpper
Muscicapa muttui (Layard) - Bambusschnäpper
- (303) *Rhinomyias* Sharpe
Rhinomyias olivacea (Hume) - Olivrücken-Dschungelschnäpper
Rhinomyias brunneata (Slater) - Weisskehl-Dschungelschnäpper
- (304) *Ficedula* Brisson
Ficedula parva (Bechstein) - Zwergschnäpper
Ficedula sapphira Blyth - Saphirschnäpper
Ficedula tricolor (Hodgson) - Dreifarbenschnäpper
Ficedula superciliaris (Jerdon) - Brauenschnäpper
Ficedula westermanni (Sharpe) - Elsterschnäpper
Ficedula narcissina (Temminck) - Goldschnäpper
Ficedula zanthopygia (Hay) - Koreagoldschnäpper
Ficedula mugimaki (Temminck) - Mugimakischnäpper (Tannenschnäpper)
Ficedula hodgsonii (Verreaux) - Fichtenschnäpper
Ficedula hyperythra (Blyth) - Rotbrust-Grundschnäpper
- (305) *Sipha* Hodgson
Sipha strophiata Hodgson - Zimtkehlschnäpper
- (306) *Niltava* Hodgson
Niltava vivida (Swinhoe) - Swinhoe-Niltava
Niltava davidi La Touche - Davidniltava
Niltava sundara Hodgson - Rotbauch-Niltava (Schwarzkehl-Niltava)
Niltava grandis (Blyth) - Kobalt-Niltava
Niltava macgrigoriae (Burton) - Feenniltava
- (307) *Cyanoptila* Blyth
Cyanoptila cyanomelana (Temminck) - Japanschnäpper
- (308) *Eumyias* Cabanis
Eumyias thalassina (Swainson) - Lazulischnäpper (Meerblauer Fliegenschnäpper)
- (309) *Cyornis* Blyth
Cyornis unicolor Blyth - Blaubrustschnäpper
Cyornis hainanus (Ogilvie-Grant) - Hainanschnäpper
Cyornis tickelliae Blyth - Braunbrust-Blauschläppchen
Cyornis banyumas (Horsfield) - Bergblauschläppchen
Cyornis rubeculoides (Vigors) - Blaukehlschnäpper
- (310) *Cinclidium* Blyth
Cinclidium leucurum (Hodgson) - Schattenschmätzer
- (311) *Rhyacornis* Blanford
Rhyacornis fuliginosus (Vigors) - Wasserrötel
- (312) *Hodgsonius* Bonaparte
Hodgsonius phoenicuroides (G.R. Gray) - Rotschwanz-Kurzflügel
- (313) *Brachypteryx* Horsfield²⁵
Brachypteryx leucophrys (Temminck) - Zwergkurzflügel
Brachypteryx montana Horsfield - Bergkurzflügel
Brachypteryx stellata Gould - Braunrücken-Kurzflügel
- (314) *Pseudaedon* Buturlin
Pseudaedon sibilans (Swinhoe) - Schwirrnachtigall
- (315) *Larvivora* Hodgson
Larvivora brunnea Hodgson - Orangenachtigall
Larvivora pectardens (David et Oustalet) - Davidnachtigall
Larvivora cyane (Pallas) - Blaunachtigall
Larvivora ruficeps Hartert - Rotkopfnachtigall
Larvivora akahige (Temminck) - Rostkehl Nachtigall
- (316) *Luscinia* T. Forster
Luscinia megarhynchos C.L. Brehm - Nachtigall
- (317) *Calliope* Gould
Calliope calliope (Pallas) - Rubinkehlchen (Kalliope)
Calliope pectoralis Gould - Alpenrubinkehlchen
- (318) *Cyanosylvia* C.L. Brehm
Cyanosylvia svecica (Linnaeus) - Blaukehlchen
- (319) *Tarsiger* Hodgson²⁶
Tarsiger cyanurus (Pallas) - Blauschwanz
Tarsiger indicus (Vieillot) - Weissbrauen-Blauschwanz
Tarsiger johnstoniae (Ogilvie-Grant) - Formosablaukehlchen
Tarsiger chrysaeus Hodgson - Goldschwanz
- (320) *Saxicola* Bechstein
Saxicola jerdoni (Blyth) - Jerdonschmätzer
Saxicola ferrea G.R. Gray - Grauschmätzer
Saxicola torquata (Linnaeus) - Schwarzkehlchen
Saxicola insignis G.R. Gray - Hodgonschmätzer
Saxicola caprata (Linnaeus) - Mohrenschwarzkehlchen
- (321) *Phoenicurus* T. Forster
Phoenicurus erythronotus (Eversmann) - Sprosserrotschwanz (Zügelrotschwanz)
Phoenicurus alaschanicus (Przevalski) - Rostkehl-Rotschwanz
Phoenicurus auroreus (Pallas) - Spiegelrotschwanz
Phoenicurus ochruros (Gmelin) - Hausrotschwanz
Phoenicurus hodgsoni (Moore) - Feldrotschwanz

Phoenicurus frontalis Vigors - Alpenrotschwanz
Phoenicurus erythrogaster (Güldenstädt) - Riesenrotschwanz
 (Weisskappen-Rotschwanz)
Phoenicurus schisticeps (G.R. Gray) - Baumrotschwanz
Phoenicurus coeruleocephalus Vigors - Blaukopfrötel
 (322) *Monticola* Boie
Monticola saxatilis (Linnaeus) - Steinrötel
Monticola gularis (Swinhoe) - Amurrötel
Monticola rufiventris (Jardine et Selby) - Rötelmerle
Monticola solitarius (Linnaeus) - Blaumerle
 (323) *Grandala* Hodgson
Grandala coelicolor Hodgson - Grandala
 (324) *Myophonus* Temminck et Laugier
Myophonus insularis (Gould) - Formosapfeifdrossel
Myophonus caeruleus (Scopoli) - Purpurpfeifdrossel
 (325) *Cochoa* Hodgson
Cochoa purpurea Hodgson - Purpurschnäpperdrossel
Cochoa viridis Hodgson - Grünschnäpperdrossel
 (326) *Cryptocichla* Wolters
Cryptocichla sibirica (Pallas) - Schieferdrossel (Sibirische
 Drossel)
 (327) *Geokichla* S. Müller
Geokichla citrina (Latham) - Damadrossel
 (328) *Zoothera* Vigors
Zoothera marginata Blyth - Langschnabedrossel
Zoothera dauma (Latham) - Erddrossel (Golddrossel)
Zoothera dixoni (Seeböhm) - Langschwanz-Bergdrossel
Zoothera mollissima (Blyth) - Braunrücken-Bergdrossel
 (329) *Turdus* Linnaeus
Turdus mupinensis Laubmann - Mupindrossel
Turdus viscivorus Linnaeus - Misteldrossel
Turdus pilaris Linnaeus - Wacholderdrossel
Turdus ruficollis Pallas - Bechsteindrossel (Rotkehldrossel
 und Schwarzkehldrossel)
Turdus naumanni Temminck - Naumanndrossel
Turdus merula Linnaeus - Amsel
Turdus boulboul (Latham) - Bülbüldrossel
Turdus albocinctus Royle - Weisshalsamsel
Turdus kessleri (Przevalski) - Rhododendrondrossel
Turdus rubrocanus G.R. Gray - Kastaniendrossel
Turdus poliocephalus Latham - Südseedrossel

Turdus chrysolaus Temminck - Rotkropfdrossel
Turdus obscurus Gmelin - Weissbrauendrossel
Turdus pallidus Gmelin - Fahldrossel
Turdus feae (Salvadori) - Braunkopfdrossel
Turdus hortulorum Slater - Graurückendrossel
Turdus cardis Temminck - Scheckendrossel
Turdus dissimilis Blyth - Schwarzbrustdrossel
 69. *Bombycillidae* (Seidenschwänze)
 (330) *Bombycilla* Vieillot
Bombycilla garrulus (Linnaeus) - Seidenschwanz
Bombycilla japonica (Siebold) - Rotbinden-Seidenschwanz
 70. *Aegithinidae* (Eioras)
 (331) *Aegithina* Vieillot
Aegithina tiphia (Linnaeus) - Schwarzflügel-Eiora
Aegithina lafresnayei (Hartlaub) - Langschnabel-Eiora
 71. *Chloropseidae* (Blattvögel)
 (332) *Chloropsis* Jardine et Selby
Chloropsis cochinchinensis (Gmelin) - Gelbkopf-Blattvogel
Chloropsis aurifrons (Temminck) - Goldstirn-Blattvogel
Chloropsis hardwickii Jardine et Selby - Blaubart-Blattvogel
 72. *Pycnonotidae* (Bülbüls)
 (333) *Spizixos* Blyth
Spizixos canifrons Blyth - Finkenbülbül
Spizixos semitorques Swinhoe - Halsbandbülbül
 (334) *Pycnonotus* Boie²⁷
Pycnonotus striatus (Blyth) - Streifenbülbül
Pycnonotus melanicterus (Gmelin) - Gelbbrustbülbül
Pycnonotus jocosus (Linnaeus) - Rotohrbülbül
Pycnonotus sinensis (Gmelin) - Chinesenbülbül
Pycnonotus taivanus Styan - Formosabülbül
Pycnonotus xanthorrhous Anderson - Gelbsteissbülbül
Pycnonotus cafer (Linnaeus) - Tonkibülbül
Pycnonotus finlaysoni Strickland - Streifenkehlbülbül
Pycnonotus flavescens Blyth - Blasswangenbülbül
 (335) *Criniger* Temminck
Criniger pallidus Swinhoe - Blassbauch-Schopfbülbül
 (336) *Hypsipetes* Vigors
Hypsipetes charlottae (Finsch) - Olivfluchtvogel
Hypsipetes maclellandii Horsfield - Grünflügel-Fluchtvogel
Hypsipetes flavala (Blyth) - Goldflügel-Fluchtvogel
Hypsipetes amaurotis (Temminck) - Orpheusfluchtvogel
Hypsipetes leucocephalus (Gmelin) - Graufluchtvogel

73. Sturnidae (Stare)
- (337) Pastor Temminck
Pastor roseus (Linnaeus) - Rosenstar
 - (338) *Sturnus Linnaeus*
Sturnus vulgaris Linnaeus - Star
 - (339) *Sturnopastor* Blyth
Sturnopastor cineraceus (Temminck) - Graustar
Sturnopastor sericeus (Gmelin) - Seidenstar
Sturnopastor contra (Linnaeus) - Elsterstar
 - (340) *Sturnia* Lesson
Sturnia sinensis (Gmelin) - Mandarinstar
Sturnia philippensis (J.R. Forster) - Violettrückenstar (Rost-backenstar)
Sturnia sturnina (Pallas) - Mongolenstar
 - (341) *Temenuchus* Cabanis
Temenuchus malabaricus (Gmelin) - Graukopfstar
 - (342) *Gracupica* Lesson
Gracupica nigricollis (Paykull) - Schwarzhalsstar
 - (343) *Acridotheres* Vieillot
Acridotheres tristis (Linnaeus) - Hirtenmaina (Hirtenstar)
Acridotheres albocinctus Godwin-Austen et Walden - Halsband-maina
Acridotheres grandis Moore - Dschungelmaina
Acridotheres cristatellus (Linnaeus) - Haubenmaina
 - (344) *Gracula* Linnaeus
Gracula religiosa Linnaeus - Beo
74. Hirundinidae (Schwalben)
- (345) *Riparia* Forster
Riparia riparia (Linnaeus) - Uferschwalbe
Riparia paludicola (Vieillot) - Braunkehl-Uferschwalbe
 - (346) *Ptyonoprogne* Reichenbach
Ptyonoprogne rupestris (Scopoli) - Felsenschwalbe
 - (347) *Hirundo* Linnaeus
Hirundo rustica Linnaeus - Rauchschwalbe
Hirundo tahitica Gmelin - Südseeschwalbe
 - (348) *Cecropis* Boie
Cecropis daurica (Linnaeus) - Rötelschwalbe
Cecropis striolata (Temminck et Schlegel) - Strichelschwalbe
 - (349) *Delichon* Horsfield et Moore
Delichon urbica (Linnaeus) - Mehlschwalbe
75. Nectariniidae (Nektarvögel)
- (350) *Hypogramma* Reichenbach
Hypogramma hypogrammicum (S. Müller) - Blauäckchen-Nektarvogel

- (351) *Anthreptes* Swainson
Anthreptes singalensis (Gmelin) - Rotohr-Nektarvogel²⁸
- (352) *Nectarinia* Illiger²⁸
Nectarinia jugularis (Linnaeus) - Schmucknektervogel
- (353) *Aethopyga* Cabanis
Aethopyga gouldiae (Vigors) - Gouldnektervogel
Aethopyga nipalensis (Hodgson) - Grünschwanz-Nektarvogel
Aethopyga christinae Swinhoe - Hainannektarvogel
Aethopyga saturata (Hodgson) - Schwarzkehl-Nektarvogel
Aethopyga siparaja (Raffles) - Scharlachnektervogel (Gelbrücken-Nektarvogel)
Aethopyga ignicauda (Hodgson) - Feuerschwanz-Nektarvogel
- (354) *Arachnothera* Temminck
Arachnothera longirostris (Latham) - Graukehl-Spinnenjäger
Arachnothera magna Blyth - Streifen-Spinnenjäger
76. Dicaeidae (Mistelfresser oder Blütenpicker)
- (355) *Dicaeum* Cuvier
Dicaeum chrysorrheum Temminck et Laugier - Gelbsteiss-Mistelfresser
Dicaeum melanoxanthum (Blyth) - Gelbauch-Mistelfresser
Dicaeum concolor Jerdon - Malabar-Mistelfresser
Dicaeum ignipectus (Blyth) - Feuerbrust-Mistelfresser
Dicaeum cruentatum (Linnaeus) - Scharlachmistelfresser
77. Remizidae (Beutelmeisen)
- (356) *Remiz* Jarocki
Remiz pendulinus (Linnaeus) - Beutelmeise
 - (357) *Cephalopyrus* Bonaparte
Cephalopyrus flammiceps (Burton) - Feuerkopfmeise
78. Zosteropidae (Brillenvögel)
- (358) *Zosterops* Vigors et Horsfield
Zosterops erythropleurus Swinhoe - Rotflanken-Brillenvogel
Zosterops japonicus Temminck et Schlegel - Japanbrillenvogel
Zosterops palpebrosus (Temminck) - Gangesbrillenvogel
79. Estrildidae (Prachtfinken)
- (359) *Amandava* Blyth
Amandava amandava (Linnaeus) - Tigerfink (Tigerastrild)
 - (360) *Padda* Reichenbach
Padda oryzivora (Linnaeus) - Reisfink (Reisamadine)
 - (361) *Lonchura* Sykes
Lonchura malacca (Linnaeus) - Schwarzbauchnonne
Lonchura striata (Linnaeus) - Spitzschwanz-Bronzemännchen
Lonchura punctulata (Linnaeus) - Muskatfink (Muskatamadine)

80. Ploceidae (Webervögel)
- (362) *Ploceus* Cuvier
- Ploceus manyar* (Horsfield) - Manyarweber
 - Ploceus philippinus* (Linnaeus) - Bajaweber
81. Passeridae (Sperlinge)
- (363) *Passer* Brisson
- Passer montanus* (Linnaeus) - Feldsperling
 - Passer rutilans* (Temminck) - Rötelsperling
 - Passer ammodendri* Gould - Saxaulsperling
 - Passer hispaniolensis* (Temminck) - Weidensperling
 - Passer domesticus* (Linnaeus) - Haussperling (Spatz)
- (364) *Petronia* Kaup
- Petronia petronia* (Linnaeus) - Steinsperling
- (365) *Montifringilla* C.L. Brehm
- Montifringilla ruficollis* Blanford - Rothals-Schneefink (Rothals-Schneesperling)
 - Montifringilla blanfordi* Hume - Blanford-Schneefink (Blanford-Schneesperling)
 - Montifringilla davidiana* (Verreaux) - David-Schneefink (Erd-sperling)
 - Montifringilla taczanowskii* (Przevalski) - Taczanowski-Schneefink (Taczanowski-Schneesperling)
 - Montifringilla adamsi* Adams - Adams-Schneefink (Adams-Schneesperling)
 - Montifringilla nivalis* (Linnaeus) - Schneefink (Schneesperling)
82. Fringillidae (Finken)
- (366) *Leucosticte* Swainson
- Leucosticte nemoricola* (Hodgson) - Waldschneegimpel
 - Leucosticte brandti* (Bonaparte) - Felsenschneegimpel
 - Leucosticte arctoa* (Pallas) - Graukopf-Schneegimpel
- (367) *Rhodopechys* Cabanis
- Rhodopechys sanguinea* (Gould) - Rotflügelgimpel
- (368) *Bucanetes* Cabanis
- Bucanetes mongolicus* (Swinhoe) - Mongolengimpel
- (369) *Rhodospiza* Sharpe
- Rhodospiza obsoleta* (Lichtenstein) - Weissflügelgimpel (Schwarzfügelgimpel)
- (370) *Pyrrhula* Brisson
- Pyrrhula nipalensis* Hodgson - Schuppenkopfgimpel
 - Pyrrhula erythaca* Blyth - Maskengimpel
 - Pyrrhula erythrocephala* Vigors - Rotkopfgimpel
 - Pyrrhula pyrrhula* (Linnaeus) - Gimpel
- (371) *Eophona* Gould
- Eophona personata* (Temminck et Schlegel) - Maskenkernbeisser
 - Eophona migratoria* Hartert - Schwarzschwanz-Kernbeisser
- (372) *Mycerobas* Cabanis
- Mycerobas melanozanthos* (Hodgson) - Fleckenkernbeisser
 - Mycerobas carnipes* (Hodgson) - Wacholderkernbeisser
 - Mycerobas affinis* (Blyth) - Gelbschenkel-Kernbeisser
- (373) *Coccothraustes* Brisson
- Coccothraustes coccothraustes* (Linnaeus) - Kernbeisser
- (374) *Chloris* Cuvier
- Chloris sinica* (Linnaeus) - Chinesengrünling
 - Chloris spinoides* (Vigors) - Himalayagrünling
 - Chloris ambigua* (Oustalet) - Schwarzkopfgrünling
- (375) *Carduelis* Brisson
- Carduelis carduelis* (Linnaeus) - Stieglitz (Distelfink)
- (376) *Spinus* Koch
- Spinus spinus* (Linnaeus) - Zeisig (Erlenzeisig)
- (377) *Acanthis* Borkhausen
- Acanthis flammea* (Linnaeus) - Birkenzeisig
- (378) *Linaria* Bechstein
- Linaria flavirostris* (Linnaeus) - Berghänfling
 - Linaria cannabina* (Linnaeus) - Hänfling (Bluthänfling)
- (379) *Serinus* Koch
- Serinus thibetanus* (Hume) - Himalayagirlitz
 - Serinus pusillus* (Pallas) - Rotstirngirlitz
- (380)²⁹ *Carpodacus* Kaup
- Carpodacus sibiricus* (Pallas) - Meisengimpel
 - Carpodacus trifasciatus* Verreaux - Bindengimpel
 - Carpodacus roseus* (Pallas) - Rosengimpel
 - Carpodacus synoicus* (Temminck) - Einödgimpel
 - Carpodacus rhodochlamys* (Brandt) - Rotmantelgimpel
 - Carpodacus pulcherrimus* (Moore) - Schmuckgimpel
 - Carpodacus eos* (Stresemann) - Auroragimpel
 - Carpodacus thura* Bonaparte et Schlegel - Thuragimpel (Waldgimpel)
 - Carpodacus rhodopeplus* (Vigors) - Rosenbauchgimpel
 - Carpodacus edwardsii* Verreaux - Edwardsgimpel
 - Carpodacus vinaceus* Verreaux - Burgundergimpel
 - Carpodacus nipalensis* (Hodgson) - Dünschnabelgimpel
 - Carpodacus rubescens* (Blanford) - Blanfordgimpel
 - Carpodacus erythrinus* (Pallas) - Karmeingimpel
 - Carpodacus rubicilloides* Przevalski - Alpengimpel

Carpodacus rubicilla (Güldenstädt) - Berggimpel
Carpodacus puniceus (Blyth) - Felsengimpel
Carpodacus roborowski (Przevalski) - Roborowskigimpel
(381) *Pinicola Vieillot*
 Pinicola subhimachala (Hodgson) - Rhododendrongimpel
 Pinicola enucleator (Linnaeus) - Hakengimpel
(382) *Loxia Linnaeus*
 Loxia curvirostra Linnaeus - Fichtenkreuzschnabel
 Loxia leucoptera Gmelin - Bindenkreuzschnabel
(383) *Haematoxiphis Blyth*
 Haematoxiphis sipahi (Hodgson) - Scharlachgimpel
(384) *Pyrrhoplectes Hodgson*
 Pyrrhoplectes epaulette (Hodgson) - Mohrengimpel
(385) *Fringilla Linnaeus*
 Fringilla montifringilla Linnaeus - Bergfink
83. *Emberizidae* (Ammern)
(386) *Tisa Clark*
 Tisa variabilis (Temminck) - Bambusammer
(387) *Latoucheornis Bangs*
 Latoucheornis siemsseni (Martens) - Blauammer
(388) *Emberiza Linnaeus*³⁰
 Emberiza lathami J.E. Gray - Haubenammer
 Emberiza calandra Linnaeus - Grauammer
 Emberiza melanocephala Scopoli - Kappenammer
 Emberiza bruniceps Brandt - Braunkopfammer
 Emberiza citrinella Linnaeus - Goldammer
 Emberiza leucocephalos S.G. Gmelin - Fichtenammer
 Emberiza koslowi Bianchi - Koslowammer
 Emberiza hortulana Linnaeus - Ortolan
 Emberiza buchanani Blyth - Steinortolan
 Emberiza cia Linnaeus - Zippammer
 Emberiza godlewskii Taczanovski - Felsenammer
 Emberiza cioides Brandt - Wiesenammer
 Emberiza jankowskii Taczanovski - Jankowskiammer
 Emberiza fucata Pallas - Graukopfammer (Braunohrammer)
 Emberiza pusilla Pallas - Zwergammer
 Emberiza schoeniclus Linnaeus - Rohrammer
 Emberiza pallasi (Cabanis) - Grauschulter-Rohrammer
 Emberiza yessoensis (Swinhoe) - Mandschurenammer
 Emberiza tristrami Swinhoe - Tristramammer
 Emberiza chrysophrys Pallas - Prachtammer

Emberiza elegans Temminck - Schmuckammer
Emberiza rustica Pallas - Waldammer
Emberiza aureola Pallas - Weidenammer
Emberiza rutila Pallas - Rötelammer
Emberiza spodocephala Pallas - Maskenammer
Emberiza sulphurata Temminck et Schlegel - Schwefelammer
(389) *Calcarius Bechstein*
 Calcarius lapponicus (Linnaeus) - Spornammer
(390) *Plectrophenax Stejneger*
 Plectrophenax nivalis (Linnaeus) - Schneeammer
(391) *Urocynchramus Przevalski*³¹
 Urocynchramus pylzowi Przevalski - Meisenammer (Schwanzgimpel)
84. *Motacillidae* (Stelzen)
(392) *Anthus Bechstein*
 Anthus sylvanus (Hodgson) - Schmalschwanzpieper
 Anthus campestris (Linnaeus) - Brachpieper
 Anthus godlewskii (Taczanowski) - Godlewskipieper
 Anthus novaeseelandiae (Gmelin) - Spornpieper
 Anthus trivialis (Linnaeus) - Baumpieper
 Anthus hodgsoni Richmond - Waldpieper
 Anthus gustavi Swinhoe - Petschorapieper
 Anthus cervinus (Pallas) - Rotkehlpieper
 Anthus spinosus (Linnaeus) - Wasserpieper
 Anthus roseatus Blyth - Rosenpieper
(393) *Motacilla Linnaeus*
 Motacilla indica Gmelin - Baumstelze (Waldstelze)
 Motacilla citreola Pallas - Zitronenstelze
 Motacilla flava Linnaeus - Schafstelze
 Motacilla cinerea Tunstall - Gebirgstelze
 Motacilla alba Linnaeus - Bachstelze
85. *Sittidae* (Spechtmeisen oder Kleiber)
(394) *Sitta Linnaeus*
 Sitta magna Ramsay - Riesenkleiber
 Sitta europaea Linnaeus - Kleiber
 Sitta castanea Lesson - Zimtkleiber
 Sitta himalayensis Jardine et Selby - Weissenschwanzkleiber
 Sitta yunnanensis Ogilvie-Grant - Yünnankleiber
 Sitta villosa Verreaux - Chinesenkleiber
 Sitta leucopsis Gould - Weisswangenkleiber
 Sitta frontalis Swainson - Brillenkleiber

86. Monarchidae (Monarchen)
- (395) *Culicicapa Swinhoe*
Culicicapa ceylonensis (Swainson) - Graukopf-Mückenschnäpper
- (396) *Chelidorynx Hodgson*
Chelidorynx hypoxantha Blyth - Gelbbauch-Fächerschwanz
- (397) *Rhipidura Vigors et Horsfield*
Rhipidura aureola Lesson - Weissbrauen-Fächerschwanz
Rhipidura albicollis (Vieillot) - Weisskehl-Fächerschwanz
- (398) *Hypothymis Boie*
Hypothymis azurea (Boddaert) - Schwarznackenmonarch
- (399) *Terpsiphone Gloger*
Terpsiphone atrocaudata (Eyton) - Prinzesschnäpper
Terpsiphone paradisi (Linnaeus) - Paradiesschnäpper
87. Laniidae (Würger)
- (400) *Lanius Linnaeus*
Lanius excubitor Linnaeus - Raubwürger (Grauwürger)
Lanius sphenocercus Cabanis - Keilschwanzwürger
Lanius bucephalus Temminck et Schlegel - Büffelwürger
Lanius cristatus Linnaeus - Rotschwanzwürger
Lanius tigrinus Drapiez - Tigerwürger
Lanius colluriooides Lesson - Burmawürger
Lanius minor Gmelin - Schwarzstirnwürger
Lanius schach Linnaeus - Schachwürger
Lanius tephronotus (Vigors) - Tibetwürger
88. Campephagidae (Stachelbürlzer)
- (401) *Tephrodornis Swainson*
Tephrodornis gularis (Raffles) - Braunschwarz-Tephrodornis
- (402) *Hemipus Hodgson*
Hemipus picatus (Sykes) - Elsterraupenschmätzer
- (403) *Pericrocotus Boie*
Pericrocotus flammeus (Forster) - Scharlachmennigvogel
Pericrocotus brevirostris (Vigors) - Kurzschnabel-Mennigvogel
Pericrocotus ethologus Bangs et Philipps - Langschwanz-Mennigvogel
Pericrocotus solaris Blyth - Graukinn-Mennigvogel
Pericrocotus divaricatus (Raffles) - Graumennigvogel
Pericrocotus roseus (Vieillot) - Rosenmennigvogel
- (404) *Coracina Vieillot*
Coracina melaschistos (Hodgson) - Trauerraupenfänger
Coracina novae-hollandiae (Gmelin) - Maskerraupenfänger

89. Dicruridae (Drongos)
- (405) *Dicrurus Vieillot*
Dicrurus macrocercus Vieillot - Königsdrongo
Dicrurus leucophaeus Vieillot - Graudrongo
Dicrurus annectans (Hodgson) - Krähenschnabeldrongo
Dicrurus aeneus Vieillot - Bronzedrongo
Dicrurus hottentottus (Linnaeus) - Seidendrongo
Dicrurus remifer (Temminck) - Spatelschwanzdrongo
Dicrurus paradiseus (Linnaeus) - Flaggendrongo
90. Irenidae (Feenvögel)
- (406) *Irena Horsfield*
Irena puella (Latham) - Irene (Feenvogel)
91. Oriolidae (Pirole)
- (407) *Oriolus Linnaeus*
Oriolus oriolus (Linnaeus) - Pirol
Oriolus chinensis Linnaeus - Schwarznackenpirol
Oriolus xanthornus (Linnaeus) - Schwarzkopfpirol
Oriolus traillii (Vigors) - Blutpirol
Oriolus mellianus Stresemann - Seidenpirol
92. Artamidae (Schwalbenstare)
- (408) *Artamus Vieillot*
Artamus fuscus Vieillot - Grauschwalbenstar
93. Corvidae (Rabenvögel)
- (409) *Perisoreus Bonaparte*
Perisoreus internigrans (Thayer et Bangs) - Szetschwanhäher
Perisoreus infaustus (Linnaeus) - Unglückshäher
- (410) *Garrulus Brisson*
Garrulus glandarius (Linnaeus) - Eichelhäher
- (411) *Urocissa Cabanis*
Urocissa whiteheadi Ogilvie-Grant - Graukitta
Urocissa erythrorhyncha (Boddaert) - Rotschnabelkitta
Urocissa flavirostris (Blyth) - Gelbschnabelkitta
Urocissa caerulea Gould - Dickschnabelkitta
- (412) *Cissa Boie*
Cissa thalassina (Temminck) - Buschelster
Cissa chinensis (Boddaert) - Jagdelster
- (413) *Cyanopica Bonaparte*
Cyanopica cyana (Pallas) - Blauelster
- (414) *Dendrocitta Gould*
Dendrocitta frontalis Horsfield - Maskenbaumelster
Dendrocitta formosae Swinhoe - Graubrustelster

(415) *Temnurus* Lesson*Temnurus temnurus* (Temminck) - Buchtschwanzelster(416) *Pica* Brisson*Pica pica* (Linnaeus) - Elster(417) *Podoces* Fischer*Podoces hendersoni* Hume - Mongolenhäher*Podoces biddulphi* Hume - Weißschwanzhäher(418) *Pseudopodoces* Zarudny et Loudon*Pseudopodoces humilis* (Hume) - Höhlenhäher(419) *Nucifraga* Brisson*Nucifraga caryocatactes* (Linnaeus) - Tannenhäher(420) *Pyrrhocorax* Tunstall*Pyrrhocorax pyrrhocorax* (Linnaeus) - Alpenkrähe*Pyrrhocorax graculus* (Linnaeus) - Alpendohle(421) *Corvus* Linnaeus*Corvus monedula* Linnaeus - Dohle*Corvus dauuricus* Pallas - Elsterdohle*Corvus splendens* Vieillot - Glanzkrähe*Corvus frugilegus* Linnaeus - Saatkrähe*Corvus corone* Linnaeus - Aaskrähe (Raben- und Nebelkrähe)*Corvus macrorhynchos* Wagler - Dickschnabelkrähe*Corvus torquatus* Lesson - Halsbandkrähe*Corvus corax* Linnaeus - Kolkkrähe

1 Zu (36), S. 324, *Cygnus*: Die Gattung *Cygnus* wird von Wolters u. a. aufgeteilt; danach gehören *C. cygnus* und *C. bewickii* zu einer Gattung *Olor* Wagler, und nur *C. olor* verbleibt in der Gattung *Cygnus* Bechstein.

2 Zu (37), S. 324, *Anser*: *Anser indicus* wird vielfach in eine besondere Gattung *Eulabeia* Reichenbach gestellt, während *A. caerulescens* häufig als *Chen caerulescens* (Gattung *Chen* Boie) gesondert wird.

3 Zu (45), S. 324, *Anas*: Manche Autoren zerlegen *Anas* in mehrere Gattungen; wenn man ihnen folgt, sind die chinesischen Arten in nachstehender Weise auf diese Gattungen zu verteilen: Gattung *Mareca* Stephens (*A. penelope*), Gattung *Eunetta* Bonaparte (*A. falcata*), Gattung *Chaulelasmus* Bonaparte (*A. strepera*), Gattung *Nettion* Kaup (*A. formosa*, *A. crecca*), Gattung *Dafila* Stephens (*A. acuta*), Gattung *Querquedula* Stephens (*A. querquedula*), Gattung *Spatula* Boie (*A. clypeata*), Gattung *Anas* Linnaeus (*A. poecilorhyncha*, *A. platyrhynchos*).

4 Zu (69), S. 326, *Hieraaetus*: Der Habichtadler ist nach Wolters (mdl.) richtiger in eine besondere Gattung *Eutolmaetus* Blyth zu stellen und als *Eutolmaetus fasciatus* (Vieillot) hinter *Lophotriorchis kienerii* einzuordnen.

5 Zu (116), S. 330, *Porzana*: Die hier zu der Gattung *Porzana* zusammengefassten Arten sind nach Wolters besser wie folgt zu bündeln: Gattung *Porzana* Vieillot (*P. porzana*, *P. parva*, *P. pusilla*), Gattung *Co-rethrura* G.R. Gray (*C. paykullii*, *C. fusca*), Gattung *Limnocorax* H. Peters (*L. bicolor*).

6 Zu (126), S. 331, *Calidris*: Mit anderen Autoren zerlegt Wolters *Calidris* in mehrere Gattungen, was für die chinesischen Arten die nachstehende Klassifikation zur Folge hätte: Gattung *Calidris* Merrem (*C. tenuirostris*, *C. canutus*), Gattung *Erolia* Vieillot (*E. ferruginea*), Gattung *Heteropygia* Coues (*H. acuminata*), Gattung *Ereunetes* Illiger (*E. pygmeus*, *E. ruficollis*, *E. temminckii*, *E. subminutus*), Gattung *Crocethia* Billberg (*C. alba*), Gattung *Pelidna* Cuvier (*P. alpina*).

7 Zu 26, S. 332, *Phalaropodidae*: Heute meist als Unterfamilie zu den *Scolopacidae* gestellt.

8 Zu (143), S. 333, *Ibidorhyncha*: Die Gattung *Ibidorhyncha* wird wohl richtiger in eine besondere Familie, *Ibidorhynchidae* (*Ibischnäbel*), gestellt.

9 Zu 30, S. 333, *Charadriidae*: Manche Autoren trennen die Kiebitze (in China die Gattungen *Microsarcops*, *Lobivanellus*, *Hoplopterus* und *Vanellus*) als besondere Familie *Vanellidae* (Kiebitze) von den *Charadriidae* ab.

10 Zu (153), S. 333, *Larus*: Die Abgrenzung der Art *Larus argentatus* ist sehr schwierig und steht noch nicht endgültig fest; einige Autoren sehen die Silbermöwe nur als Rassengruppe der Art *Larus fucus* Linnaeus (Heringsmöwe) an, was wohl zu weit geht, andere betrachten mit besserem Grund *L. schistisagus* und *L. glaucescens* nur als Rassen von *L. argentatus*, wieder andere teilen *L. argentatus* im hier angenommenen Sinne noch weiter auf (in *L. argentatus*, *L. occidentalis*, *L. heuglini* und *L. cachinnans*), wobei für China die "Arten" *L. heuglini* Bree und *L. cachinnans* Pallas in Frage kämen; eine solche Aufteilung geht aber wohl sicher zu weit. Dagegen neigt Wolters dazu, die grosse Gattung *Larus* zu zerlegen und für die chinesischen Arten folgende Gattungen anzunehmen: *Larus* Linnaeus (*L. crassirostris*, *L. canus*, *L. argentatus*, *L. schistisagus*, *L. glaucescens*, *L. hyperboreus*), *Ichthyaetus* Kaup (*I. ichthyaetus*), *Chroicocephalus* Eyton (*Ch. relictus*, *Ch. brunneicephalus*, *Ch. ridibundus*, *Ch. saundersi*), *Hydrocoloeus* Kaup (*H. minutus*), *Rhodostethia* MacGillivray (*Rh. rosea*) und *Rissa* Stephens (*R. tridactyla*).

11 Zu (166), S. 335, *Eremialector*: Wolters hält es für möglich, *Eremialector* als Untergattung von *Syrrhaptes* zu betrachten (Bonner zool. Beiträge, 25, 1974).

12 Zu 36, S. 335, *Columbidae*: Wolters verteilt die hier genannten Taubengattungen auf drei Familien: *Columbidae* (Tauben; Gattungen *Chal-cophaps*, *Streptopelia*, *Columba*, *Macropygia*), *Duculidae* (Fruchttauben; Gattungen *Ducula*, *Ptilinopus*) und *Treronidae* (Grün- oder Papageitauben; Gattung *Treron*).

13 Zu (169), S. 335, *Columba*: Von einigen Autoren wird die Gattung *Columba*, die sich aus untereinander recht verschiedenen Elementen zusammensetzt, in mehrere Gattungen aufgeteilt, was nach Wolters die verwandtschaftlichen Beziehungen der Arten besser zum Ausdruck bringt. Folgt man dieser Auffassung, so wären die chinesischen Arten wie folgt zu gruppieren: Gattung *Columba* Linnaeus (*C. leuconota*, *C. rupestris*, *C. livia*, *C. eversmanni*, *C. oenas*), Gattung *Palumbus* Kaup (*P. palumbus*, *P. pulchricollis*), Gattung *Dendrotreron* Hodgson (*D. hodgsonii*), Gattung *Alsocomus* Blyth (*A. puniceus*, *A. janthinus*).

14 Zu 37, S. 336, *Psittacidae*: *Loriculus* gehört nach der Klassifikation von Wolters zur Familie *Micropsittidae* (Kleinpapageien), *Psittacula* zu den *Psittaculidae* (Edelpapageien); W. verteilt die Papageien auf 11 Familien.

15 Zu 38, S. 336, *Cuculidae*: Wolters teilt die Familie *Cuculidae* auf und betrachtet die chinesischen Kuckucke als Vertreter der folgenden Familien: *Centropodidae* (Laufkuckucke; in China nur die Gattung *Centropus*), *Clamatoridae* (Häherkuckucke; Gattung *Clamator*), *Cuculidae*

- (Eigentliche Kuckucke; Gattungen *Hierococcyx*, *Surniculus*, *Cuculus*, *Cacomantis*, *Chrysococcyx*), *Eudynamidae* (Köhlkuckucke; Gattung *Eudynamys*) und *Phoenicophaeidae* (Buntschnabelkuckucke; Gattung *Rhopodytes*).
- 16 Zu 39, S. 337, *Tytonidae*: Die Schleiereulen stellen nach der Meinung vieler Autoren keine eigene Familie, sondern nur eine Unterfamilie der *Strigidae* dar.
 - 17 Zu (195), S. 337, *Glaucidium*: Wolters verteilt die chinesischen Arten von *Glaucidium* auf drei Gattungen: *Glaucidium* Boie (*G. passerinum*), *Taenioptynx* Kaup (*T. brodiei*), *Taenioglaux* Kaup (*T. castanoptera*).
 - 18 Zu (240), S. 341, *Prunella*: Die Arten *P. collaris* und *P. himalayana* werden vielfach, vor allem von russischen Autoren, in eine besondere Gattung, *Laiscopus* Gloger, gestellt; auch Wolters (briefl.) hält das für zweckmäßig, weist aber darauf hin, dass dann auch die restlichen *Prunella*-Arten konsequenterweise auf zwei Gattungen (*Spermolegus* Kaup und *Prunella* Vieillot) verteilt werden müssen, was für die chinesischen Arten folgende Anordnung ergäbe: *Spermophilus* koslowi (Przevalski), *S. rubeculoides* (Horsfield et Moore), *S. strophiatus* (Blyth), *S. fulvescens* (Severtzov), *S. montanellus* (Pallas), *S. atrogularis* (Brandt), *Prunella* immaculata (Hodgson).
 - 19 Zu (249), S. 343, *Phylloscopus*: "Will man nicht *Seicercus* (und *Abroscopus*) in der Gattung *Phylloscopus* aufgehen lassen, da offensichtlich Arten wie *Ph. cantator*, *Ph. davisoni* u. a. den *Seicercus*-Arten näher verwandt sind als den übrigen Arten von *Phylloscopus*, dann muss *Phylloscopus* in mehrere Gattungen aufgeteilt werden, auf die sich die chinesischen Arten etwa wie folgt verteilen würden: Gattung *Herbivacula* Swinhoe (*H. schwarzi*, *H. armндii*, *H. griseola*, *H. subaffinis*, *H. affinis*, *H. fuscata*), Gattung *Phylloscopus* Boie (*Ph. collybita*), Gattung *Acanthopneuste* Blasius (*A. borealis*, *A. tenellipes*, *A. magnirostris*, *A. trochiloides*), Gattung *Reguloides* Blyth (*R. inornatus*, *R. proregulus*, *R. maculipennis*, *R. pulcher*), Gattung *Cryptigata* Mathews (*C. coronata*, *C. reguloides*, *C. davisoni*, *C. cantator*); an *Cryptigata* würde sich dann die Gattung *Seicercus* anschliessen." (Wolters, briefl.).
 - 20 Zu (260), S. 344, *Regulus*: Die Goldhähnchen werden heute meist zu den *Sylviidae* in die unmittelbare Nachbarschaft der Gattung *Phylloscopus* bzw. *Reguloides* gestellt, doch verweist Wolters darauf, dass die früher häufig vorgenommene Sonderung in einer eigenen Familie *Regulidae* viel für sich hat, vor allem im Lichte der Untersuchungen von Morioka (Mem. College of Science, Univ. Kyoto, ser. B, vol. 27, no. 1, 1960), und darum hier befolgt wird; die Ähnlichkeit zwischen *Regulus* und *Reguloides* dürfte konvergenter Natur sein.
 - 21 Zu (265), S. 345, *Paradoxornis*: Eine Bündelung der hier dem heutigen Gebrauch entsprechend in der sehr heterogen erscheinenden Gattung *Paradoxornis* zusammengefassten Arten ist schwierig, wie die offensichtlich fehlerhaften Gruppierungen der älteren Systematik zeigen; auf die Dauer erscheint aber eine Aufteilung von *Paradoxornis* unerlässlich, und Wolters (briefl.) glaubt, dass vorbehaltlich weiterer Untersuchungen sich vielleicht die folgende Klassifikation als möglich erweisen wird: Gattung *Paradoxornis* Gould (*P. flavirostris*), Gattung *Calamornis* Gould (*C. heudei*), Gattung *Cholornis* J. Verreaux (*Ch. gularis*, *Ch. unicolor*, *Ch. paradoxus*), Gattung *Suthora* Hodgson (*S. nipalensis*, *S. przewalskii*), Gattung *Chleuasicus* Blyth (*Ch. fulvifrons*, *Ch. ruficeps* Blyth = *Paradoxornis atrosupercilialis* (Godwin-Austen), da der Name *ruficeps* in *Paradoxornis* schon vergeben), Gattung *Neosuthora* Hellmayr (*N. conspicillata*, *N. webbiana*, *N. zappeyi*, *N. daviana*).
 - 22 Zu (279), S. 346, *Garrulax*: Die aus untereinander stark verschiedenen Artengruppen bestehende Gattung *Garrulax* wird wohl besser, wie früher üblich, in mehrere Gattungen zerlegt, deren Zahl und Abgrenzung

- aber erst nach genaueren Untersuchungen festgelegt werden kann.
- 23 Zu 68, S. 349, *Muscicapidae*: Schmätzer, Fliegenschnäpper, Erdsänger und Drosseln sind sehr eng miteinander verwandt (vgl. Ames, Bonner zoologische Beiträge, 26, 1975) und nach Wolters nicht einmal als Unterfamilie zu trennen; von den *Sylviidae*, mit denen sie vielfach zusammengestellt werden, sind sie dagegen sehr verschieden.
 - 24 Zu (302), S. 349, *Muscicapa*: Wolters (briefl.) hält es für ratsam, die Gattung *Muscicapa* weiter zu zerlegen und für die chinesischen Arten vorläufig folgende Gattungen anzunehmen: *Muscicapa Brisson* (für *M. striata*), *Hemichelidon* Hodgson (*H. sibirica*, *H. griseistica*) und *Arizelomyia* Oberholser (*A. latirostris*, *A. ferruginea*, *A. muttui*).
 - 25 Zu (313), S. 351, *Brachypteryx*: Manche Autoren stellen, nach Wolters zu Recht, den Braunrück-Kurzflügel in eine besondere Gattung, *Heteroxenicus* Sharpe, und nennen ihn *Heteroxenicus stellatus* (Gould).
 - 26 Zu (319), S. 351, *Tarsiger*: Manche Autoren beschränken die Gattung *Tarsiger* auf *T. chrysaeus* und stellen die anderen hier zu *Tarsiger* gerechneten Arten in eine besondere Gattung *Ianthia* Blyth.
 - 27 Zu (334), S. 353, *Pycnonotus*: Mit den älteren Autoren ist Wolters der Meinung, dass eine Aufteilung der Gattung *Pycnonotus* im weiten hier befolgten Sinne nicht zu umgehen ist; die chinesischen Arten könnten dann etwa in folgender Weise angeordnet werden: Gattung *Alcurus* Blyth (*A. striatus*), Gattung *Rubigula* Blyth (*R. melanictera*), Gattung *Otocompsa* Cabanis (*O. jocosa*), Gattung *Pachycephalixus* Büttikofer (*P. sinensis*, *P. taivanus*, *P. xanthorrhous*), Gattung *Pycnonotus* Boie (*P. cafer*), Gattung *Loidorusa* Reichenbach (*L. finlaysoni*, *L. flavescens*); die verwandschaftlichen Beziehungen der Bülbülarten untereinander und damit ihre Bündelung zu Gattungen bedürfen aber noch weiteren Studiums.
 - 28 Zu (352), S. 355, *Nectarinia*: Bei einer Aufteilung der überdimensionalen Gattung *Nectarinia* gehört die einzige chinesische Art, *N. jugularis*, zur Gattung *Cyrtostomus* Cabanis.
 - 29 Zu (380), S. 357, *Carpodacus*: Die Gattung *Carpodacus* bedarf dringend einer Revision. Die chinesischen Arten sind bei einer sich wahrscheinlich als notwendig erweisenden Aufteilung der Gattung wie folgt anzugeordnen: Gattung *Carpodacus* Kaup (*C. sibiricus*, *C. trifasciatus*, *C. roseus*, *C. synoicus*, *C. rhodochlamys*, *C. pulcherrimus*, *C. eos*, *C. thura*, *C. rhodopeplus*, *C. edwardsii*, *C. vinaceus*, *C. nipalensis*, *C. rubescens*; die Absonderung von *C. sibiricus* in einer besonderen Gattung *Uragus* Keyserling et Blasius dürfte nur möglich sein, wenn *Carpodacus* im engeren Sinne noch weiter aufgeteilt würde, was die Schaffung neuer Gattungsnamen nötig machen würde; *C. sibiricus* scheint trotz der geringeren Grösse und des längeren Schwanzes mit *C. trifasciatus* und *C. roseus* nahe verwandt zu sein), Gattung *Erythrina* Brehm (1829; *E. erythrina*), Gattung *Rubicilla* Bonaparte et Schlegel (*R. rubicilloides*, *R. rubicilla*), *Pyrrhospiza* Blyth (*P. punicea*), *Kozlowia* Bianchi (*K. roborowskii*). Für den ornithologischen Systematiker sei hier vermerkt, dass nach Wolters der Name *Erythrina* Brehm nicht durch *Erythospiza* Bonaparte ersetzt zu werden braucht, da er sich in An betracht dessen, dass *Erythrina* Brehm, 1828 ein nomen nudum ist, von Brehms *Erythrina albifrons* 1829 herleitet, die ein aberrantes Stück von *E. erythrina* (bzw. *Carpodacus erythrinus*) ist.
 - 30 Zu (388), S. 358, *Emberiza*: Die Gattung *Emberiza* ist hier wie üblich sehr weit gefasst; eine Aufteilung ist z. Zt. noch nicht in befriedigender Weise durchführbar. Tisa und wohl auch *Latoucheornis* scheinen aber *Emberiza* nicht besonders nahe zu stehen, obwohl sie vielfach damit vereinigt wurden.

31 Zu (391), S. 359, *Urocynchramus*: Diese rätselhafte Gattung, die neu-
erdings oft zu den Fringillidae gestellt wird, gehört eher zu den
Emberizidae, bei denen sie aber einen sehr isolierten Platz ein-
nimmt.

In dieser Reihe sind bisher erschienen:

- [1.] Frank Müntzel, Strafrecht im alten China nach den Strafrechtskapiteln in den Ming-Annalen
1968. IV, 138 Seiten, broschiert DM 22,—
- [2.] Beiträge zum interpersonalen Bezug im Japanischen.
Herausgegeben von Bruno Lewin
1969. VII, 214 Seiten, broschiert DM 28,—
- [3.] Bodo Wiethoff, Chinas dritte Grenze. Der traditionelle chinesische Staat und der
küstennahe Seeraum
1969. VIII, 226 Seiten und 1 Rollkarte, broschiert DM 70,—
- [4.] Claus M. Fischer, Lev N. Tolstoi in Japan (Meiji- und Taishō-Zeit)
1969. X, 219 Seiten, broschiert DM 28,—
- [5.] Bruno Lewin, Morphologie des koreanischen Verbs
1970. VIII, 256 Seiten, broschiert DM 32,—
- [6.] Peter Leimbigner, Mei Yao-ch'en (1002—1060). Versuch einer literarischen und
politischen Deutung
1970. VII, 158 Seiten, broschiert DM 22,—
- [7.] Fritz Pasierbsky, Zur Politsprache im modernen China.
Sprache — Denken — Wirklichkeit bei Mao Tse-tung
1971. II, 137 Seiten mit 9 Tabellen, broschiert DM 21,—
- 8. Tchi-ho Pack, Bericht des Nosongdang über seine Reise nach Japan aus dem Jahre 1420
1973. X, 229 Seiten und 1 Ausklapptafel, broschiert DM 36,—
- 9. Ekkehard May, Das Tōkaidō meishoki von Asai Ryōi.
Ein Beitrag zu einem neuen Literaturgenre der frühen Edo-Zeit
1973. XX, 301 Seiten mit 9 Abb. und 2 Karten, brosch. DM 48,—
- 10. Mitsuo Kimura, Die Entwicklung der Holzindustrie in Japan.
1974. VIII, 104 Seiten mit 20 Tabellen, sowie 7 Abb., brosch. DM 25,—
- 11. Ostasienwissenschaftliche Beiträge zur Sprache, Literatur, Geschichte, Geistesgeschichte,
Wirtschaft, Politik und Geographie
1974. VIII, 439 Seiten und 8 Abbildungen, broschiert DM 78,—
- 12. Peter Greiner, Die Brokatuniform-Brigade (chin-i wei) der Ming-Zeit von den
Anfängen bis zum Ende der T'ien-shun-Periode (1368—1464)
1975. VIII, 272 Seiten, broschiert DM 42,—